四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第五〇册目次

御纂醫宗金鑑九十卷首一卷（三）（清）吳謙等撰　清乾隆七年武英殿刻本　〇〇一

御纂醫宗金鑑九十卷首一卷（三）

（清）吳謙等撰

清乾隆七年武英殿刻本

御纂醫宗金鑑卷六十二

編輯外科心法要訣目錄

腫瘍主治類方

仙方活命飲

神授衛生湯

清熱消風散

乳香黃耆散

內疎黃連湯

回陽三建湯

竹葉黃耆湯

內消散

內固清心散

琥珀蠟礬丸

護心散

透膿散

托裏消毒散

神功內托散

復元通氣散

雙解貴金丸

黍米寸金丹

麥靈丹

保安萬靈丹

腫瘍敷貼類方

如意金黃散

五龍膏

四虎散

真君妙貼散

二青散

坎宮錠子

離宮錠子

白錠子

蝌蚪拔毒散

二味拔毒散

回陽玉龍膏

冲和膏

鐵桶膏

烏龍膏
神效千捶膏
馬齒莧膏
潰瘍主治類方
四君子湯
四物湯
八珍湯
十全大補湯
人參養榮湯

內補黃耆湯
異功散
理中湯
六君子湯
香砂六君子湯
托裏定痛湯
聖愈湯
柴胡四物湯
地骨皮飲

知蘗四物湯
三黃四物湯
補中益氣湯
人參黃耆湯
獨參湯
溫胃飲
橘皮竹茹湯
胃愛丸
二神丸

加味地黃丸
參朮膏
八仙糕
洗滌類方
葱歸溻腫湯
艾茸敷法
豬蹄湯
膏藥類方
萬應膏

紺珠膏
陀僧膏
巴膏
亞聖膏
絳珠膏
絳紅膏
加味太乙膏
白膏藥
化腐紫霞膏

貝葉膏
碧螺膏
麻藥類方
瓊酥散
整骨麻藥
外敷麻藥
去腐類方
白降丹
紅升丹

元珠膏
生肌類方
生肌定痛散
輕乳生肌散
薑礬散
腐盡生肌散
月白珍珠散
五色靈藥
生肌玉紅膏

瑩珠膏
呂祖一枝梅

御纂醫宗金鑑卷六十二

編輯外科心法要訣

腫瘍主治類方

仙方活命飲

此方治一切癰疽不論陰陽瘡毒未成者即消已成者即潰化膿生肌散瘀消腫乃瘡癰之聖藥誠外科之首方也故名之曰仙方活命飲

穿山甲 三大片炒　皂刺 五分

歸尾 一錢五分　甘草節 一錢

金銀花 二錢　赤芍藥 五分

乳香 五分　沒藥 五分

花粉 一錢　防風 七分

貝母 一錢　白芷 一錢

陳皮 一錢五分

右十三味好酒煎服恣飲盡醉

方歌 仙方活命飲平劑瘡毒癰疽俱可醫未成即消疼腫去已成膿化立生肌穿山皂刺當歸尾草節金銀赤芍宜乳沒天花防貝芷陳皮好酒共煎之

神授衛生湯

此方治癰疽發背疔瘡對口一切丹瘤惡毒諸證服之宣熱散風行瘀活血消腫解毒疎通藏府乃表裏兩實之劑功效甚速

皂角刺 一錢　防風 六分

羌活 八分　白芷 六分

穿山甲 六分炒　連翹 六分

歸尾 一錢　乳香 五分

沉香 六分　金銀花 一錢

石決明 六分　天花粉 一錢

甘草節 一錢　紅花 六分

大黃 二錢酒拌炒

右十五味水二碗煎八分病在上部先飲酒一杯後服藥病在下部先服藥後飲酒一杯以行藥力

如氣虛便利者不用大黃

方歌 神授衛生表裏劑癰疽諸瘡惡毒良行瘀活

血兼消腫表裏疏通實劑方皂刺防風羌並
甲連翹歸尾乳沉香金銀石決天花粉甘草
紅花共大黃

清熱消風散

此方治癰疽瘡腫已成未成之際無表無裏故外不惡寒內不便秘惟紅腫焮痛高腫有頭者宜服此藥以和解之也

皂角刺一錢　防風五分
陳皮一錢　連翹去心一錢

花粉五分　柴胡一錢
黃芩五分　川芎五分
白芍五分　甘草五分
當歸五分　黃耆一錢
金銀花五分　蒼朮炒一錢
紅花一錢

右十五味水二鍾煎八分食遠服

方歌　清熱消風無表裏癰疽諸毒和解方皂刺防
風陳翹粉柴芩芎芍草耆當銀花蒼朮紅花
入婦女還加香附良

若婦人加香附子用童便炒

乳香黃耆散

此方治癰疽發背諸毒疔瘡疼痛不可忍者乃氣虛不勝毒之故也服之未成即消已成即潰不用刀砭惡肉自脫并治打撲損傷筋骨疼痛之證

當歸一錢　白芍炒一錢
人參一錢　生黃耆一錢

川芎一錢　熟地一錢
乳香五分　沒藥五分
陳皮一錢　粟殼去筋膜蜜炙一錢
甘草節一錢

右水二鍾煎八分量病上下食前後服之

方歌　乳香黃耆治氣弱癰疽諸毒痛難當未成即
消已成潰歸芍參耆芎地黃乳沒粟陳甘草
節更醫打撲筋骨傷

內疏黃連湯

此方治癰疽陽毒在裏火熱發狂發熱二便秘澁煩躁嘔噦舌乾口渴飲冷等證六脈沉數有力者急宜服之以除裏熱

山梔一錢　連翹一錢

薄荷一錢　甘草五分

黃芩一錢　黃連一錢

桔梗一錢　大黃二錢

當歸一錢　白芍炒一錢

木香一錢　檳榔一錢

右水二茶鍾煎八分食前服加蜜二匙亦可

方歌　內疎黃連瀉裏熱癰瘡毒火陽盛狂腫硬發熱二便秘煩躁乾嘔渴飲凉梔翹薄草芩連桔大黃歸芍木檳榔

回陽三建湯

此方治癰疽發背初起不疼不腫不紅不熱堅如頑石硬若牛皮體倦身凉脈息遲細色似土硃粟頂多孔孔孔流血根脚平散軟陷無膿皮不作腐頭溫足凉者並急服之

人參一錢　附子一錢

當歸一錢　川芎一錢

甘草五分　茯苓一錢

生黃耆一錢　枸杞一錢

紅花五分　紫草五分

獨活五分　陳皮一錢

蒼朮炒五分　厚樸炒五分

木香五分　山萸肉一錢

右十六味加煨薑三片皂角樹根上白皮二

錢水二碗煎八分入酒一杯隨病上下食前後服之用棉帛覆蓋瘡上常令溫煖不得大開瘡孔走泄元氣爲要

方歌　回陽三建治陰疽體倦身凉脈細遲不腫不疼不紅熱堅如頑石硬如皮根平軟陷無膿腐參附歸芎草茯耆枸杞紅花與紫草獨陳蒼樸木山萸

竹葉黃耆湯

此方治癰疽發背諸般疔毒表裏不實熱甚口

中乾大渴者服之生津止渴

人參 八分　生黃耆 八分

石膏 煅 八分　半夏 製 八分

麥冬 八分　生地 二錢

白芍 八分　甘草 八分

川芎 八分　當歸 八分

竹葉 十片　黃芩 八分

右十二味水二鍾薑三片燈心二十根煎八分食遠溫服

方歌 竹葉黃耆口乾渴清熱補正助生津參耆膏夏麥冬地芍草芎歸竹葉芩

內消散

此方治癰疽發背對口疔瘡乳癰無名腫毒一切惡瘡能令癰腫內消使毒內化尿色赤汚從小便而出勢大者雖不全消亦可轉重爲輕移深居淺

知母 一錢　貝母 一錢

花粉 一錢　乳香 一錢

半夏 製 一錢　白及 一錢

穿山甲 一錢　皂刺 一錢

銀花 一錢

右九味水酒各一碗煎八分隨病上下食前後服之留藥渣搗爛加秋芙蓉葉一兩研爲細末再加白蜜五匙用渣調敷瘡上一宿卽消重者再用一服

方歌 內消散用化膿毒毒化從尿色變行知貝天花乳夏及穿山角刺共金銀藥渣搗和芙蓉

葉白蜜調敷毒卽平

已上諸方治癰疽七日以前瘡勢未成形體壯實而表裏之證相和者宜服病退卽止如過七日以後形勢已成則宜托裏消毒等湯使毒現於外以速其膿若仍用前散下之藥恐傷元氣致生變證也

內固清心散

此方治癰疽發背對口疔瘡熱甚焮痛煩躁飲冷其人內弱服之預防毒氣內攻於心也

菉豆粉二兩　人參二錢
氷片一錢　雄黃二錢
辰砂二錢　白豆蔻一錢
元明粉二錢　茯苓二錢
甘草二錢　乳香二錢

右十味爲細末每服一錢五分蜜湯調下不拘時服

方歌　內固清心防毒攻內弱毒氣入心中撤痛熱甚兼飲冷豆粉人參氷片雄辰砂白蔻元明粉茯苓甘草乳香同

琥珀蠟礬丸

此方治癰疽發背瘡形已成而膿未成之際其人卽不虛弱恐毒氣不能外出內攻於裏預服此丸護膜護心亦且活血解毒

黃蠟一兩　白礬一兩二錢
雄黃一錢二分　琥珀一錢另研極細
硃砂一錢研細　白蜜二錢

右上四味先研細末另將蠟蜜入銅杓內溶化離火片時候蠟四邊稍凝方將藥味入內攪勻共成一塊將藥火上微烘急作小丸如菉豆大硃砂爲衣磁罐收貯每服二三十丸食後白湯送下毒甚者早晚服其功最速

方歌　琥珀蠟礬治癰毒未出膿時平劑佳預服護膜能解毒蠟礬雄珀蜜硃砂

護心散

此方治瘡毒內攻口乾煩躁惡心嘔吐者服此藥護心解毒也

菉豆粉一兩　乳香三錢淨末
硃砂一錢　甘草一錢

右四味研細末每服二錢白滚湯調服早晚二次

方歌　護心散治毒內攻煩躁口乾嘔逆冲豆粉乳香硃共草二錢調下有神功

透膿散

此方治癰疽諸毒內膿已成不穿破者服之卽潰破毒出

生黃耆四錢　穿山甲一錢
川芎三錢　當歸二錢
皂角刺一錢五分
右五味水三鍾煎一鍾瘡在上先飲酒一杯後服藥瘡在下先服藥後飲酒一杯

方歌 透膿散治膿已成不能潰破劑之平用此可代鍼瀉毒角刺歸耆山甲芎

托裏消毒散

此方治癰疽已成內潰遲滯者因血氣不足不能助其腐化也宜服此藥托之令其速潰則腐肉易脫而新肉自生矣

皂角刺五分　銀花一錢
甘草五分　桔梗五分
白芷五分　川芎一錢
生黃耆一錢　當歸一錢
白芍一錢　白朮一錢
人參一錢　茯苓一錢
右十二味水二鍾煎八分食遠服

方歌 托裏消毒助氣血補正脫腐肌易生皂角銀花甘桔芷芎耆歸芍朮參苓

神功內托散

此方治癰疽腦項諸發等瘡日久不腫不高不能腐潰脈細身凉宜服此溫補托裏之劑以助氣血也

人參一錢五分　附子製一錢
川芎一錢　歸身二錢
黃耆一錢　白朮土炒一錢五分

白芍炒一錢　木香研五分
穿山甲炒八分　甘草炙五分
陳皮一錢　白茯苓一錢
右十二味煨薑三片大棗二枚水二茶鍾煎八分食遠服

方歌 神功內托陰毒證不腫不高不潰疼參附芎歸耆朮芍木香山甲草陳苓

復元通氣散

此方治乳癰腹癰便毒耳痛耳聾等證皆由毒

氣滯塞不通故耳服之則氣通毒散

青皮四兩　陳皮四兩

栝蔞仁二兩　穿山甲二兩

金銀花一兩　連翹一兩

甘草二兩半生半炙

右七味研末每服二錢黃酒調下

方歌 復元通氣乳腹癰便毒兼治耳痛聾青陳蔞甲銀翹草一服能教毒氣通

雙解貴金丸

此方治背疽諸毒初起木悶堅硬便秘脈沉實者悉效隨證加藥服法列後

生大黃一觔　白芷十兩

右二味為末水丸每服三五錢五更時用連鬚葱大者三根黃酒一碗煮葱爛取酒送藥服畢蓋臥出汗過三二時俟大便行一二次立效

按此宣通攻利之劑也濟之以葱酒力能發汗故云雙解弱者隨用中劑行後以四君子湯補之老人虛人每服一錢用人參加生薑煎湯送下過一時再一服得歸上半身得汗則已

方歌 雙解貴金治諸毒癰瘍初起木硬堅大黃白芷為丸服葱酒煎送汗下痊

黍米寸金丹

此方乃異人所傳常有暴中急證忽然卒倒者撬開牙關研灌三丸其人即活又能治發背癰疽偏身壅腫附骨癰疽等證也凡初起憎寒壯

熱四肢倦怠沉重者不分表裏老幼輕重並宜服之

乳香　沒藥各一錢

狗膽一個乾者　鯉魚膽三個陰乾

硇砂二錢　蟾酥二錢

狗寶一錢　麝香五分

白丁香四十九個　蜈蚣全者七條酥炙

黃蠟三錢　烏金石一錢

頭胎男乳一合　輕粉一錢

雄黃一錢　水銀煉粉霜白色者三錢

右十六味爲細末除黃蠟乳汁二味熬成膏子同藥和丸如菉豆大小兒用一丸大人三丸重者五丸冷病用葱湯熱病用新汲水送下衣被密蓋勿令透風汗出爲度諸病如失

方歌 黍米寸金奇效方癰疽發背服之良乳香沒藥狗鯉膽蟾硇寶麝白丁香蜈蚣黃蠟烏金石男乳輕雄共粉霜

麥靈丹

此丹能治癰疽惡毒無名諸瘍及疔瘡回裏令人煩悶神昏或婦人初發乳證小兒痘疹餘毒或腰腿暴痛等證

鮮蟾酥二錢　活蜘蛛二十一個黑色大者佳

定心草一錢即兩頭尖鼠糞　飛羅麪六兩

右四味共研一處用菊花熬成稀膏和好撚爲麥子形如麥子大每服七丸重大者九丸小兒輕證五丸在上俱用滾白水服在下用淡黃酒送服每一料加麥子一合收磁罐內

方歌 麥靈丹治疔毒疽鮮蟾酥與活蜘蛛定心草共飛羅麪黃菊熬膏相合宜

保安萬靈丹

此方治癰疽疔毒對口發頤風寒濕痺濕痰流注附骨陰疽鶴膝風及左癱右瘓口眼歪斜半身不遂血氣凝滯徧身走痛步履艱辛偏墜疝氣偏正頭痛破傷風牙關緊閉截解風寒無不應效

茅山蒼术八兩　麻黃

羌活　荊芥

防風　細辛

川烏湯泡去皮　草烏湯泡去皮

川芎　石斛

全蝎　當歸

甘草　天麻

何首烏各一兩　雄黃六錢

右十六味爲細末煉蜜爲丸重三錢硃砂爲衣磁罐收貯視年歲老壯病勢緩急斟酌用

之如惡瘡初起二三日間或癰疽已成至十日前後未出膿者狀若傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛惡心嘔吐四肢沉重恍惚悶亂皮膚壯熱及傷寒四時感冒傳變疫證惡寒身熱俱宜服之用葱白九枝煎湯調服一丸蓋被出汗爲效如汗遲以葱湯催之其汗必出如淋如洗令其自收不可露風患者自快瘡未成者即消已成者即高腫潰膿如病無表裏相兼不必發散只用熱酒化服又按

此方原載諸風癱瘓門中今移錄於此者蓋瘡瘍皆起於營衛不調氣血凝滯始生癰腫此藥專能發散又能順氣搜風通行經絡所謂結者開之也經云汗之則瘡已正與此相合也服後當避風忌冷物戒房事如婦人有孕者勿服

方歌　萬靈丹治諸痺病此藥猶能治腫瘍發表毒邪從汗解通行經絡效非常麻黃羌活荊防細川草烏芎石斛蒼全蠍當歸甘草等天麻何首共雄黃

腫瘍敷貼類方

凡腫瘍初起時腫高赤痛者宜敷涼藥以寒勝熱也然亦不可太過過則毒爲寒凝變爲陰證如漫腫不紅似有頭而不痛者宜敷溫藥乃引毒外發也經云發表不遠熱敷熱藥亦發表之意凡調敷藥須多攪則藥稠黏敷後貼紙必須撕斷則不崩裂不時用原汁潤之蓋借濕以通竅乾則藥氣不入更添拘急

之苦矣凡去敷藥必看毛孔有汗意者爲血脈通熱氣散也反此者逆

如意金黃散

此散治癰疽發背諸般疔腫跌撲損傷濕痰流毒大頭時腫漆瘡火丹風熱天泡肌膚赤腫乾濕脚氣婦女乳癰小兒丹毒凡一切諸般頑惡熱瘡無不應效誠瘡科之要藥也

南星　陳皮

蒼术各二觔　黃蘗五觔

薑黃五觔　甘草二觔

白芷五觔　上白天花粉十觔

厚朴二觔　大黃五觔

右十味共爲咀片曬乾磨三次用細絹羅篩貯磁罐勿泄氣凡遇紅赤腫痛發熱未成膿者及夏月時俱用茶湯同蜜調敷如欲作膿者用葱湯同蜜調敷如漫腫無頭皮色不變濕痰流毒附骨癰疽鶴膝風等證俱用葱酒煎調敷如風熱所生皮膚亢熱色亮遊走不

定俱用蜜水調敷如天泡火丹赤遊丹黃水漆瘡惡血攻注等證俱用大藍根葉搗汁調敷加蜜亦可湯潑火燒皮膚破爛麻油調敷已上諸引調法乃別寒熱溫凉之治法也

方歌 如意金黃敷陽毒止痛消腫實良方南陳蒼蘗薑黃草白芷天花朴大黃

五龍膏

此膏治癰疽陰陽等毒腫痛未潰者敷之即拔出膿毒

五龍草 即烏蘞莓詳本草綱目蔓草部俗名五爪龍江浙多產之

金銀花　豨薟草

車前草 連根葉　陳小粉各等分

右四味俱用鮮草葉一處搗爛再加三年陳小粉并飛鹽末二三分共搗爲稠糊徧敷瘡上中留一頂用膏貼蓋避風爲主若冬月草無鮮者預採蓄下陰乾爲末用陳米醋調敷一如前法并效如此方內五龍草或缺少不便倍加豨薟草亦效

方歌 五龍膏用拔膿毒平劑五龍草銀花豨草車前俱搗爛小粉飛鹽攪糊搽

四虎散

此散治癰疽腫硬厚如牛領之皮不作膿腐者宜用此方

草烏　狼毒

半夏　南星各等分

右四味爲細末用猪腦同搗徧敷瘡上留頂出氣

方歌 四虎散敷陰疽癰頑腫不痛治之平犀似牛
皮難潰腐草烏狼毒夏南星

眞君妙貼散

此散治癰疽諸毒頑硬惡瘡散漫不作膿者用此藥敷之不痛者即痛痛者即止如皮破血流濕爛疼苦天泡火丹肺風酒刺等證并用之皆效

蕎麪 五觔　明淨硫黃 十觔 爲末
白麪 五觔

右三味共一處用清水微拌乾濕得宜趕成薄片微晒單紙包裹風中陰乾收用臨時研細末新汲水調敷如皮破血流濕爛者用麻油調敷天泡火丹酒刺者用靛汁調搽并效

方歌 眞君妙貼硫二麪水調頑硬不痛膿油調濕
爛流血痛靛汁泡丹酒刺風

二青散

此散治一切陽毒紅腫疼痛欝熱等證未成者即消

青黛　黃蘗
白斂　白薇 各一兩
青露 即芙蓉葉 三兩　白及
白芷　水龍骨 即多年船舊油灰
白鮮皮 各一兩　天花粉 三兩
大黃 四兩　朴消 一兩

右十二味爲末用醋蜜調敷已成者留頂未成者徧敷

方歌 二青散用敷陽毒腫痛紅熱用之消黛蘗斂
薇青露及芷龍鮮粉大黃消

坎宮錠子

此錠子治熱毒腫痛焮赤諸瘡并搽痔瘡最效

京墨 一兩　胡黃連 二錢
熊膽 三錢　麝香 五分
兒茶 二錢　冰片 七分
牛黃 三分

右七味爲末用猪膽汁爲君加生薑汁大黃水浸取汁釅醋各少許相和藥成錠用凉水

磨濃以筆蘸塗之
方歌 坎宮錠子最清凉熱腫諸瘡幷痔瘡京墨胡
連熊膽麝兒茶冰片共牛黃

離宮錠子

此錠子治疔毒腫毒一切皮肉不變漫腫無頭
搽之立效

血竭二錢　硃砂二錢
膽礬三錢　京墨一兩
蟾酥三錢　麝香一錢五分

右六味為末凉水調成錠凉水磨濃塗之
方歌 離宮錠治諸疔毒漫腫無頭凉水塗血竭硃
砂為細末膽礬京墨麝蟾酥

白錠子

此錠專敷初起諸毒癰疽疔腫流注痰包惡毒
及耳痔耳挺等證

白降丹四錢 即白靈藥　銀黝二錢
寒水石二錢　人中白二錢

右四味共為細末以白及麪打糊為錠大小由人不可入口每用以陳醋研敷患處如乾
再上自能消毒
方歌 白錠專敷初起毒癰疽疔腫與痰包降丹銀
黝人中白寒水白及醋研消

蝌蚪拔毒散

此散治無名大毒一切火毒瘟毒敷之神效

寒水石研極細末　淨皮消研極細末
川大黃各等分研極細末
蝦蟆子 初夏時河內有蝦蟆成羣大頭長尾者撈來收罈內泥封口埋至秋天化成水

右用蝌蚪水一大碗入前藥末各二兩陰乾
再研勻收磁罐內每用時以水調塗患處
方歌 拔毒散治無名毒火毒瘟毒俱可施寒水消
黃蝌蚪水浸乾藥末水調之

二味拔毒散

此散治風濕諸瘡紅腫痛癢疥痱等疾甚效

明雄黃　白礬各等分

右二味為末用茶清調化鵝翎蘸掃患處癢
痛自止紅腫即消

方歌　二味拔毒消紅腫風濕諸瘡痛癢寧一切肌
膚疥痱疾雄礬爲末用茶清

回陽玉龍膏

此膏治癰疽陰瘡不發熱不焮痛不腫高不作
膿及寒熱流注冷痛痹風脚氣手足頑麻筋骨
疼痛及一切皮色不變漫腫無頭鶴膝風等證
但無肌熱者一槩敷之俱有功效

軍薑炒三兩　肉桂五錢
赤芍炒三兩　南星一兩
草烏炒三兩　白芷一兩

右六味製畢共爲細末熱酒調敷

方歌　回陽玉龍陰毒證不熱不疼不腫高軍薑桂
芍星烏芷研末須將熱酒調

冲和膏

此膏治癰疽發背陰陽不和冷熱相凝者宜用
此膏敷之能行氣疎風活血定痛散瘀消腫祛
冷軟堅誠良藥也

紫荆皮炒五兩　獨活炒三兩
白芷三兩　赤芍炒二兩
石菖蒲一兩五錢

右五味共爲細末葱湯熱酒俱可調敷

方歌　冲和發背癰疽毒冷熱相凝此藥敷行氣疎
風能活血紫荆獨芷芍菖蒲

鐵桶膏

此膏治發背將潰已潰時根脚走散瘡不收束
者宜用此藥圍敷

膽礬三錢　銅綠五錢
麝香三分　白及五錢

輕粉二錢　鬱金二錢
五倍子微炒一兩　明礬四錢

右八味共爲極細末用陳米醋一碗杓內慢
火熬至一小杯候起金色黃泡爲度待溫用
藥末一錢攪入醋內炖溫用新筆塗於瘡根
周圍以棉紙覆蓋藥上瘡根自生皺紋漸收
漸緊其毒不致散大矣

方歌　鐵桶膏收毒散大周圍敷上束瘡根膽礬銅

綠及輕粉五倍明礬麝鬱金

烏龍膏

此膏治一切諸毒紅腫赤暈不消者用此藥敷上極有神效

木鱉子 二兩 去殼　草烏 半兩

小粉 四兩　半夏 二兩

右四味於鐵銚內慢火炒焦黑色為度研細以新汲水調敷一日一換自外向裏塗之須留瘡頂令出毒氣

方歌　烏龍膏用治諸毒赤暈能收治腫瘍木鱉草烏小粉夏涼水調敷功效良

神效千捶膏

此膏專貼瘡瘍疔毒初起貼之即消治瘰癧連根拔出大人臁瘡小兒蟺拱頭等證並效

土木鱉 五個 去殼　白嫩松香 四兩 揀淨

銅綠 一錢 研細　乳香 二錢

沒藥 二錢　蓖麻子 七錢 去殼

巴豆肉 五粒　杏仁 一錢 去皮

右八味合一處石臼內搗三千餘下即成膏取起浸涼水中用時隨瘡大小用手捻成薄片貼瘡上用絹蓋之

方歌　千捶膏貼諸疔毒瘰癧臁瘡蟺拱頭木鱉松香銅乳沒蓖麻巴豆杏仁投

馬齒莧膏

馬齒莧性味清涼能解諸毒今用此一味或服或敷甚有功效所治諸證列後

一治楊梅徧身如癩猴硬如管者取莧碗粗一

握酒水煎服出汗

一治發背諸毒用莧一握酒煎或水煮冷服出汗再服退熱去腐三服即愈并杵莧敷之

一治多年頑瘡臁瘡疼痛不收口者杵莧敷之取蟲一日一換三日後腐肉已盡紅肉如珠時換生肌藥收口

一治面腫唇緊搗汁塗之

一治婦女臍下生瘡痛癢連及二陰者用莧四兩青黛一兩研勻敷之

一治濕癬白禿取石灰末炒紅用莧汁熬膏調
勻塗之
一治丹毒加藍靛根和搗敷之
方歌馬齒莧膏只一味楊梅發背服敷之頑瘡面
腫搗汁用婦女陰瘡共黛施濕癬白禿加灰
末丹毒藍根相和宜
潰瘍主治類方
四君子湯
人參　茯苓

白朮各二錢土炒　甘草一錢
右四味薑三片棗二枚水煎服
四物湯
川芎一錢五分　當歸三錢酒洗
白芍二錢炒　地黃三錢
右四味水煎服
八珍湯
人參一錢　茯苓一錢
白朮一錢五分　甘草五分炙

川芎一錢　當歸一錢
白芍一錢炒　地黃一錢
右八味水煎服
十全大補湯
於八珍湯內加黃耆肉桂水煎服
人參養榮湯
於十全大補湯內去川芎加陳皮遠志五味
子水煎服
內補黃耆湯

於十全大補湯內去白朮加遠志麥門冬水
煎服
按四君子湯補氣不足者也四物湯補血不足
者也八珍湯雙補血氣不足者也十全大補
湯大補氣血諸不足者也人參養榮湯去川
芎者因面黃血少加陳皮以行氣之滯五味
子以收斂氣血遠志以生心血也內補黃耆
湯治潰瘍口乾去白朮者避其燥能亡津也
加遠志麥冬者以生血生津也如痛者加乳

香沒藥以定痛硬者加穿山甲皂角刺以消
硬也已上諸方凡癰疽潰後諸虛者悉準於
此當隨證酌用之
方歌 四君參苓白朮草四物芎歸芍地黃二方雙
補八珍是更加耆桂十補湯榮去芎加陳遠
味內去朮加遠冬頁痛甚乳沒硬穿皂潰後
諸虛斟酌方

異功散

人參二錢 白朮土炒一錢
茯苓一錢 甘草炙五分
陳皮五分
右五味薑三片棗二枚水煎服

理中湯

人參二錢 白朮土炒二錢
乾薑一錢 甘草炙五分
右四味水煎服

六君子湯

人參二錢 白朮土炒二錢
茯苓一錢 甘草炙一錢
陳皮一錢 半夏製一錢五分
右六味薑三片棗二枚水煎服

香砂六君子湯

人參一錢 白朮土炒二錢
茯苓一錢 甘草炙五分
藿香或木香一錢 陳皮一錢
半夏製一錢五分 砂仁五分
右八味薑三片水煎服

按四君子湯加陳皮名異功散潰後脾虛氣滯者宜之四君子湯減茯苓加乾薑名曰理中湯潰後脾虛寒滯者宜之蓋氣虛則陽虛陽虛生寒故於補氣藥中加溫熱之味也四君子湯加陳皮半夏名六君子湯潰後氣虛有痰者宜之六君子湯加藿香或木香砂仁名香砂六君子湯潰後胃虛痰飲嘔吐者宜之無痰飲氣虛嘔逆甚者加丁香沉香潰後氣虛有寒加肉桂附子潰後瀉者加訶子肉豆

泄腸滑不固加罌粟殼食少咳嗽者加桔梗麥冬五味子渴者加乾葛傷食脾胃虛弱加山查神麯穀芽或麥芽此皆潰後氣不足者以四君子湯為主隨證加減也

方歌　四君加陳異功散理中減苓加乾薑有痰陳半六君子嘔吐砂仁木藿香逆加丁沉寒桂附瀉加訶蔻粟滑腸咳桔冬味渴加葛傷食查麯穀麥良

托裏定痛湯

於四物湯內加肉桂乳香沒藥粟殼水煎服

聖愈湯

於四物湯內加柴胡人參黃耆水煎服

柴胡四物湯

於四物湯內加柴胡人參黃芩半夏甘草水煎服

地骨皮飲

於四物湯內加丹皮地骨皮

知蘗四物湯

於四物湯內加知母黃蘗

三黃四物湯

於四物湯內加黃連黃芩黃蘗

按托裏定痛湯潰後血虛疼痛者宜之聖愈湯潰後血虛內熱心煩氣少者宜之柴胡四物湯潰後血虛有寒熱者宜之地骨皮飲潰後不寒者宜之知蘗四物湯潰後五臟陰火骨蒸者宜之三黃四物湯潰後六腑陽火煩熱者宜之蓋血虛則陰虛陰虛生熱故稱血藥

中多加寒涼之味也此皆潰後血不足者以四物湯為主隨證加減也

方歌　四物加桂乳沒粟托裏定痛功效奇聖愈四物參耆入血虛血熱最相宜血虛寒熱小柴合惟熱加丹地骨皮陽火煩熱三黃合陰火骨蒸加蘗知

補中益氣湯

補中益氣湯治潰瘍元氣不足四肢倦怠口乾時熱飲食無味脈洪大無力心煩氣怯者俱宜

服之

人參一錢　當歸一錢

生黃耆二錢　白朮土炒一錢

升麻三分　柴胡三分

甘草炙一錢　麥冬去心一錢

五味子研五分　陳皮五分

右十味水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾空心熱服

人參黃耆湯

治潰瘍虛熱不睡少食或寒濕相凝作痛者效

即前方去柴胡加神麴五分炒蒼朮五分炒黃蘗五分炒

方歌　補中益氣加麥味潰後見證同內傷參耆歸朮升柴草麥味陳皮引棗薑人參黃耆寒濕熱加麴蒼蘗減柴方

獨參湯

此湯治潰瘍膿水出多元氣虛餒外無邪氣自汗脈虛者宜服之

人參二兩

右一味水二鍾棗十枚或蓮肉元眼肉煎好徐徐服之若煎至稠厚即成膏矣作三次用醇酒熱化服之亦可

方歌　膿水淌多元氣餒不生他恙獨參宜徐徐代飲無窮妙棗蓮元肉共煎之

溫胃飲

此湯治癰疽脾胃虛弱或內傷生冷外感寒邪致生呃逆中脘疼痛嘔吐清水等證宜急服之

人參一錢　白朮土炒二錢

乾薑炮一錢　甘草一錢

丁香五分　沉香一錢

柿蒂十四個　吳萸酒洗七分

附子製一錢

右九味水三鍾薑三片棗二枚煎八分不拘時服

方歌　溫胃飲治寒呃逆內傷外感胃寒生理中加丁沉柿蒂寒盛吳萸附子寧

橘皮竹茹湯

此湯治潰瘍胃火上逆氣衝以致時時呃逆身熱煩渴口乾脣焦此熱呃也服之有效

橘紅 二錢　竹茹 三錢

生薑 一錢　柿蒂 七個

人參 一錢　黃連 一錢

右六味水二鍾煎八分空心溫服

方歌 橘皮竹茹熱呃逆胃火氣逆上衝行橘紅竹茹薑柿蒂虛加參補熱連清

胃愛丸

此丸治潰瘍脾胃虛弱諸味不喜者宜服此丸助脾氣開胃口而飲食自進矣

人參 一兩　山藥 一兩肥大上白者切片用乳拌令透曬後微焙

建蓮肉 五錢去皮心　白豆蔻 一錢

小紫蘇 五錢蜜拌曬乾微蒸片時連梗葉切片

陳皮 六錢用陳老米先炒黃色方入同炒微燥勿焦

雲片白朮 一兩鮮白者米泔浸去澁水切片曬乾同麥芽拌炒

甘草 三錢炙

上白茯苓 一兩切一分咀片用砂仁二錢同茯苓合碗內飯上蒸熟

右九味共爲細末用老米二合微焙碾粉泡荷葉熬湯打糊丸梧桐子大每服八十丸清米湯送下不拘時服

方歌 不思飲食宜胃愛開胃扶脾效若仙異功山藥蘇梗葉建蓮白蔻米糊丸

清震湯

治潰瘍脾胃虛弱或誤傷生冷或氣惱勞役或病後入房太早以致寒邪乘入中脘乃生呃逆急服之

人參　益智仁

半夏 製各一錢　澤瀉 三分

香附　陳皮

白茯苓 各一錢　附子 製一錢

炙甘草 一錢　柿蒂 二十四個

方歌 清震湯治胃家寒人參益智半夏攢澤瀉香附陳茯苓附子甘草柿蒂煎

二神丸

此丸治癰疽脾腎虛弱飲食不消黎明溏瀉者服之有效

肉果二兩 麵裹煨肥大者搗去油

補骨脂四兩 微炒香

右二味共爲細末用大棗四十九枚老生薑四兩切片水浸薑棗煮至水乾爲度取棗肉爲丸桐子大每夜半用清米湯送下七十丸治腎瀉脾瀉甚效

方歌 二神丸治脾腎弱飲食不化瀉黎明肉果補

骨脂腎生薑煮棗肉丸成

加味地黃丸

此丸治癰疽已潰虛火上炎口乾作渴者宜服之

熟地八兩 酒蒸搗膏　山藥四兩 炒

山萸肉五兩 去核　白茯苓四兩

牡丹皮四兩 酒洗　澤瀉三兩 蒸

肉桂六錢　五味子三兩 炒

右八味共爲末煉蜜丸如梧桐子大每服二錢空心鹽湯送下

方歌 加味地黃勞傷腎水衰津少渴良方山萸山藥丹苓澤肉桂五味熟地黃

參朮膏

此膏治癰疽發背等證大潰膿血之後血氣大虛急宜用此補之

人參半觔 切片用水五大碗沙鍋慢火熬至三碗將渣再煎汁一碗共用密絹濾淨復熬稠厚磁碗內收貯聽用

雲片白朮六兩　懷慶熟地六兩 俱熬同上法

以上三膏各熬完畢各用磁罐盛之入水中待冷取起密蓋勿令泄氣如患者精神短少懶於言動短氣自汗者以人參膏三匙白朮膏二匙地黃膏一匙俱用無灰好酒一杯燉熱化服如脾虛弱飲食減少或食不知味或已食不化者用白朮膏三匙人參膏二匙地黃膏一匙熱酒化服如腰膝痠軟腿脚無力皮膚枯槁者用地黃膏三匙參朮膏各二匙化服如氣血脾胃相等無偏勝者三膏每各

二匙熱酒化服此膏用於清晨及臨睡時各
進一次自然強健精神頓生氣血新肉易長
瘡口易合一切瘡形危險勢大膿多者服之
自無變證也夏天炎熱恐膏易變令作二次
熬用亦好愈後常服能鬚髮變黑返老還童
已上諸方功難及此

方歌 參朮膏治大膿後血氣雙補此方宗人參白
朮同熟地熬成膏服有奇功

八仙糕

此糕治癰疽脾胃虛弱食少嘔泄精神短少飲
食無味食不作饑及平常無病久病者服之能
健脾胃

山藥 六兩　人參 六兩
粳米 七升　糯米 七升
白蜜 一觔　白糖霜 二兩半
蓮肉 六兩　芡實 六兩
白茯苓 六兩

右將山藥人參蓮肉芡實茯苓五味各為細
末再將粳糯米為粉與上藥末和勻將白糖
入蜜湯中炖化隨將粉藥乘熱和勻攤鋪籠
內切成條蒸熟火上烘乾磁器收貯每日清
早用白湯泡數條或乾用亦可饑時隨用服
至百日啟脾壯胃功難筆述

方歌 八仙糕用健脾胃食少嘔泄服之靈山藥人
參粳糯米蜜糖蓮芡白雲苓

洗滌類方

洗有蕩滌之功滌洗則氣血自然舒暢其毒

易於潰腐而無壅滯也凡腫在四肢者溻漬
之在腰腹脊背者淋之在下部者浴之俱以
布帛或棉蘸洗稍溫即易輕者日洗一次重
者日夜洗二次每日洗之不可間斷凡洗時
冬月要猛火以逼寒氣夏月要明窻以避風
涼若不慎此輕則有妨收口重則恐變純陰
夫洗藥不一如初腫與將潰者俱用葱歸溻
腫湯淋洗如陰證不起者俱用艾茸湯敷法
如潰後俱用猪蹄湯淋洗用猪蹄湯者以助

肉之氣而逐腐也此滌洗之法乃瘍科之要藥也

葱歸溻腫湯

此湯治癰疽瘡瘍初腫將潰之時用此湯洗之以瘡內熱癢爲度

獨活 二錢　白芷 三錢

葱頭 七個　當歸 三錢

甘草 三錢

右五味以水三大碗煎至湯醇濾去滓以絹

帛蘸湯熱洗如溫再易之

方歌　葱歸溻腫洗諸毒初起將潰用之宜洗至熱癢斯爲度獨芷葱歸甘草俱

艾茸敷法

此膏治陰瘡黑陷而不痛者用之爲良以知痛則生不知痛出紫血者死然必內服大補回陽之劑以助之

硫黃 五錢　雄黃 五錢

艾茸 一觔

右以硫雄二味爲末同艾入水煎半日水將乾取艾出搗爛溫敷患處再煎再易十餘次爲度

方歌　艾茸敷法治陰瘡黑陷不痛用之良石硫雄黃同艾煮搗成膏敷定能康

豬蹄湯

此湯治癰疽諸毒流膿者熬好洗之以助肉氣消腫散風脫腐止痛去惡肉活死肌潤瘡口如腐盡者不必用之當以米泔水熱洗之令瘡潔

淨不可過洗過洗則傷水皮膚破爛難生肌肉斂口矣

黃芩　甘草

當歸　赤芍

白芷　蜂房

羌活 各等分

右七味共爲粗末看證之大小定藥之多少先將貘豬前蹄一隻用水六碗煮蹄軟爲度將汁濾清吹去汁上油花即用粗藥末一兩

投於汁中再用微火煎十數沸濾去渣候湯
微溫即用方盤一箇靠身於瘡下放定隨用
軟絹蘸湯淋洗瘡上并入孔內輕手捺盡內
膿庶敗腐宿膿隨湯而出以淨爲度再以軟
帛疊七八重蘸湯勿令大乾覆於瘡上兩手
輕按片時帛溫再換如此再按四五次可以
流通血氣解毒止痛去瘀也洗訖用絹帛挹
乾即隨證以應用之藥貼之

方歌 豬蹄湯治癰疽毒已潰流膿用此方消腫散

風能止痛芩甘歸芍芷蜂羌

膏藥類方

萬應膏

此膏治一切癰疽發背對口諸瘡痰核流注等
毒貼之甚效

川烏 草烏
生地 白歛
白及 象皮
官桂 白芷
當歸 赤芍
羌活 苦參
土木鱉 穿山甲
烏藥 甘草
獨活 元參
定粉 大黃各五錢

右十九味定粉在外用淨香油五觔將藥浸
入油內春五夏三秋七冬十候日數已足入
潔淨大鍋內慢火熬至藥枯浮起爲度住火

片時用布袋濾去渣將油稱準每油一觔對
定粉半觔用桃柳枝不時攪之以黑如漆亮
如鏡爲度滴入水內成珠薄紙攤貼

方歌 萬應膏用貼諸毒發背癰疽對口瘡川草烏
同地歛及象皮桂芷芍歸羌苦參木鱉穿烏
藥甘獨元參定粉黃

紺珠膏

此膏治一切癰疽腫毒流注頑臁風寒濕痺瘰
癧乳癰痰核血風等瘡及頭痛牙疼腰腿痛等

證悉驗

製麻油四兩　製松香一觔

右將麻油煎滾入松香文火溶化柳枝攪候化盡離火下細藥末二兩三錢攪勻即傾於水內拔扯數十次易水浸之聽用

一瘀血腫毒瘰癧等證但未破者再加魏香散隨膏之大小患之輕重每加半分至三二分為率

一毒深膿不盡及頑瘡對口等證雖潰必用此

膏獲效

一未破者貼之勿揭揭則作癢痛亦勿揭能速於成膿患在平處者用紙攤貼患在灣曲轉動處者用絹帛攤貼

一臁瘡及臀腿寒濕等瘡先用茶清入白礬少許洗淨貼之見效

一頭痛貼太陽穴牙痛塞牙縫內

一內癰等證作丸用蛤粉為衣服下

一便毒痰核多加魏香散如膿瘡再加銅青如蟮拱頭癤毒貼之亦效

製油法

每麻油一觔用當歸木鱉子肉知母細辛白芷巴豆肉文蛤打碎山茨菇打碎紅芽大戟續斷各一兩槐柳枝各二十八寸入油鍋內浸二十一日煎枯去渣取油聽用倘朝鮮琥珀膏多積隨予此方宜加之

製松香法

擇片子淨嫩松香為末十觔取槐柳桃桑芙

蓉等五樣枝各五觔剉碎用大鍋水煎濃汁濾淨再煮一次各收之各分五分每用初次汁一分煎滾入松香末二觔以柳槐枝攪之煎至松香沉下水底為度即傾入二次汁內乘熱拔扯數十次以不斷為佳候溫作餅收之餘香如法

膏內細藥方

乳香　沒藥各五錢

明雄黃四錢　血竭五錢

麝香一錢　輕粉二錢
右為細末加入膏內用

魏香散

乳香　没藥
血竭各等分　阿魏
麝香各減半
為末罐收聽用
方歌紺珠膏貼癰疽毒流注頑臁濕痺名瘰癧乳
癰痰核塊血風頭痛及牙疼松香化入麻油

內乳没雄黃竭麝輕隨證更加魏香散麝香
魏竭乳没并

陀僧膏

此膏專貼諸般惡瘡流注瘰癧跌撲損破金刃
悞傷等證用之有效
南陀僧二十兩研末　赤芍二兩
全當歸二兩　乳香五錢去油研
没藥五錢去油研　赤石脂二兩研
苦參四兩　百草霜二兩篩研

銀黝一兩　桐油二觔
香油一觔　血竭五錢研
孩兒茶五錢研　川大黃半觔
右藥先將赤芍當歸苦參大黃入油內煠枯
熬至滴水不散再下陀僧末用槐柳枝攪至
滴水將欲成珠將百草霜細細篩入攪勻再
將群藥及銀黝篩入攪極勻傾入水盆內衆
手扯千餘下再收入磁盆內常以水浸之
方歌陀僧膏貼諸惡瘡流注瘰癧跌撲傷陀僧赤

芍歸乳没赤脂苦參百草霜銀黝桐油香油
共血竭兒茶川大黃

巴膏方

此膏貼一切癰疽發背惡瘡化腐生肌甚效
象皮六錢　穿山甲六錢
山梔子八十個　兒茶二錢另研極細末
人頭髮一兩二錢　血竭一錢另研極細末
硇砂三錢另研極細末　黃丹飛
香油　桑槐桃柳杏枝各五十寸

右將桑槐桃柳杏五枝用香油四觔將五枝煠枯撈出次入象皮穿山甲人頭髮煠化再入山梔子煠枯用絹將藥渣濾去將油復入鍋內煎滾離火少頃每油一觔入黃丹六兩攪勻用慢火熬至滴水中成珠將鍋取起再入血竭兒茶硇砂等末攪融用凉水一盆將膏藥傾入水內用手扯藥千餘遍換水數次拔去火氣磁罐收貯用時不宜見火須以銀杓盛之重湯燉化薄紙攤貼

方歌　癰疽發背用巴膏象甲梔茶髮竭硇枝用桑
槐桃柳杏黃丹攪和共油熬

亞聖膏

此膏治一切破爛諸瘡頑楊梅結毒貼之甚效

象皮一兩　驢甲一塊即懸蹄

鷄子清三個　木鼈子七個

蛇蛻二錢　蟬蛻四錢

血餘三錢　穿山甲六錢

槐枝　榆枝

艾枝　柳枝

桑枝各二十一寸　黃丹

黃蠟　蘇油三觔

右將藥浸七日煎如常法濾去渣每淨油一觔入黃丹七兩煎成膏入黃蠟五錢化勻再加血竭五錢兒茶三錢乳香三錢沒藥三錢煆牡蠣五錢五靈脂五錢右五味研極細末入膏內成膏出火攤貼

方歌　亞聖膏治破爛瘡楊梅結毒貼之良象驢鷄
鱉蛇蟬蛻血甲槐榆艾柳桑丹蠟蘇油勻化
後竭茶乳沒蠣靈襄

絳珠膏

此膏治潰瘍諸毒用之去腐定痛生肌甚效

天蔴子肉八十一粒　鷄子黃十個

蘇油十兩　血餘五錢

黃丹二兩水飛　白蠟三兩

血竭三錢　硃砂二錢

輕粉二錢　乳香三錢

没藥三錢　兒茶三錢
氷片一錢　麝香五分
珍珠三錢

右將蘇油煠血餘至焦枯加麻子肉鷄子黃再煠枯去渣入蠟候化離火少時入黃丹攪匀再加細藥和匀收用攤貼

方歌　絳珠化腐生肌蘇肉鷄黃油血餘丹蠟竭砂輕乳没兒茶氷麝共珍珠研細和匀隨證用乳岩須要入銀朱

乳岩加銀朱一兩

絳紅膏

此膏治一切腫毒已成疼痛不消者貼之悉效

銀朱五錢

右一味爲細末以生桐油調攤如膏先用神燈照後貼此膏

方歌　絳紅膏治毒已成腫痛難消用最靈一味銀朱爲細末桐油調和貼之平

加味太乙膏

此膏治發背癰疽及一切惡瘡濕痰流注風濕徧身筋骨走注作痛湯潑火燒刀傷棒毒五損內癰七傷外證俱貼患處又男子遺精女人白帶俱貼臍下臟毒腸癰亦可丸服諸般瘡癤血風癩瘡諸藥不止痛癢者並效

白芷　當歸
赤芍　元參各二兩
柳枝　槐枝各一百寸
肉桂二兩　没藥三錢

大黃二兩　木鱉二兩
輕粉四錢研不見星　生地二兩
阿魏三錢　黃丹四十兩水飛
乳香五錢　血餘一兩

右將白芷當歸赤芍元參肉桂大黃木鱉生地八味併槐柳枝用真蘇油足稱五觔將藥浸入油內春五夏三秋七冬十入大鍋內慢火熬至藥枯浮起爲度住火片時用布袋濾淨藥渣將油稱準用細舊絹將油又濾入鍋

內要清淨爲佳將血餘投上慢火熬至血餘浮起以柳枝挑看似膏溶化之象方算熬熟淨油一觔將飛過黃丹六兩五錢徐徐投入火加大些夏秋亢熱每油一觔加丹五錢不住手攪候鍋內先發青烟後至白烟叠叠旋起氣味香馥者其膏已成即便住火將膏滴入水中試軟硬得中如老加熱油如稀加炒丹每各少許漸漸加火務要冬夏老嫩得所爲佳候烟盡掇下鍋來方下阿魏切成薄片

散於膏上化盡次下乳没輕粉攪勻傾入水中以柳棍摟成一塊再換冷水浸片時乘溫每膏半觔扯拔百轉成塊又換冷水浸隨用時每取一塊銅杓內復化隨便攤貼至妙

方歌　太乙膏治諸般毒一切瘡傷俱貼之白芷當歸赤芍藥元參桂没柳槐枝大黃木鼈輕生地阿魏黃丹乳血餘

白膏藥

此膏專貼諸瘡腫毒潰破流膿甚效

淨巴豆肉十二兩　蓖麻子十二兩去殼

香油三觔　蝦蟇五個各帶人髮一團

活鯽魚十尾

先將巴豆肉蓖麻子入油內浸三日再將蝦蟇浸一宿臨熬時入活鯽魚共煠焦去渣淨慢火熬油滴水成珠離火傾於淨鍋內再加官粉二觔半乳香末五錢不時攪之冷定爲度用時重湯燉化薄紙攤貼

方歌　白膏專貼諸瘡毒巴豆蓖麻浸入油活鯽蝦蟇同煠後再將官粉乳香投

化腐紫霞膏

此膏善能穿透諸毒凡發背已成瘀肉不腐及不作膿者用此膏以腐爛瘀肉穿潰膿毒其功甚效

金頂砒五分　潮腦一錢

螺螄肉二兩用肉晒乾爲末

輕粉三錢　血竭二錢

巴豆仁五錢研用白仁

右各爲末共碾一處磁罐收貯臨用時用蔴
油調搽頑硬肉上以棉紙蓋上或膏貼俱可

方歌 化腐紫霞膏穿毒透膿化腐效如神金礬潮
腦螺螄肉粉蝎蔴仁巴豆仁

貝葉膏

此膏貼癰疽發背一切潰爛諸瘡

蔴油一觔　血餘雞子大一個

白蠟一兩

右將血餘以文火煠化去渣下火入白蠟溶

化候溫用棉紙剪塊三張張張於油蠟內蘸
之貼於磁器幇上用時揭單張貼患處日換
八九次力能定痛去腐生肌其功甚速切勿
忽之

方歌 貝葉膏治潰爛瘡去腐生肌功效強血餘蔴
油煎渣去下火入蠟化貼良

碧螺膏

此膏治下部濕瘡疥癬并結毒痰串癧瘡

松香取嫩白者佳爲末篩過用銅盆以猪油遍搽之入水至滾入香不住手攪之以香沉底爲度卽傾冷水中拔扯百十次以不斷爲度

右將蔴油煎滴水成珠入松香一觔文火溶
化看老嫩取起離火住滾徐徐入糠青膽礬
各淨末五錢以柳枝左攪勻爲度如老加熟
猪油二三錢用綠紙薄攤貼之

方歌 碧螺膏治疥濕瘡猪脂蔴油嫩松香再入糠
青膽礬末綠紙攤貼效非常

麻藥類方

瓊酥散

此散治一切腫毒等瘡服之開鍼不痛

蟾酥一錢　半夏六分

鬧羊花六分　胡椒一錢八分

川椒一錢八分　蓽茇一錢

川烏一錢八分

右七味共爲細末每服半分黃酒調服如欲
大開加白酒藥一丸

方歌 瓊酥散是麻人藥開鍼不痛用蟾酥蓽茇鬧
羊生半夏胡椒川椒與川烏

整骨麻藥

此藥開取箭頭服之不痛

麻黃　胡茄子

薑黃　川烏

草烏各等分　鬧羊花倍用

右六味共爲末每服五分茶酒任下欲解用甘草煎湯服之卽甦

方歌　整骨麻藥取箭頭不傷筋骨可無憂麻黃薑黃胡茄子川草烏與鬧羊投

外敷麻藥

此藥敷於毒上麻木任割不痛

川烏尖五錢　草烏尖五錢

蟾酥四錢　胡椒一兩

生南星五錢　生半夏五錢

一方加蓽茇五錢　一方加細辛一兩

右爲末用燒酒調敷

方歌　外敷麻藥調燒酒刀割不痛效堪神川草烏蟾椒星夏一加蓽茇一加辛

去腐類方

腐者壞肉也諸書云腐不去則新肉不生蓋以腐能浸淫好肉也當速去之如遇氣實之人則用刀割之取效若遇氣虛之人則惟恃藥力以化之蓋去腐之藥乃瘍科之要藥也

白降丹

此丹治癰疽發背一切疔毒用少許瘡大者用五六釐瘡小者用一二釐水調敷瘡頭上初起者立刻起皰消散成膿者卽潰腐者卽脫消腫誠奪命之靈丹也

硃砂　雄黃各二錢

水銀一兩　硼砂五錢

火消　食鹽

白礬　皂礬各一兩五錢

先將硃雄硼三味研細入鹽礬硝皂水銀共研勻以水銀不見星爲度用陽城罐一個放微炭火上徐徐起藥入罐化盡微火逼令乾取起如火大太乾則汞走如不乾則藥倒下

無用其難處在此再用一陽城礶合上用棉紙截半寸寬將礶子泥草鞋灰光粉三樣研細以鹽滷滷汁調極濕一層泥一層紙糊合口四五重及糊有藥礶上二三重地下挖一小潭用飯碗盛水放潭底將無藥礶放於碗內以瓦挨潭口四邊齊地恐炭灰落碗內也有藥礶上以生炭火蓋之不可有空處約三炷香去火冷定開看約有一兩外藥矣煉時礶上如有綠烟起急用筆蘸礶子鹽泥固之

紅升丹

此丹治一切瘡瘍潰後拔毒去腐生肌長肉瘡口堅硬肉黯紫黑用丹少許鷄翎掃上立刻紅活瘍醫若無紅白二丹決難立刻取效

硃砂五錢　雄黃五錢

水銀一兩　火消四兩

白礬一兩　皂礬六錢

先將二礬火消研碎入大銅杓內加火消一小盃炖化一乾即起研細另將汞硃雄研細至不見星為度再入消礬末研勻先將陽城礶用紙筋泥搪一指厚陰乾常輕輕撲之不使生裂紋搪泥礶子泥亦可用如有裂紋以礶子泥補之極乾再晒無裂紋方入前藥在內礶口以鐵油盞蓋定加鐵梁盞上下用鐵襻鐵絲紮緊用棉紙撚條蘸鹽周圍塞礶口縫間外用熟石膏細末醋調封固盞上加炭火二塊使盞熱礶口封固易乾也用大釘三根釘地下將礶子放釘上礶底下置堅大炭

火一塊外砌百眼爐升三炷香第一炷香用底火如火大則汞先飛上二炷香用大半礶火以筆蘸水擦盞第三炷香火平礶口用扇搧之頻頻擦盞勿令乾乾則汞先飛上三香完去火冷定開看方氣足盞上約有六七錢刮下研極細磁礶盛用再預以鹽滷汁調礶子稀泥用筆蘸泥水掃礶口周圍勿令洩氣蓋恐有綠烟起汞走也綠烟一起即無用矣

方歌　白降丹為奪命丹拔膿化腐立時安硃雄汞

與硼砂入還有消鹽白皂礬若去硼鹽紅升是長肉生肌自不難

元珠膏

此膏治腫瘍將潰塗之膿從毛孔吸出已開鍼者用撚蘸送孔內呼膿腐不淨塗之立化

木鱉子肉十四個　蟹螯八十一個

柳枝四十九寸　驢甲片三錢

草烏一錢　蔴油二兩

右藥浸七日文火煠枯去渣入巴豆仁三個煎至黑傾於鉢內研如泥加麝香一分攪勻

入罐內收用

方歌　呼膿化腐用元珠木鱉蟹螯共柳枝驢甲草烏油內浸煠枯巴豆麝香施

生肌類方

凡大毒潰爛內毒未盡若驟用生肌則外實內潰重者遏毒內攻輕者反增潰爛雖即收口其於旁處復生大疽是知毒未盡不可驟用生肌藥也只以貝葉膏貼之頻換俟生肉珠將方用生肌藥如元氣弱者須當大補以培元氣

生肌定痛散

此散治潰爛紅熱腫痛有腐者用此化腐定痛生肌

生石膏一兩　為末用甘草湯飛五七次

辰砂三錢　冰片二分

硼砂五錢

右四味共為末撒患處

方歌　生肌定痛治潰爛腫疼紅熱實相宜石膏飛過辰砂用共入冰硼細撒之

輕乳生肌散

此散治潰爛紅熱腫痛腐脫者用此定痛生肌

石膏煅一兩　血竭五錢

乳香五錢　輕粉五錢

冰片一錢

有水加龍骨白芷各一錢

不收口加雞內金炙一錢、

右爲末撒之

方歌　輕乳生肌治腐脫石膏血竭乳輕冰若然有水加龍芷收口須添雞內金

薑礬散

此散治一切諸瘡發癢者用此撒之甚效

枯礬　乾薑

右等分爲末先用細茶食鹽煎湯洗之後用此散撒之

冷瘡不收口者用乾薑一味爲末撒患處覺熱如烘生肌甚效

方歌　薑礬最治諸瘡癢先用鹽茶煎洗之若是冷瘡不收口乾薑一味撒生肌

腐盡生肌散

此散治一切癰疽等毒諸瘡破爛不斂者撒上即愈

兒茶　乳香

沒藥各三錢　冰片一錢

麝香二分　血竭三錢

旱三七三錢

右爲末撒之

有水加龍骨煅一錢

欲速收口加珍珠一兩

蟹黃二錢 法取團臍螃蟹蒸熟取黃晒乾取用

或用豬脂油半觔去渣加黃蠟一兩溶化傾碗內稍溫加前七味調成膏攤貼癰疽破爛等證

若杖傷則旱三七倍之

一用鮮鹿腿骨紙包灰內煨之以黃脆爲度如黑焦色則無用矣爲細末撒之生肌甚速

方歌　腐盡生肌瘡不斂兒茶乳沒冰麝香血竭三七水加骨收口珍珠共蟹黃或用豬油溶黃蠟調前七味貼之良一用火煨鹿腿骨爲散生肌效甚長

月白珍珠散

此散治諸瘡新肉已滿不能生皮及湯火傷痛并下疳腐痛等證

青缸花五分　輕粉一兩

珍珠一錢

右爲末撒之

下疳腐爛用豬脊髓調搽

一用雞子清傾瓦上晒乾取清爲末撒之

方歌 月白珍珠皮不長并醫湯火下疳瘡青釘輕粉珍珠共豬髓調搽真妙方一用雞清傾瓦上晒乾爲末撒之良

五色靈藥

此五色靈藥治癰疽諸瘡已潰餘腐不盡新肉不生撒之最效

食鹽五錢　黑鉛六錢

枯白礬　枯皂礬

水銀　火消各二兩

先將鹽鉛鎔化入水銀結成砂子再入二礬火消同炒乾研細入鉛汞再研以不見星爲度入罐內泥固濟封口打三炷香不可太過不及一宿取出視之其白如雪約有二兩爲火候得中之靈藥

如要色紫者加硫黃五錢

要黃色者加明雄黃五錢

要色紅者用黑鉛九錢水銀一兩枯白礬二兩火消三兩辰砂四錢明雄黃三錢

升煉火候俱如前法

凡升打靈藥硝要炒燥礬要煅枯

一方用燒酒煮乾炒燥方研入罐

一法凡打出靈藥倍加石膏和勻復入新罐內打一枝香用之不痛

方歌 五色靈藥白用鹽黑鉛硝汞皂枯礬欲成紫

色硫黃入黃者雄黃加五錢紅去皂鹽鉛重用硃砂飛藍必須添

生肌玉紅膏

此膏治癰疽發背諸般潰爛棒毒等瘡用在已潰流膿時先用甘草湯甚者用豬蹄湯淋洗患上軟絹挹淨用抿挑膏於掌中捺化遍搽新肉上外以太乙膏蓋之大瘡洗換二次內兼服大補氣血之藥新肉即生瘡口自斂此外科收

斂藥中之神藥也

當歸二兩　白芷五錢

白蠟二兩　輕粉四錢

甘草一兩二錢　紫草二錢

瓜兒血竭四錢　麻油一觔

右將當歸白芷紫草甘草四味入油內浸三日大杓內慢火熬微枯色細絹濾淸將油復入杓內煎滾入血竭化盡次下白蠟微火亦化用茶鍾四個預放水中將膏分作四處傾

入鍾內候片時方下研極細輕粉各投一錢攪勻候至一日夜用之極效

方歌　生肌玉紅膏最善潰爛諸瘡搽即收歸芷蠟輕甘紫草瓜兒血竭共麻油

瑩珠膏

此膏治潰瘍去腐定痛生肌并楊梅瘡杖臁瘡下疳等證

白蠟三兩　豬脂油十兩

輕粉末一兩五錢　樟冰末一兩五錢

先將白蠟脂油溶化離火候溫入輕粉樟冰攪勻候稍凝再入冰片末一錢攪勻成膏罐收聽用　凡用先將甘草苦參各三錢水煎洗淨患處貼膏

杖瘡用荊川紙攤極薄貼之熱則易之其疔瘀即散疼痛立止

楊梅瘡加紅粉二錢

頑瘡乳岩加銀硃一兩

臁瘡加水龍骨三錢或龍骨四錢

方歌　瑩珠膏用治潰瘡定痛生肌功效強白蠟豬脂樟冰粉楊頑乳杖并臁瘡

呂祖一枝梅

此藥治男婦大人小兒新久諸病生死難定之間用芡實大一餅貼印堂之中點官香一枝香盡去藥已後一時許視貼藥處有紅斑暈色腫起飛散謂之紅霞捧日病雖危篤其人不死如貼藥處一時後不腫不紅皮肉照舊不變謂之白雲漫野病雖輕淺終歸冥路小兒急慢驚風

一切老幼痢疾俱可貼之凡病用之皆可預知
生死也

雄黃五錢　巴豆仁五錢不去油
硃砂三分　五靈脂三錢
銀朱一錢五分　蓖麻仁五分
麝香三分

右各研細於端午日淨室中午時共研加油
燕脂為膏磁盒收藏勿經婦人之手臨用豆
大一圓捏餅貼印堂中其功立見用過餅送

入河中

方歌　呂祖一枝梅驗病定人生死印堂中紅斑腫
起斯為吉無腫無紅命必終藥用五靈蓖麻
子砂銀巴豆麝香雄

御纂醫宗金鑑卷六十三

編輯外科心法要訣目錄

頭部
百會疽
透腦疽
侵腦疽
佛頂疽
額疽
勇疽

鬢疽
夭疽銳毒
耳後疽
耳發
耳根毒
玉枕疽
腦後發
腦鑠
油風

白屑風
禿瘡
螻蛄癤
髮際瘡

面部
顴瘍
顴疽
顴疔
面發毒
面遊風
痄腮
頰瘍
骨槽風
發頤
時毒
鳳眉疽
眉心疽
龍泉疽

虎鬚毒
燕窩瘡
雀斑
黑痣
黧黑皯黯

御纂醫宗金鑑卷六十三

編輯外科心法要訣

百會疽圖

頭部

百會疽

百會疽在巔頂結經屬督脈百會穴初如粟米漸
如錢甚似葡萄堅似鐵高腫熱實清毒火平塌陽
虛溫補怯腫連耳項動痰聲七日不潰命必絕

註 此百會疽又名玉頂發生在巔頂正中屬督
脈經百會穴由膏粱太過火毒凝結而成初
起形如粟米漸腫根大如錢甚則形似葡萄
堅硬如鐵高尖紅腫焮熱疼痛瘡根收束憎
寒壯熱大渴隨飲隨乾口苦脣焦便秘煩躁
脈見洪數者此屬氣實宜服黃連消毒飲以
清毒火外敷冲和膏若漫腫平塌紫暗堅硬
焮痛根散惡寒便瀉脈見細數者此屬陽虛
宜服十全大補湯以溫補之外敷回陽玉龍
膏若面赤過煩口乾不渴脣潤者此屬陽虛
浮泛宜服桂附地黃丸引火歸源更用生附
子餅罨兩足心涌泉穴各灸五壯以洩其毒
初起貼琥珀膏已潰貼黃靈藥太乙膏蓋貼

腐盡再易生肌之藥治之若腫連耳項痰如
拽鋸七日無膿不潰神昏者命必絕矣

黃連消毒飲

蘇木二分　甘草三分
陳皮二分　桔梗五分
黃芩五分　黃蘗五分
人參三分　藁本五分
防己五分　防風四分
知母四分　羌活一分

獨活四分　連翹四分
黃連一錢　生地黃四分
黃耆二錢　澤瀉二分
當歸尾四分

水煎食遠溫服

方歌 黃連消毒清毒火諸般火證服最良蘇木甘草陳皮桔芩藥人參藁二防知母羌活獨活等連翹黃連生地黃黃耆澤瀉當歸尾服後最忌飲寒凉

沖和膏
回陽玉龍膏俱見腫瘍門
生肌散
十全大補湯
黃靈藥
太乙膏俱見潰瘍門
桂附地黃丸
附子餅見前灸法
琥珀膏見後髮際瘡

透腦侵腦疽圖

透腦疽

透腦疽生百會前形如鷄子痛而堅軟漫膿稀虛塌陷紅硬膿稠實頂尖

註 此證生於百會穴之前顖門之際亦由督脈經火毒而成初如粟米漸如鷄子堅硬疼痛瘡頂塌陷根脚漫腫色暗者屬虛若色紅腫硬頂尖膿稠者屬實速潰者順遲潰透腦髓者逆其膿潰内外治法俱按百會疽

侵腦疽

侵腦疽生透腦旁濕火攻發屬太陽穴名五處知其位紅腫紫逆要審詳

註 此疽生於透腦疽側下由太陽膀胱經濕火而成穴名五處紅腫高起焮熱疼痛膿色如蒼蠟者屬氣血俱實順而易治若紫陷無膿根脚散大者屬氣血兩虛逆而難治初起宜服荆防敗毒散汗之次服內疎黃連湯下之將潰服托裏透膿湯已潰服托裏排膿湯外貼琥珀膏圍敷冲和膏其餘內外治法俱按

癰疽潰瘍門

托裏透膿湯

人參 白朮土炒

穿山甲炒研 白芷各一錢

升麻 甘草節各五分

當歸二錢 生黃耆三錢

皂角刺一錢五分 青皮炒五分

水三鍾煎一鍾病在上部先飲煮酒一鍾後熱服此藥病在下部先服藥後飲酒瘡在中部藥內兌酒半鍾熱服

方歌 托裏透膿治癰疽已成未潰服之宜參朮甲芷升麻草當歸黃耆刺青皮

荆防敗毒散見項部腦疽

內疎黃連湯

冲和膏俱見腫瘍門

托裏排膿湯見項部魚尾毒

琥珀膏見髮際瘡內

佛頂疽圖

佛頂疽

佛頂疽屬督上星陰陽不調毒熱成不論虛實皆險證潰爛黑陷必然凶

註此證一名項門疽生於頭頂顖門之前屬督脈經上星穴由藏府陰陽不調熱毒上壅而成色紫堅硬腫痛脈洪大而數者爲實脈微細而數者爲虛皆屬險證若潰爛黑陷六脈散大神昏譫語二便閉結者爲逆首尾內外治法俱按百會疽

額疽圖

額疽

額疽生額火毒成左右膀胱正督經頭陷焦紫無膿重高聳根收紅腫輕

註此證生前額正中者屬督脈經或生左右額角者屬膀胱經總由火毒而成初起瘡頂塌陷乾焦色紫不生大膿者其勢重而屬險也若紅腫高聳根收束者其勢輕而屬順也初服荊防敗毒散汗之次服仙方活命飲消之將潰氣虛者宜服托裏透膿湯氣實者宜

服透膿散外敷冲和膏已潰宜服托裏排膿湯外貼琥珀膏其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

荊防敗毒散見項部腦疽

仙方活命飲見腫瘍門

托裏透膿湯見前侵腦疽

透膿散

冲和膏俱見腫瘍門

托裏排膿湯見項部魚尾毒

琥珀膏見髮際瘡門

勇疽圖

勇疽

勇疽背後太陽穴膽經怒火伏鼠形七日不潰毒攻眼黃膿爲吉黑血凶

註 此證一名勇疽又名腦發疽屬足少陽膽經怒火而成生於目小眥之後五分生在太陽穴者無論左右皆可以生初起如粟漸腫疼痛形如伏鼠面目浮腫七日作膿不潰火毒攻睛腐爛損目若十一日鍼出黃膿毒從膿解爲順易治若出紫黑血者係氣虛不能化

毒爲逆難治初服仙方活命飲清解之毒甚宜服內疎黃連湯外敷二味拔毒散其將潰已潰內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門潰後避風忌水

仙方活命飲

內疎黃連湯

二味拔毒散俱見腫瘍門

鬢疽圖

鬢疽

鬢疽三焦膽二經證由慾怒火凝成此經氣多而血少潰腐惟宜少見膿

注 此證發於鬢角屬手少陽三焦足少陽膽二經由於相火妄動外受風熱更因性情急怒慾念火生凝結而成此二經俱屬氣多血少最難腐潰更兼鬢角肌肉澆薄不宜鍼灸候其自潰潰後不宜多見膿膿多者過耗血液難斂初起宜服柴胡清肝湯解之膿成者宜托裏消毒散托之外敷二味拔毒散已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門

柴胡清肝湯

柴胡　生地各一錢五分

當歸二錢　赤芍一錢五分

川芎一錢　連翹去心二錢

牛蒡子炒研一錢五分　黃芩一錢

生梔子研　天花粉

甘草節　防風各一錢

水二鍾煎八分食遠服

方歌 柴胡清肝治怒證宜血疎通解毒良四物生用柴翹蒡黃芩梔粉草節防

托裏消毒散

二味拔毒散 俱見腫瘍門

天疽銳毒圖

天疽 銳毒

天疽居左銳毒右經屬膽腑生耳後謀慮太過鬱火成此處肉薄當急救

注 此二證左爲天疽右爲銳毒俱生耳後一寸三分高骨之後天者不盡天年謂之天銳者如鋒刃之銳利言毒甚也得此二證愈者甚少初起俱如黍粒漸腫如瓜堅硬平塌紫暗不澤較諸瘡疼痛倍增名雖各異而左右耳後俱屬足少陽膽經由謀慮不決鬱火凝結而成此處皮肉澆薄氣多血少終屬險證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添必致不救若紅腫速潰者順堅硬黑陷者逆如果投方應證亦只十全四五也初宜服柴胡清肝湯消解之膿將成宜服托裏消毒散潰者十全大補湯托補之外俱敷烏龍膏其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門 淵液膽經穴名

柴胡清肝湯 見前鬢疽

托裏消毒散

烏龍膏 俱見腫瘍門

十全大補湯 見潰瘍門

耳後疽圖



耳後疽

耳後疽生耳摺間三焦風毒膽火炎紅腫有頭焮為順黑陷譽痛冷潰難

註 此證生於耳摺之間無論左右屬三焦經風毒兼膽經怒火上炎而成初起如粟漸增腫痛小者如杏大者如桃若紅腫有頭焮熱易潰稠膿者為順若黑陷堅硬譽痛引腦甚則項頰肩肘俱痛不熱遲潰紫血者為逆初治法同天疽已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門又有初起失於托裏或誤食寒涼則毒不能外發遂攻耳竅膿從耳竅出者名為內潰屬虛多服十全大補湯大抵少年得此證者其愈最緩老年得此證者易於成漏

十全大補湯見潰瘍門

耳發圖

耳發

耳發三焦風熱成初椒漸若蜂房形赤腫疼痛生
輪後黃膿屬吉紫血凶

註此證生於耳後屬三焦經風熱相搏而成初如椒粒漸腫若蜂房將腐亦多眼孔焮赤疼痛腫連耳輪甚發者乃癰疽之毒甚者也不可恥其自潰恐潰遲膿通耳竅當在十一日後剪破瘡頂出黃白膿者屬吉為順出紫鮮血者屬凶為逆初起俱宜服仙方活命飲消之外敷二味拔毒散其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

仙方活命飲見腫瘍門

二味拔毒散見腫瘍門

耳根毒圖

耳根毒

耳根毒初痰核形腫如伏鼠焮赤疼三焦風火膽
怒氣暴腫潰速非疽癰

註此證生於耳後初起形如痰核漸增腫勢狀如伏鼠焮赤疼痛由三焦風火膽經怒氣上冲凝結而成但此證暴腫潰速根淺易愈非若癰疽之勢大毒甚也初起寒熱往來宜服荊防敗毒散汗之發熱痛甚者仙方活命飲消之膿成者服透膿散虛者服托裏透膿湯

潰後外撒紅靈藥貼太乙膏膿盡換搽生肌
玉紅膏生肌斂口若遇虛者膿水清稀或瘡
口斂遲即服香貝養榮湯補之自斂

仙方活命飲 見腫瘍門

荊防敗毒散 見項部腦疽

透膿散 見腫瘍門

托裏透膿湯 見前侵腦疽

紅靈藥

生肌玉紅膏

太乙膏 俱見潰瘍門

香貝養榮湯 見項部石疽

玉枕疽圖

玉枕疽

玉枕疽屬督脈經證由積熱風邪乘枕骨微上腦
戶穴高腫爲順紫陷凶

註 此證由督脈經積熱外受風邪凝結而成生
在玉枕骨尖微上腦戶穴初起如粟麻癢相
兼寒熱往來口渴便秘漸增堅硬大者如茄
小如鵝卵紅活高腫潰出稠膿者屬吉而順
也若紫暗塌陷潰出血水者屬凶險也初則
俱服神授衛生湯消解之虛者宜服托裏消

毒散外敷冲和膏其餘內外治法俱按癰疽
腫潰瘍門

神授衛生湯

托裏消毒散

冲和膏 俱見腫瘍門

腦後發圖

腦後發

腦後發生在督經熱結風府粟腫疼紅活易潰稠膿順紫暗難潰血水凶

註此證屬督脈經枕骨之下風府穴由積熱外受風邪凝結而成初如粟米焮腫作疼痛引頭項肩項氣粗鼻塞漸大如盤如盌紅活速潰出稠膿者順紫暗難潰時津血水者逆初起內外治法按玉枕疽其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門

腦鑠圖

腦鑠

腦鑠項後如橫木精凋毒火上乘生黑如竈烟牛脖硬木痛未腐水流清急施桑艾法至痛火燎刺痛屬陽經速服仙方活命飲若見七惡定然凶

注 此證生於督脈經風府穴由陰精枯涸毒火乘之而生初起形如椒粒堅硬紫暗漸腫如橫木甚則上至巔頂下至大椎色如竈烟硬若牛脖未膿皮先腐爛時流清水肌肉氷冷輕者木痛重者毒氣將陷全不知疼宜急施

桑柴烘法或艾壯灸法以痛爲度速服仙方活命飲以舒解其毒七日之後不發長不生大膿者宜服十全大補湯救之投補藥不應者難治若初起熱如火燎焮痛屬陽證速服黃連消毒飲外敷回陽玉龍膏此證若首尾純見五善之證者屬順見七惡之證者屬逆也其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門

桑柴烘法

艾壯灸法 俱見首卷

仙方活命飲 見腫瘍門

十全大補湯 見潰瘍門

黃連消毒飲 見前百會疽

回陽玉龍膏 見腫瘍門

油風圖

油風

油風毛髮乾焦脫皮紅光亮癢難堪毛孔風襲致傷血養眞海艾砭血瘥

註此證毛髮乾焦成片脫落皮紅光亮癢如蟲行俗名鬼剃頭由毛孔開張邪風乘虛襲入以致風盛燥血不能榮養毛髮宜服神應養眞丹以治其本外以海艾湯洗之以治其標若耽延年久宜鍼砭其光亮之處出紫血毛髮庶可復生

神應養眞丹

羌活　木瓜

天麻　白芍

當歸　菟絲子

熟地酒蒸搗膏　川芎

等分爲末入地黃膏加蜜丸桐子大每服百丸溫酒或鹽湯任下

方歌神應養眞治油風養血消風髮復生羌歸木瓜天麻芍菟絲熟地與川芎

海艾湯

海艾　菊花

藁本　蔓荊子

防風　薄荷

荊穗　藿香

甘松各二錢

水五六碗同藥煎數滾連湯共入厰口鉢內先將熱氣薰面候湯少溫用布蘸洗日洗二三次洗後避風忌魚腥發物

方歌海艾湯治油風癢先薰後洗善消風菊藁蔓荊風薄穗藿香海艾與甘松

白屑風圖



白屑風

白屑風生頭與面燥癢日久白屑見肌熱風侵成燥化換肌潤肌醫此患

註此證初生髮內延及面目耳項燥癢日久飛起白屑脫去又生由肌熱當風風邪侵入毛孔鬱久燥血肌膚失養化成燥證也宜多服祛風換肌丸若肌膚燥裂者用潤肌膏擦之甚效

祛風換肌丸

大胡麻　蒼朮炒
牛膝酒洗　石菖蒲
苦參　何首烏生
花粉　威靈仙各二兩
當歸身　川芎
甘草生各一兩

右為細末陳煮酒跌丸菉豆大每服二錢白滾水送下忌魚腥發物火酒

方歌 換肌丸治白屑風燥癢日增若蟲行風燥血分失潤養叠起白屑落復生歸芎胡麻蒼朮膝菖蒲花粉草威靈苦參何首烏為末煮酒跌丸菉豆形

潤肌膏

香油四兩　奶酥油二兩
當歸五錢　紫草一錢

將當歸紫草入二油內浸二日文火炸焦去渣加黃蠟五錢溶化盡用布濾傾盆內不時用柳枝攪冷成膏每用少許日擦二次

方歌

潤肌膏擦白屑風，肌膚燥癢用更靈，酥香二油歸紫草，煠焦加蠟濾攪凝。

禿瘡圖

禿瘡

禿瘡風熱化生蟲，騷癢難堪却不疼，白痂如錢生髮內，宜服通聖擦膏靈。

〔注〕此證頭生白痂，小者如豆，大者如錢，俗名錢癬，又名肥瘡，多生小兒頭上，騷癢難堪，却不疼痛，日久延漫成片，髮焦脫落，即成禿瘡，又名瘌頭瘡。由胃經積熱生風而成，宜用防風通聖散料，醇酒浸焙為細末，每服一錢或二錢，量其壯弱用之，食後白滾湯調下，服至頭上多汗為驗。初起肥瘡，宜擦肥油膏，用久則效。已成禿瘡者，先宜艾葉鴿糞煎湯洗淨瘡痂，再用豬肉湯洗之，隨擦躑躅花油，以殺蟲散風。蟲死則癢止，風散則髮生，血潮則肌膚潤，久擦甚效。

防風通聖散

防風　當歸

白芍酒炒　芒硝

大黃　連翹

桔梗　川芎
石膏煅　黃芩
薄荷　麻黃
滑石各一兩　荊芥
白朮土炒　山梔子各二錢五分
甘草生二兩
共為末

方歌　防風通聖治禿瘡胃經積熱致風傷連翹梔子麻黃桔白朮歸芎滑石防黃芩甘草石膏芍薄荷荊芥並消黃共末酒拌晒乾碾白湯調服發汗良

肥油膏

番木鱉六錢　當歸
藜蘆各五錢　黃蘗
苦參　杏仁
狼毒　白附子各三錢
鯉魚膽二個

用香油十兩將前藥入油內熬至黑黃色去渣加黃蠟一兩二錢溶化盡用布濾過罐收每用少許用藍布裹於手指蘸油擦瘡

方歌　肥油膏能治肥瘡散風殺蟲長髮強黃蘗苦參白附子番鱉狼毒杏仁良藜蘆當歸鯉魚膽熬焦入蠟實奇方

躑躅花油方

躑躅花根四兩搗爛用菜油一盌煠枯去渣加黃蠟少許布濾候冷青布蘸擦日用三次氈帽戴之勿令見風

方歌　躑躅花油療禿瘡驅蟲止癢擦之良躑躅花根研極爛菜油煠枯入蠟強

螻蛄癤圖

螻蛄癤

螻蛄癤即蟺拱頭勢小勢大各有由胎毒堅小多
衣膜暑熱形大功易收

註此證多生小兒頭上俗名貉貐未破如曲蟺拱頭破後形似螻蛄串穴有因胎中受毒者其瘡腫勢雖小而根則堅硬潰破雖出膿水而堅硬不退瘡口收斂越時復發本毒未罷他處又生甚屬纏綿難歛宜用三品一條鎗插於孔內化盡堅硬衣膜換撒生肌散貼玉紅膏以收歛之不致再發也亦有暑熱成毒者大如梅李相聯三五枚潰破膿出其口不歛日久頭皮串空亦如螻蛄串穴之狀宜貼紺珠膏拔盡膿毒將所串之空皮剪通使無藏膿之處用米泔水日洗一次乾撒生肌散貼萬應膏甚效有因瘡口開張日久風邪襲入以致瘡口周圍作癢抓破津水相延成片形類黃水瘡者宜用敗銅散搽之忌魚腥發物

三品一條鎗

白砒一兩五錢　明礬二兩

砒礬二味共研細末入小罐內加炭火煅紅青烟已盡旋起白烟片時約上下紅徹住火取罐安地上一宿取出約有砒礬淨末一兩加雄黃二錢四分乳香一錢二分共研極細厚糊搓成線條陰乾瘡有孔者插入孔內無孔者先用鍼通孔竅早晚插藥二條插至三日後孔大者每插十餘條插至七日孔內藥

條滿足方住患處四邊自然裂開大縫共至
十四日前後其堅硬衣膜及疔核瘰癧痔漏
諸管自然落下隨用湯洗搽玉紅膏虛者兼
服健脾補劑自然收斂

方歌 神奇三品一條鎗能醫堅硬衣膜瘡雄乳白
砒礬生用研末煅煉搓條良

敗銅散

化銅舊罐子一個研為細末用香油調敷自能
滲濕祛癢瘡口易斂

方歌 敗銅散治潰風傷騷癢破津脂水瘡化銅舊
罐研細末香油調敷滲濕良

紺珠膏

萬應膏

生肌散

玉紅膏 俱見潰瘍門

髮際瘡圖

髮際瘡

髮際瘡生髮際邊形如黍豆痒疼堅頂白肉赤初
易治胖人肌厚最纏綿

註 此證生項後髮際形如黍豆頂白肉赤堅硬
痛如錐刺癢如火燎破津膿水亦有浸淫髮
內者此由內鬱濕熱外兼受風相搏而成也
初宜紺珠丹汗之次用酒製防風通聖散清
解之外搽黃連膏效惟胖人項後髮際肉厚
而多摺紋其髮反刺瘡內因循日久不瘥又

兼受風寒凝結形如臥瓜破爛津水時破時
斂俗名謂之肉龜經年不愈亦無傷害常用
琥珀膏貼之可稍輕也

琥珀膏

定粉一兩　血餘八錢
輕粉四錢　銀朱七錢
花椒十四粒　黃蠟四兩
琥珀末五分　麻油十二兩

將血餘花椒麻油煠焦撈去渣下黃蠟溶化

盡用夏布濾淨傾入磁盤內預將定粉銀朱
輕粉琥珀四味各研極細共合一處徐徐下
入油內用柳枝不時攪之以冷為度綿燕脂
攤貼紅綿紙攤貼亦可

方歌　琥珀膏能治諸瘡活瘀解毒化腐長定血輕
朱椒蠟珀麻油熬膏亦療瘍

紺珠丹即萬靈丹見腫瘍門

防風通聖散見首禿瘡

黃連膏見鼻部鼻瘡

頭風傷目

頭風引目眉棱痛風火寒痰有四因或由楊梅毒
攻頂或因產後被風侵

註　此證畏寒惡風其痛走注不定得煖少減者
風痛也寒熱口苦大渴二便秘不眠者火痛
也手足厥冷面青脣白氣逆不渴小水白者
寒痛也身重肢痠胸煩作嘔口吐痰沫者痰
痛也以上四證舊有古方羌活沖和湯倍川
芎加菊花隨經形證加引治之倘若因循失

治風攻眉棱痠痛眼皮跳動漸攻睛珠起藍
雲遮睛多致損目若只眉棱痠痛以碧雲散
常吸之甚效

羌活沖和湯

防風　白芷各一錢
細辛　甘草生各五分
生地　蒼朮
黃芩各一錢　羌活一錢五分
川芎一錢

引加葱頭三根生薑一片紅棗肉二枚水煎
食遠服
痛由頂後起屬膀胱經倍羌活加藁本
痛由耳後起屬膽經加柴胡
痛由太陽牽引頭額兩目屬胃經倍白芷加
葛根煅石膏
頭痛兼有腹痛身重屬脾經倍蒼朮
頭痛兼有足冷氣逆屬腎經倍細辛甚者加
麻黃生附子減黃芩

頭痛兼有嘔涎沫者手足厥冷屬肝經加吳
茱萸
頭痛有火熱渴倍酒洗黃芩加生石膏
便秘者加生大黃
頭痛吐痰涎四肢不冷者加半夏
方歌 沖和頭風風傷目風火寒痰四因生日久眉
稜痠痛跳遮睛損目此能清防風白芷細辛
草生地蒼芩羌活芎詳在隨加引經藥葱薑
紅棗水煎成

碧雲散
川芎 鵝不食草各一兩
細辛 辛夷各二錢
青黛一錢
共爲細末患者口噙凉水令人以蘆筒吹入
左右鼻孔内取嚏爲效每用少許鼻常吸之
其效緩
方歌 碧雲散去頭風證眉稜痠痛更堪醫鵝不食
草辛黃黛芎細同研不時吸

貼兩太陽穴法 治頭痛如破
雀腦川芎 白附子各等分
研末葱汁調捫紙攤貼左右太陽穴效
產後風寒侵腦頭痛不可發汗宜用四物湯倍
川芎加荊芥穗服之其效緩
楊梅毒入腦髓以致頭痛者治在本門
四物湯見潰瘍門

額瘍額疽圖

面部

額瘍額疽

額瘍額疽漸榴形風熱積熱小腸經瘍起焮紅浮腫痛疽紫漫硬木麻疼

註此二證發於額骨尖處屬小腸經不論左右初小漸大如榴發瘍分者由風熱而生初起焮紅浮腫疼痛七日即潰名爲額瘍毒輕根淺易愈發陰分者由積熱而生色紫漫腫堅硬麻木疼痛三七方潰名爲額疽毒甚根深難愈瘍證初宜仙方活命飲疽證初宜內疏黃連湯或麥靈丹其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

仙方活命飲

內疏黃連湯

麥靈丹 俱見腫瘍門

額疔圖

顴疔

顴疔初起粟米形證由陽明火毒生堅硬頂凹根深悶寒熱交作麻癢疼

註此證生在顴骨之間屬陽明胃經不論左右初如粟米黃色小皰次如赤豆頂凹堅硬按似疔頭麻癢疼痛多因過食炙煿藥酒以致胃經積火成毒而生初宜蟾酥丸或麥靈丹汗之次服黃連消毒飲清之外治法同疔門凡疔皆屬迅速之證初覺即當急治遲則毒火攻心令人昏憒譫語惡證悉添多致不救

蟾酥丸 見疔瘡門

麥靈丹 見腫瘍門

黃連消毒飲 見頭部百會疽

面發毒圖

面發毒

面發毒在頰車生初少漸多赤豆形腫硬焮疼津黃水溢屬風熱客陽明

註此證生面上頰車骨間初生一個漸發數枚形如赤豆色紅焮痛堅硬似疔時津黃水由風熱客於陽明上攻而成初宜服荊防敗毒散汗之若胃火盛則唇焦口渴便燥者即服涼膈散下之外以清涼消毒散敷之即愈

涼膈散

黄芩 薄荷
梔子生研 連翹去心
石膏生 甘草生
芒消 大黄各等分
水二鍾苦竹葉二十片煎八分加蜂蜜三匙
和服
方歌 涼膈散醫肺胃熱口渴脣焦便燥結芩薄梔
翹石膏草芒消大黄苦竹葉

清涼消毒散
白及 乳香
雄黄 天花粉
麝香 烏藥
山慈菇 黄蘗
各等分共研細末雞子清和蜜水調敷
方歌 清涼消毒去風熱及乳雄黄花粉麝烏藥慈
菇黄蘗研雞清蜜調毒卽滅
荆防敗毒散見項部腦疽

面遊風圖

面遊風
面遊風燥熱濕成面目浮腫癢蟲行膚起白屑而
癢極破津黄水津血疼
註 此證生於面上初發面目浮腫痒若蟲行肌
膚乾燥時起白屑次後極癢抓破熱濕盛者
津黄水風燥盛者津血痛楚難堪由平素血
燥過食辛辣厚味以致陽明胃經濕熱受風
而成癢甚者宜服消風散痛甚者宜服黄連
消毒飲外抹摩風膏緩緩取效

摩風膏

麻黃五錢　羌活一兩

白檀香一錢　升麻二錢

白及一錢　防風二錢

當歸身一錢

用香油五兩將藥浸五日文火煠黃卽撈去渣加黃蠟五錢溶化盡用絹濾過攪冷塗抹瘡上

方歌　摩風膏抹遊風證麻黃羌活白檀升及防歸身香油泡煠黃去渣加蠟凝

消風散見項部鈕扣風

黃連消毒飲見頭部百會疽

痄腮圖

痄腮

痄腮胃熱是其端初起焮痛熱復寒高腫焮紅風與熱平腫色淡熱濕原

註　此證一名髭發一名含腮瘡生於兩腮肌肉不着骨之處無論左右總發端於陽明胃熱也初起焮痛寒熱往來若高腫色紅焮熱者係胃經風熱所發若平腫色淡不鮮者由胃經濕熱所生始則俱以柴胡葛根湯表之若口渴便秘宜四順清涼飲解之表裏證俱解

腫痛仍作者勢必成膿宜托裏消毒散托之
膿熟者鍼之體虛者宜平補之其餘治法按
癰疽潰瘍門此證初起若過服涼藥令毒攻
喉者險

柴胡葛根湯

柴胡　葛根
石膏煅　花粉
黃芩各一錢　甘草生五分
牛蒡子炒研　連翹去心

桔梗各一錢　升麻三分

水二鍾煎八分不拘時服

方歌 柴胡葛根發表證痄腮腫痛或平形石膏花
粉黃芩草牛蒡連翹桔梗升

四順清涼飲

防風　梔子生研
連翹去心　甘草生
當歸　赤芍
羌活各一錢　大黃二錢

水二鍾燈心五十寸煎八分食遠服

方歌 四順清涼攻裏強口乾便秘痄腮瘡防風梔
子連翹草歸芍燈心羌大黃

托裏消毒散見腫瘍門

頰瘍圖

頰瘍

頰瘍胃經積熱生初如紅粟漸榴形膿出腫消易
斂愈膿稀難斂漏因成

註 此證生於耳下頰車骨間由陽明胃經積熱而生始發如粟色紅漸大如榴初起宜犀角升麻湯清解之若失治或過敷寒藥以致肌冷凝結堅硬難消難潰者宜升陽散火湯宣發之將潰宜托裏消毒散膿熟鍼之膿出腫退瘡口易斂者則愈或牙關緊急不開或旁

腫不消膿水清稀因而成漏復被寒侵瘡孔致生多骨經年纏綿難愈者服桂附地黃丸外用豆豉餅墊灸艾壯初用九壯以知熱癢為止每日灸之以朽骨脫出膿漸少而肌漸平為度兼用紅升丹撚入瘡口內萬應膏蓋貼每日一易患者當慎起居戒腥發等物漸漸收功

犀角升麻湯

犀角二錢五分　升麻一錢七分

黃芩八分　白附子八分麪裹煨熟
生甘草五分　白芷八分
川芎八分　羌活一錢一分
防風八分

水三鍾煎一鍾食遠熱服

方歌 犀角升麻醫頰瘍色紅初起服之良黃芩白
附生甘草白芷川芎羌活防

升陽散火湯

撫芎六分　蔓荊子

白芍酒炒　防風
羌活　獨活
甘草半生半炙　人參各一錢
柴胡　香附各一錢五分
葛根一錢　升麻一錢
殭蠶炒一錢五分

生薑一片紅棗肉一枚水三鍾煎一鍾食遠
溫服

方歌 升陽散火過敷寒牙叉拘急木痛堅撫蔓芎

防羌獨草參柴香附葛升鹽

托裏消毒散 見腫瘍門

豆豉餅 見灸法內

紅升丹

萬應膏 俱見潰瘍門

骨槽風圖

骨槽風

骨槽風火三焦胃，耳前腮頰隱隱疼，腐潰筋骨仍硬痛，牙關拘急夾邪風。

註 此證一名牙叉發，一名穿腮發，乃手少陽三焦、足陽明胃二經風火也。起於耳前，連及腮頰，筋骨隱痛，日久腐潰，腮之裏外筋骨仍然漫腫硬痛，牙關拘急，皆由邪風深襲筋骨故也。此證屬在筋骨陰分，故初起腫硬難消，潰後瘡口難合，多致不救。初起熱不盛者，內宜服清陽散火湯，外以清胃散擦牙，真君妙貼散敷腮。如初起發表之後，人壯火盛者，用皂刺、大黃、甘草節、白芷、殭蠶，下之後減大黃，加生石膏以清之，然亦不可過用寒涼之藥，恐其凝結也。有硬腫日久失治，不能盡消者，膿勢將成，宜用中和湯托之。已潰按癰疽潰瘍門治法，亦有過服寒涼，以致肌肉堅凝腐臭，非理中湯佐以附子不能回陽，非殭蠶不能搜風，如法治之，諸證俱減，惟牙關拘急不開

宜用生薑片墊灸頰車穴二七壯其穴在耳垂下五分陷中處每日灸之兼用鍼刺口內牙盡處出血其牙關即開若寒熱不退形焦體削痰盛不食或口內腐爛甚則穿腮落齒者俱爲逆證當腐爛之初治法即同牙疳亦不過稍盡人事耳

清胃散

薑黃　白芷

細辛　川芎

各等分共研細末先以鹽湯漱口擦牙痛處

方歌　清胃散擦牙腫疼薑黃白芷細辛芎同研先以鹽湯漱後擦此藥有奇功

中和湯

白芷　桔梗

人參　黃耆各一錢

藿香五分　肉桂五分

甘草　白朮土炒

川芎　當歸

白芍酒炒各一錢　麥門冬去心五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分加酒一杯食遠服

方歌　中和湯治骨槽風日久不消欲潰膿芷桔參耆藿桂草朮芎歸芍麥門冬

理中湯見潰瘍門

眞君妙貼散見腫瘍門

升陽散火湯方見頰瘍

發頤圖

發頤

發頤腫痛結核般經屬陽明身熱寒傷寒疹毒汗
失表腫至咽喉調治難

註此證又名汗毒發於頤頷之間屬足陽明胃經初起身發寒熱腫如結核微熱微痛漸腫如桃如李疼痛倍增由傷寒發汗未盡或疹形未透壅積而成初起宜荊防敗毒散汗之外以二味拔毒散敷之即消如消之不應者腫痛日增勢必潰膿宜服托裏透膿湯潰後按癰疽潰瘍門治法若此證失於調治或誤投寒涼尅伐之藥毒必內陷腫至咽喉痰湧氣堵湯水難嚥者逆

荊防敗毒散見項部腦疽

二味拔毒散見腫瘍門

托裏透膿湯見頭部侵腦疽

時毒圖

時毒

時毒初發類傷寒漫腫無頭在項間因感四時不
正氣治分壯弱疎解痊

註此證初起狀類傷寒憎寒發熱令人恍惚不寧肢體痠疼或兼咽痛一二日間發於項腮頷頤作腫無頭漸漸焮赤疼痛或似結核有根漫腫色赤俱由感冒四時不正邪氣客於經絡醞結而成非發於病後之頤毒也惟在醫者精察瘡色辨別虛實治法須宜疎解不

可驗用寒凉致毒不外發而内攻咽喉者險
矣初服荆防敗毒散汗之其腫不消者宜服
連翹消毒飲腫仍不消膿勢將成壯者宜服
透膿散弱者宜服托裏透膿湯外敷二味拔
毒散膿熟鍼之潰按癰疽潰瘍門治法

荆防敗毒散 見項部腦疽

連翹消毒飲 見背部酒毒發

透膿散 見腫瘍門

托裏透膿湯 見頭部侵腦疽

二味拔毒散 見腫瘍門

鳳眉疽圖

鳳眉疽

鳳眉疽生兩眉棱形長如瓜漫腫紅膀胱小腸肝
膽熱煩悶嘔逆不食凶

注 此疽亦名眉發生於眉棱無論左右俱屬足
太陽膀胱手太陽小腸足厥陰肝足少陽膽
四經積熱所致形長如瓜疼痛引腦二目合
腫堅硬色赤按之有根六日内刺之得膿則
吉無膿則險其則十四日不潰煩悶嘔逆不
食者凶初宜服仙方活命飲次服托裏透膿

湯速潰爲妙遲則恐攻眼損睛矣其餘內外

治法按癰疽潰瘍門

仙方活命飲 見腫瘍門

托裏透膿湯 見頭部侵腦疽

眉心疽圖

眉心疽

眉心疽生在印堂硬腫爲疽浮腫瘍督經風熱氣凝滯根堅木痛當疔防

註 此證生於兩眉中間疽名曰印堂疽毒初起色暗根平腫硬疼痛至二十一日腐潰出稠膿者順無膿黑陷者逆瘍名曰面風毒瘍毒初起色赤浮腫焮痛易治七日潰膿若色黑木痛麻癢太過根硬如鐵釘之狀寒熱並作即眉心疔也俱由督脈經風熱壅結氣滯所成疽瘍二證俱按百會疽眉心疔治法同疔

龍泉疽圖

龍泉疽

龍泉疽起在人中麻癢堅疼赤豆形上焦風熱攻督脈憎寒壯熱治同疔

註 此證生於水溝穴卽人中是也屬督脈經形如赤豆勢小根深堅硬木痛色紫頂焦寒熱交作不時麻癢由上焦風熱攻於督脈而成宜按疔門急速治之遲則毒氣內攻令人煩悶惡心乾嘔神亂昏憒腮項俱腫多致不救

虎髭毒圖

虎髭毒

虎髭毒在頦下生胃腎積熱入任經癰焮腫痛速潰易疽堅硬痛麻癢疔

註 此毒一名頦癰腫痛焮赤速潰易治一名承漿疽堅硬痛腫遲潰難治若根深形小似豆麻癢痛甚惡寒發熱心煩作嘔者疔也當從疔治皆由過食炙煿以致胃腎二經積熱上攻任脈而成癰疽二證初起宜服仙方活命飲加升麻桔梗消之若便秘脣焦大渴者宜

內踈黃連湯清之其餘內外治法俱按癰疽
腫瘍潰瘍門初起麻癢如疔治法按疔門
仙方活命飲
內踈黃連湯 俱見腫瘍門

燕窩瘡圖

燕窩瘡

燕窩瘡在下頦生如攢粟豆癢熱疼形類黃水瘡
破爛此證原來濕熱成

註 此證生於下頦俗名羊鬍子瘡初生小者如粟大者如豆色紅熱痒微痛破津黃水形類黃水瘡浸淫成片但疙瘩如攢由脾胃濕熱而成宜服芩連平胃湯外搽碧玉散即效

芩連平胃湯

黃芩一錢五分 黃連一錢
厚朴薑炒一錢 蒼朮炒一錢
甘草生五分 陳皮一錢

水二鍾薑一片煎八分食後服

方歌 芩連平胃燕窩瘡除濕清熱服更良薑炒厚朴蒼朮草陳皮同煎引生薑

碧玉散

黃蘗末 紅棗肉各五錢燒灰存性

共研極細末香油調搽患處

方歌 碧玉散搽燕窩瘡色紅疙瘩津水黃棗炭蘗

末香油拌消疼止癢滲濕方

雀斑圖

雀斑

雀斑淡黃碎點形火鬱孫絡血風成犀角升麻丸
常服正容散洗漸無蹤

註 此證生於面上其色淡黃碎點無數由火鬱於孫絡之血分風邪外搏發為雀斑宜常服犀角升麻丸並治一切粉刺酒刺黑黯靨子等證外用時珍正容散早晚洗之以澤其肌久久自愈亦有水虧火滯而生雀斑者宜服六味地黃丸

犀角升麻丸

犀角一兩五錢 升麻一兩
羌活一兩 防風一兩
白附子五錢 白芷五錢
生地黃一兩 川芎五錢
紅花五錢 黃芩五錢
甘草生二錢五分

各為細末合均蒸餅為小丸每服二錢食遠臨卧用茶清送下

方歌 犀角升麻治雀斑黖黯靨子亦能痊犀升羌
防白附芷生地芎紅芩草丸

時珍正容散

豬牙皂角　紫背浮萍

白梅肉　甜櫻桃枝各一兩

焙乾兌鷹糞白三錢共研爲末每早晚用少
許在手心內水調濃搓面上良久以溫水洗
面用至七八日後其斑皆沒神效

方歌 正容散洗雀斑容豬牙皂角紫浮萍白梅櫻

桃枝鷹糞研末早晚水洗靨

六味地黃丸

懷熟地八兩　山萸肉

懷山藥炒各四兩　白茯苓

丹皮　澤瀉各三兩

共爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二錢
空心淡鹽湯送下

方歌 六味地黃善補陰能滋腎水並生津萸苓山
藥丹皮瀉研末蜜丸服最神

黑痣圖

黑痣

黑痣生面衛點斑小如黍粒豆形圓孫絡之血陽
束結挑破水晶膏點痊

註 此證生於面部形如衛點小者如黍大者如
豆比皮膚高起一線有自幼生者亦有中年
生者由孫絡之血滯於衛分陽氣束結而成
宜用線鍼挑破以水晶膏點之三四日結痂
其痣自落用貝葉膏貼之兼戒醬醋愈後無
痕

水晶膏

礦子石灰水化開取末五錢又用濃鹼水多半茶鍾浸於石灰末內以鹼水高石灰二指為度再以糯米五十粒撒於灰上如鹼水滲下陸續添之泡一日一夜冬天兩日一夜將米取出搗爛成膏挑少許點於痣上不可太過恐傷好肉

方歌 水晶膏能點黑痣鹼水浸灰入糯米一日一夜米泡紅取出搗膏效無比

貝葉膏見潰瘍門

黧黑皯䵟

皯䵟如塵久始暗原於憂思抑鬱成大如蓮子小赤豆玉容久洗自然平

註 此證一名黧黑斑初起色如塵垢日久黑似煤形枯暗不澤大小不一小者如粟粒赤豆大者似蓮子芡實或長或斜或圓與皮膚相平由憂思抑鬱血弱不華火燥結滯而生於面上婦女多有之宜以玉容散早晚洗之常用美玉磨之久久漸退而愈戒憂思勞傷忌動火之物

玉容散

白牽牛　團粉
白歛　白細辛
甘松　白鴿糞
白及　白蓮蕊
白芷　白朮
白殭蠶　白茯苓各一兩
荊芥　獨活

羌活各五錢　白附子
鷹條白　白扁豆各一兩
防風五錢　白丁香一兩

共研末每用少許放手心內以水調濃搽搓面上良久再以水洗面早晚日用二次

方歌 玉容散退黧皯䵟牽牛團粉歛細辛甘松鴿糞及蓮蕊芷朮殭蠶白茯苓荊芥獨羌白附子鷹條白扁豆防風白丁香共研為末早晚洗面去斑容

御纂醫宗金鑑卷六十四

編輯外科心法要訣目錄

項部

腦疽

偏腦疽

天柱疽

魚尾毒

百蝂疽

結喉癰

夾喉癰

少陽經瘰癧

太陽經濕瘰癧

馬刀瘰癧

陽明經瘰癧

重臺瘰癧

上石疽

失榮證

鈕扣風

背部

上中下發背

上搭手

中搭手

下搭手

蓮子發

蜂窩發

陰陽二氣疽

串疽

酒毒發

連珠發

丹毒發

禽疽

痰注發

黄瓜癰

腰部

腎俞發

中石疽

纏腰火丹

御纂醫宗金鑑卷六十四

編輯外科心法要訣

腦疽圖

偏腦疽圖

項部

腦疽

腦疽項正屬督脉左右偏腦太陽經陽正陰偏分難易治與癰疽大法同

註此疽有正有偏正屬督脉經入髮際名爲腦疽俗名對口偏屬太陽膀胱經名爲偏腦疽俗名偏對口正腦疽係陽亢熱極而生其證多焮赤腫痛色鮮紅活根束頂尖時痛時止督脉純陽起於尾閭上貫顛項挾毒上升故

易膿易潰易斂多屬順證若偏腦疽係寒熱錯雜所生其證漫腫色暗平塌堅硬然足太陽經外陽內陰從頭走足陽降陰凝難膿難潰難斂多屬逆證更有兼風濕者其瘡根又易於散大旁流故順逆二證治法當辨別是癰是疽腦癰者皮薄易破腦疽者皮厚難破初起有表證令人寒熱往來宜服荊防敗毒散有裏證令人口乾焦紫大渴大便結燥宜服內疏黃連湯若瘡勢已成按癰疽腫瘍潰瘍門大法治之

荊防敗毒散

荊芥 防風
羌活 獨活
前胡 柴胡
桔梗 川芎
枳殼麩炒 茯苓各一錢
人參 甘草各五分

薑三片水二鍾煎八分食遠服

寒甚加葱三枝

方歌 荊防敗毒治初瘡憎寒壯熱汗出良羌獨前柴荊防桔芎枳參苓甘草强

內疏黃連湯見腫瘍門

天柱疽圖

天柱疽

天柱疽生天柱骨上焦鬱熱蓄督經灸之有炮方為順色黑形陷逆而凶

註 此疽生於項後高骨名天柱骨即大椎骨也疽之初起形如卧蠶由上焦鬱熱蓄於督脈以致肩背拘急極痒入骨宜於疽上以艾灸之若灸之有炮者順無炮者逆甚至色黑形陷血出不止潰爛神昏嘔噦惡心等證是為大凶其內外治法同腦疽

魚尾毒圖

魚尾毒

魚尾毒生後髮角在左在右淺而輕膀胱濕熱七日潰膿出腫消痛自寧

註 此毒生於項後髮際兩旁角處由足太陽膀胱經濕熱凝結而發其毒或在左或在右皆屬輕淺初起宜荊防敗毒散膿將成宜服托裏排膿湯其外治之法同癰疽腫瘍潰瘍諸證

托裏排膿湯

當歸　白芍酒炒
人參　白朮土炒
茯苓　連翹去心
金銀花　浙貝母去心各一錢
生黃耆二錢　陳皮八分
肉桂六分　桔梗胸之上加一錢
牛膝下部加八分　白芷頂之上加五分
甘草四分
薑一片水三鍾煎一鍾食遠溫服

方歌　托裏排膿治潰瘡排膿消腫實稱强歸芍四
君翹桂芷銀耆貝桔膝陳良
荊防敗毒散見腦疽

百蜧疽圖

百蜧疽

百蜧疽生腫色形引耳繞頭色紫紅痛熱不食氣
逆嗽刺出膿吉血出凶

註　此疽初發漫腫大小數塊環繞頸項其色紫
紅痛熱不食氣逆咳嗽其發引耳十五日可
刺逆則毒攻刺後刺見膿者順見血者逆餘
治法按癰疽腫瘍潰瘍門

結喉癰圖

結喉癰

結喉癰發項前中肝肺積熱塞喉因膿成若不急速刺潰穿咽喉何以生

註此癰發於項前結喉之上又名猛疽以其勢猛烈也蓋項前之中經屬任脈兼肝肺二經積熱憂憤所致腫甚則堵塞咽喉湯水不下其凶可畏若膿成不鍼向內潰穿咽喉者則難生矣初宜服黃連消毒飲外敷二味拔毒散將潰調治之法按癰疽腫瘍潰瘍門

黃連消毒飲見頭部百會疽

二味拔毒散見腫瘍門

夾喉癰圖

夾喉癰

夾喉癰生喉兩旁肝胃毒熱發其瘡療與結喉癰同治尤嫌痰壅不時嗆

註 此癰一名夾疽生於結喉之兩旁屬足厥陰肝經足陽明胃經火毒上攻而致其治法與結喉癰同

少陽經瘰癧圖

太陽經瘰癧圖

馬刀瘰癧圖

陽明經瘰癧圖

重臺瘰癧圖

瘰癧

小瘰大癧三陽經項前頸後側旁生痰濕氣筋名雖異總由恚忿鬱熱成更審纏綿諸證治成勞日久不易功

註此證小者爲瘰大者爲癧當分經絡如生於項前屬陽明經名爲痰瘰項後屬太陽經名爲濕瘰項之左右兩側屬少陽經形軟遇怒卽腫名爲氣癧堅硬筋縮者名爲筋癧若連綿如貫珠者卽爲瘰癧或形長如蛤蜊色赤

而堅痛如火烙腫勢甚猛名爲馬刀瘰癧又有子母癧大小不一有重臺癧癧上堆纍三五枚盤疊成攢有繞項而生者名蛇盤癧如黃豆結篓者又名鎖項癧生左耳根名蜂窩癧生右耳根名惠袋癧形小多痒者名風癧頷紅腫痛者名爲燕窩癧延及胸腋者名瓜藤癧生乳旁兩胯軟肉等處者名㾦瘍癧生於徧身漫腫而軟囊內含硬核者名流注癧獨生一個在顖門者名單窠癧一包生十數

個者名蓮子癧堅硬如磚者名門門癧形如荔枝者名石癧如鼠形者名鼠癧又名鼠瘡以上諸癧推之移動爲無根屬陽外治宜因證用鍼灸敷貼蝕腐等法推之不移動者爲有根且深屬陰皆不治之證也切忌鍼砭及追蝕等藥如妄用之則難收斂瘰癧形名各異受病雖不外痰濕風熱氣毒結聚而成然未有不兼恚怒忿鬱幽滯謀慮不遂而成者也有外受風邪內停痰濕搏於經絡其患身體先寒後熱瘡勢宜腫微熱皮色如常易消易潰易斂此爲風毒也如防風羌活湯海藻丸揀擇用之有天時亢熱暑濕偶中三陽經兼過食膏粱厚味釀結而成其患色紅微熱結核堅硬緩慢難消潰遲斂遲此爲熱毒也如升陽調經湯柴胡連翹湯雞鳴散隨證輕重揀擇用之有感冒四時殺厲之氣而成其患耳項胸腋驟成腫塊宜發暴腫色紅皮熱令人寒熱頭眩項強作痛此爲氣毒也如李

杲連翹散堅湯散腫潰堅湯俱可因證治之有肝傷恚怒血虛不能榮筋其患核堅筋縮推之不移者此筋瘰也初服舒肝潰堅湯次服香貝養榮湯治之有誤食汗液蟲蟻鼠殘陳水宿茶不淨之物其患初小後大累累如貫珠連接三五枚不作寒熱初不覺疼久方知痛此爲誤食毒物也如楊氏家藏治瘰癧方法製雞蛋隨證虛實揀擇用之自愈其項後兩旁濕瘰癧經屬膀胱寒水外感風邪與濕凝結漫腫疼痛皮色如常日久將潰皮色透紅微熱痛甚其內外治法用藥總不宜寒凉初腫宜用附子敗毒湯外敷神功散將潰已潰俱按癰疽潰瘍內外治法用藥首尾得溫煖即效誤犯寒凉令人項背拘強瘡勢塌陷毒氣攻裏便瀉者逆但凡生瘰癧者男子不宜太陽青筋暴露潮熱咳嗽自汗盜汗女人不宜眼內紅絲經閉骨蒸五心煩熱男婦有此後必變瘵勞俱爲逆證難收功也

防風羌活湯

治風毒瘰癧初發寒熱者

防風　羌活各一錢

連翹去心二錢　升麻七分

夏枯草二錢　牛蒡子炒研一錢

川芎一錢　黃芩酒浸一錢

甘草五分　昆布酒洗一錢

海藻酒洗一錢　殭蠶酒炒二錢

薄荷一錢

水煎服

方歌　防風羌活驅瘰方風毒發熱最爲良芎芩昆布翹蒡草夏枯海藻薄升殭

海藻丸

治風痰瘰癧連項而生無寒熱者宜常服消盡爲止

海藻菜蕎麥同炒過去麥不用　白殭蠶微炒去絲

右等分爲細末用白梅肉泡湯爲丸如梧桐子大飯後或臨臥時每服六七十丸米湯送下並忌魚腥厚味

方歌　海菜丸治風痰癧海藻菜與白殭蠶梅湯爲丸如桐子米湯送下病可瘥

升陽調經湯丸

治熱毒瘰癧連於項下或至頰車此證由陽明胃經中來也若其瘡深遠隱曲肉低俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸服亦可

升麻八錢　連翹去心

龍膽草酒炒　桔梗

黃連去鬚酒炒　京三稜酒炒

葛根　甘草炙各五錢

知母酒洗　廣茂酒炒各一兩

條黃芩酒洗六錢　黃蘗去粗皮酒炒七錢

右共一劑稱一半爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服一百丸或一百五十丸一半研粗末每用五錢若胃強能食大便乾燥者可旋加至七八錢用水二鍾先將粗末浸半日煎至一鍾去渣熱服服時仰臥伸脚置高處去

枕頭噙藥一口作十次嚥之一鍾將盡完可
留一口將丸藥送下服藥畢臥如常此治法
也

方歌 升陽調經醫毒熱項頰瘰癧堅如鐵升葛甘
芩知蘗棱黃連膽草翹茂桔

柴胡連翹湯
治男婦熱毒馬刀瘰癧兼氣寒血滯經閉等證

柴胡 連翹去心
知母酒炒 黃芩炒各五錢

黃蘗酒炒 生地
甘草炙各三錢 瞿麥穗六錢
牛蒡子二錢炒研 當歸尾一錢五分
肉桂三分

右共研粗末每服三錢或五錢水二大鍾煎
至一鍾去渣食後熱溫服

方歌 柴胡連翹醫瘰癧馬刀血滯與經閉黃芩牛
蒡歸蘗知瞿麥肉桂甘生地

雞鳴散
治瘰癧疼痛及熱毒結核或多煩悶熱而不寒
者

黑牽牛一兩 胡粉一錢即定粉
生大黃二錢 朴消煉成粉者三錢

右共為細末每服三錢雞鳴時井花水調服
以二便利為度如未利再服

方歌 雞鳴散治瘰癧疼結核煩悶熱相乘粉牽消
黃為細末井水調服便利通

李杲連翹散堅湯

治氣毒瘰癧耳下或至缺盆或至肩上生瘡堅
硬如石推之無根者名馬刀瘡從手足少陽經
中來也或生兩脇或已流膿或未破並皆治之

當歸酒洗 連翹去心
莪朮酒炒 京三棱酒炒各五錢
土瓜根酒炒 龍膽草酒洗各一兩
柴胡一兩二錢 黃芩一兩二錢半生用一半酒炒
炙甘草六錢 黃連酒炒
蒼朮炒各三錢 赤芍藥一錢

右以一半爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服一百丸或一百五十丸一半研粗末每用五錢水一鍾八分先浸半日煎一鍾去渣熱服臨臥頭低脚高去枕而臥每口作十次嚥之留一口送下丸子服畢如常安臥

方歌 李杲連翹散堅湯氣毒瘰癧馬刀瘡歸芍柴芩棱莪草土瓜龍膽黃連蒼

舒肝潰堅湯

夏枯草　殭蠶炒各二錢

香附子酒炒　石決明煅各一錢五分

當歸　白芍醋炒

陳皮　柴胡

撫芎　穿山甲炒各一錢

紅花　片子薑黃

甘草生各五分

引燈心五十寸水三鍾煎一鍾食遠熱服

便燥者加乳香一錢

便溏者加煅牡蠣一錢

方歌 舒肝潰堅湯開鬱筋癧石疽柴決當夏枯陳蠶香附撫紅花芍草甲薑黃

散腫潰堅湯

治氣毒瘰癧一切馬刀結硬如石推之有根者如證從耳下串至缺盆或至肩上或至脇下者皆屬手足少陽二經所發也若瘰癧徧生下頦或至頰車堅而不潰者屬足陽明經所發也或二證已破及流膿水者並皆治之服藥多少臨證斟酌量病人飲食多少大便輭硬以意消息之

柴胡梢四錢　龍膽草酒炒

黃蘗去粗皮酒炒　知母炒

花粉　昆布去土酒洗

桔梗各五錢　甘草根炙

京三棱酒炒　廣茂酒炒

連翹去心　當歸各三錢

白芍酒炒　葛根

黃連各二錢　升麻六錢

黃芩梢 六錢 一半酒炒一半生用
海藻 五錢
右共研末每用六錢或七錢水二鍾先浸半
日煎至一鍾去渣熱服服時於臥處伸脚在
高處頭微低每嚥一口作十次嚥之至服畢
依常安臥取藥在胸中多停留之意也另攢
半料作細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服一
百丸此湯藥豫留一口以送丸藥
方歌 散腫潰堅氣毒滯馬刀瘰癧耳項交徧頸或

至頰車肯結硬如石用之消知藻三稜歸芍
草升芩花粉柴胡梢葛根黃連廣茂桔昆布
龍膽草連翹
楊氏家藏治瘰癧方
治誤食毒物致成瘰癧其功甚速
荊芥　白殭蠶 炒去絲
黑牽牛 各二錢　斑蝥 二十八個 去頭翅足大米炒
右爲末臥時先將滑石末一錢用米飲調服
半夜時再一服五更初即用溫酒調藥一錢

或二三錢量人之強弱用之服後如小水澁
無惡物行下次日早再用一服仍不行第三
日五更初先喫白糯米粥再服前藥一服更
以燈心湯調琥珀末一錢服之以小水內利
去惡物爲愈如尿孔痛用青黛一錢以甘草
湯調下其痛即止
方歌 楊氏家藏治瘰方誤食毒物成瘰瘡牽牛斑
蝥殭荊芥爲末酒服量弱強
法製靈雞蛋

治誤食毒物致腹下生馬刀瘰癧者其功稍緩
斑蝥 七個 去頭足翅
右將雞子一個頂上敲開小孔入斑蝥在內
紙封固了於飯上蒸熟取出去殼切開去斑
蝥五更空心和米飯嚼服候小水通如米泔
水或如脂即其驗也如大便小水不通即服
琥珀散三二貼催之然後常服妙靈散內消
連翹丸尤佳
方歌 製靈雞蛋治馬刀雞子一個入斑蝥紙封蒸

熟去殼藥同飯嚼服癧可消

琥珀散

琥珀　　黄芩

白茯苓　　烏藥

車前子　　瞿麥

茵陳蒿　　石韋

紫草　　茅根

連翹去心各等分

右爲極細末每服三錢用燈心湯調下不拘時服

方歌　琥珀散能利二便消毒清熱最稱奇芩苓烏藥車瞿麥茵韋紫草茅翹宜

妙靈散

服雞子蛋後却將此藥與內消連翹丸料兼常服癧愈乃止

海藻二兩　　川牛膝

何首烏生　　當歸酒洗

海螵蛸　　桑寄生各一兩

海帶　　青葙子酒洗

昆布酒洗　　甘草節各五錢

木香三錢　　沉香一錢

右爲細末每服二錢食後溫酒調下

內消連翹丸

連翹去心二兩　　核桃仁

白及　　射干

夏枯草　　土瓜根

澤蘭葉　　沙參

漏蘆各一兩五錢

右爲細末入核桃仁研勻酒糊爲丸如梧桐子大每服三五十丸空心食前或酒下或鹽湯送下

方歌　內消連翹解瘰毒妙靈與此兩兼服核桃及射夏枯草土瓜澤蘭沙漏蘆

附子敗毒湯

治濕毒瘰癧

羌活一錢　　川附子製一錢

白殭蠶炒三錢　前胡一錢
連翹去心一錢五分　生黃耆一錢五分
蔓荊子一錢五分　陳皮一錢
防風一錢　白茯苓一錢五分
金銀花二錢　甘草節五分
引用生薑一片水三鍾煎一鍾食遠溫服
方歌　附子敗毒太陽經濕毒瘰癧漫腫疼陳苓前草耆羌活銀花殭蔓翹防風

消核散
治頸項痰凝瘰癧不論男婦小兒用之無不神

效
海藻三兩　牡蠣
元參各四兩　糯米八兩
甘草生一兩
紅娘子二十八個同糯米炒黃色去紅娘子用米
共研細酒調服一錢或錢半量人壯弱
方歌　消核散治諸瘰癧男婦小兒用之愈紅娘糯米炒胡黃甘草元參藻牡蠣

犀角丸
治諸般瘰癧心火上攻兩目赤澁服之有效
犀角　青皮
黑牽牛半生半炒　陳皮各一兩
連翹去心五錢　薄荷二觔
皂角二枚
前五味共研細末用皂角去子皮弦泡搥以布絞取汁一盌又用新薄荷搗取汁同熬成膏和入藥末內為丸如梧桐子大每服三十

丸食後滾湯送下
方歌　犀角丸能除心火諸般瘰癧兼目紅牽牛半生半炒用陳薄皂角連翹青

夏枯草膏
治男婦小兒憂思氣鬱瘰癧堅硬肝旺血燥驟用迅烈之劑恐傷脾氣以此膏常服消之
京夏枯草一觔半　當歸
白芍酒炒　黑參
烏藥　浙貝母去心

殭蠶炒各五錢　昆布
桔梗　陳皮
撫芎　甘草各三錢
香附酒炒一兩　紅花二錢

前藥共入砂鍋內水煎濃湯布濾去渣將湯復入砂鍋內漫火熬濃加紅蜜八兩再熬成膏磁罐收貯每用一二匙滾水冲服兼戒氣怒魚腥亦可用薄紙攤貼瘰癧自消

方歌　夏枯草膏醫諸癧化硬消堅理肝虛血燥憂思肝木旺烈藥傷脾服此宜歸芍貝殭香附桔昆紅參草撫陳皮烏藥同熬加紅蜜滾水冲服戒怒急

瘰癧未潰敷貼方

金倍散

治瘰癧堅硬難消難潰敷之神效

整文蛤一枚鑽孔　金頭蜈蚣一條研粗末

將蜈蚣末裝入文蛤內紙糊封口外再用西紙糊七層曬乾麪裹炒以紙黑焦爲度去紙研極細末加麝香一分再研勻陳醋調稠溫敷堅硬核處外用薄紙蓋之每日一換

方歌　金倍散敷堅瘰癧蜈蚣末入文蛤中紙糊曬乾同麪炒加麝研之醋調靈

神功散

治濕毒瘰癧敷之神效

製川烏頭　嫩黃蘗各等分

共研細末米醋調稠溫敷腫處每日一換

方歌　神功散敷濕瘰癧嫩黃蘗與川烏頭等分爲末加米醋調塗腫處即能瘳

李杲龍泉散

治諸般瘰癧未成者消已成者潰

瓦粉即定粉　龍泉粉即磨刀石上粉也
莪朮酒浸炒乾　京三棱酒浸炒乾
昆布去土酒洗各五錢

右共研極細滾水調塗患處用此消堅尤速

方歌　李杲龍泉敷諸癧瓦粉龍泉莪朮棱昆布共研爲細末滾水調塗速又靈

朱震亨貼瘰癧餅

治項間瘰癧不辨肉色不問大小及日月深遠或有赤硬腫痛並皆貼之效

生山藥　蓖麻子肉

右等分搗勻攤貼之

方歌　震亨貼瘰癧可移蓖麻山藥共研泥不問日久並腫硬作餅貼之效更奇

神效瘰癧方

治瘰癧初起消腫止痛

白膠香　海螵蛸

降眞香心無土氣者

右等分研末溫水調稠薄紙攤貼

方歌　神效瘰癧實良方疏滯消腫止痛強未破已前用之效白膠海螵降眞香

龍珠膏

龍牙草五兩即馬鞭草　棘棗根五錢

海藻二錢五分　蘇木五錢

右細切水二十盌煎至十二三盌去滓又用

桑柴灰蒼耳草灰石灰各二盌半紙兩層先鋪籮底次置三種灰於籮內用滾水熱淋取灰汁十盌澄清同前湯入鍋內熬成膏用巴豆霜白丁香石膏麝香輕粉各少許研細入膏內攪勻磁罐收貯取敷核上再換時去舊藥其核即潰根小者但塗於根上其核自潰

方歌　龍珠膏敷癧毒瘡潰遲未潰敷之良海藻蘇木龍牙草再加棗根共煎湯桑石蒼耳灰淋水同煎成膏添麝香石膏白丁輕巴豆研入膏內塗瘰強

瘰癧潰後方

蟾酥撚子

蟾酥一塊黃豆大　白丁香十五粒

寒水石一塊黃豆大　巴豆十粒去殼

寒食麪一塊黃豆大

右各研細共合一處再研勻煉蜜搓成撚子每用一根用鍼將瘰癧當頭鍼一孔插撚子入孔內用綠雲膏蓋貼過三日後單換膏

藥俟敗日後須根自脫以膿淨硬退爲效如硬未盡再用以盡爲度

方歌 蟾酥撚子化堅方瘰癧將潰納入瘡寒水石共巴豆肉寒食麪與白丁香

五雲膏

專貼鼠瘡馬刀瘰癧已潰

銀黝子四兩搗碎 黃丹八兩飛過

香油二十兩

用砂鍋一口盛香油火溫候油熱將黝子投

入油內用桃柳桑槐棗五樣樹枝攪之候起珍珠花時撈去渣用布濾淨後將油下入鍋內慢慢將黃丹篩入油內用五枝不住手攪之以滴水成珠爲度取出收貯用時勿令見火以重湯燉化紅緞攤貼

方歌 五雲膏貼鼠瘡證瘰癧潰後共馬刀銀黝油熬渣濾淨黃丹五枝攪成膏

綠雲膏

黃連 大黃

黃芩 元參

黃蘗 木鱉子去殼各一錢

右藥共切片用香油一兩煠焦色去渣入淨松香五兩再熬成膏傾入水中扯拔令金黃色入銚內再煠數滾俟溫將豬膽汁三枚銅綠三錢預用醋一兩浸一宿絹濾去渣同入膏內用柳枝攪之候冷爲度用時以重湯燉化薄紙攤貼甚效

方歌 綠雲瘰破貼最神軍蘗連鱉元參芩油煠濾

渣加松脂膽汁銅綠入攪勻

蛇蛻膏

蜜蜂二十一個 蛇蛻七分半

蜈蚣二條端午前收者佳

右用香油四兩將前三藥入油用文武火煠枯撈去渣入定粉二兩用如筯粗桑枝七條急攪候冷出火氣七日夜方用紙攤貼患處

方歌 蛇蛻膏貼潰後瘡專消餘毒功效極蜈蚣蜜蜂煠去渣定粉油熬出火氣

凡治瘰癧馬刀潰破之後應用方藥氣血兩虛宜八珍湯堅硬未消者宜香貝養榮湯食少便溏者宜香砂六君子湯血虛肝熱或瘡口出血或紅膿者宜逍遙散加丹皮炒梔子瘡口斂遲宜用十全大補湯加白斂虛煩不寐者宜歸脾湯調理但藥劑大小量人歲數虛實斟酌用之

八珍湯見潰瘍門

香貝養榮湯見石疽門

香砂六君子湯見潰瘍門

逍遙散見背部上搭手

十全大補湯見潰瘍門

歸脾湯見乳部乳中結核門

益元散即六乙散加硃砂少許見胸部蠹疽

上石疽圖

上石疽

石疽生於頸項旁堅硬如石色照常肝鬱凝結於經絡潰後法依瘰癧瘡

註 此疽生於頸項兩旁形如桃李皮色如常堅硬如石㿔痛不熱由肝經鬱結以致氣血凝滯經絡而成此證初小漸大難消難潰既潰難斂疲頑之證也初起氣實者宜服舒肝潰堅湯氣虛者宜服香貝養榮湯外用葱白蜂蜜搗泥敷貼日久不消者以陽燧錠每日灸

之以或消或輭或將潰爲度既潰法同瘰癧

香貝養榮湯

白朮（土炒二錢） 人參

茯苓 陳皮

熟地黃 川芎

當歸 貝母（去心）

香附（酒炒） 白芍（酒炒各一錢）

桔梗 甘草（各五分）

薑三片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

胸膈痞悶加枳殼木香

飲食不甘加厚朴蒼朮

寒熱往來加柴胡地骨皮

膿潰作渴倍人參當歸白朮加黃耆

膿多或清倍當歸川芎

脇下痛或痞加青皮木香

肌肉生遲加白蘞肉桂

痰多加半夏橘紅

口乾加麥冬五味子

發熱加柴胡黃芩

渴不止加知母赤小豆

潰後反痛加熟附子沉香

膿不止倍人參當歸加黃耆

虛煩不眠倍人參熟地加遠志棗仁

方歌 香貝養榮用四君四物貝桔香附陳氣血兩虛宜多服筋瘰石疽效如神

陽燧錠（見首卷灸法）

舒肝潰堅湯（見瘰癧門）

失榮證圖

失榮證

失榮耳旁及項肩起如痰核不動堅皮色如常日漸大憂思恚鬱火凝然日久氣衰形削瘦愈潰愈硬現紫斑腐爛浸淫流血水瘡口翻花治總難

注 失榮證生於耳之前後及肩項其證初起狀如痰核推之不動堅硬如石皮色如常日漸長大由憂思恚怒氣鬱血逆與火凝結而成日久難愈形氣漸衰肌肉削瘦愈潰愈硬色現紫斑腐爛浸淫滲流血水瘡口開大努肉

高突形似翻花瘤證古今雖有治法終屬敗證但不可棄而不治初宜服和榮散堅丸外貼阿魏化堅膏然亦不過苟延歲月而已

和榮散堅丸

治失榮調和榮血散堅開鬱

川芎　白芍酒炒
當歸　茯苓
熟地　陳皮
桔梗　香附
白朮土炒各一錢　人參
甘草炙　海粉
昆布　貝母去心各五錢
升麻　紅花各三錢
夏枯草一觔煎湯再加紅蜜四兩再熬成膏

共研細末夏枯草膏合丸如梧桐子大每服三錢食遠白滾水送下

身熱加黃芩柴胡
自汗盜汗去升麻倍人參加黃耆

飲食無味加藿香砂仁
飲食不化加山查麥芽
胸膈痞悶加澤瀉木香
咳嗽痰氣不清加杏仁麥冬
口乾作渴加知母五味子
睡眠不寧加黃蘗遠志棗仁
驚悸健忘加茯神石菖蒲
有汗惡寒加薄荷半夏
無汗惡寒加蒼朮藿香

婦人經事不調加延胡索丹皮
腹脹不寬加厚朴大腹皮

方歌 和榮散堅丸消鬱開結益虛理肝脾八珍貝
桔陳香附昆海升紅枯草宜

阿魏化堅膏
用蟾酥丸藥末一料金頭蜈蚣五條炙黃去頭
足共研勻將太乙膏二十四兩重湯炖化離火
入前藥末攪冷為度每用時以重湯炖化用紅
絹攤貼半月一換輕者漸消重者亦可少解常

貼可保不致翻花

方歌 阿魏化堅消結聚蟾酥丸料研末細蜈蚣炙
黃太乙膏炖化攪勻功速極

太乙膏 見潰瘍門
蟾酥丸 見疔瘡門

鈕扣風圖

鈕扣風
鈕扣風生胸頸間風濕結聚搔癢難延及成片浸
汁水因地而名當癬看

註 此證生於頸下天突穴之間因汗出之後邪
風襲於皮裏起如粟米搔癢無度抓破津水
誤用水洗浸淫成片輕者外敷獨勝散水硫
散甚者宜服消風散即愈

獨勝散
芥菜花一味研細醋調患上

方歌 獨勝散治鈕扣風已破未破用俱靈內只芥菜花一味止癢消腫有奇功

冰硫散

硫黃一兩　潮腦

川椒　生白礬各二錢

共爲細末先用白蘿蔔一個掏空將藥填滿用蘿蔔皮蓋之紙包三四層灰火內煨半時許待冷將藥取出同熟豬脂油調稠搽患上自愈

方歌 冰硫散內首硫黃潮腦椒礬用最良蘿蔔掏空藥填滿油調專搽鈕扣瘡

消風散

治鈕扣風騷癢無度抓破津水亦有津血者

荊芥　防風

當歸　生地

苦參　蒼术

蟬蛻　胡麻仁

牛旁子炒研　知母生

石膏煅各一錢　甘草生

木通各五分

水二鍾煎八分食遠服

方歌 消風止癢散風濕木通蒼术苦參知荊防歸蒡蟬膏草胡麻生地水煎之

上中下發背圖



背部

上中下發背

三發火毒發督經中發屬肝對心生上發屬肺天柱下下發屬腎臍後凝

註 上中下三發背俱屬督脈經皆由火毒而成上發背火毒傷肺生天柱骨下一名脾肚發其形橫廣如肚中發背火毒傷肝生於背心一名對心發其形中濶兩頭有尖如瓜下發背火毒傷腎生於腰中一名對臍發其形平

漫如龜其初起皆形如粟米焮痛麻癢周身拘急寒熱往來因循數日突然大腫氣實者多焮痛氣虛者多麻癢初起治法不論虛實即宜隔蒜艾灸灸之不應則就患頂當肉灸之至知痛爲效以大化小移深居淺灸後用鍼當瘡頂點破一孔隨用拔法務使毒氣內外疏通庶不致內攻如有表證發熱惡寒無汗者宜荆防敗毒散汗之如有裏證發熱惡熱大便燥者宜內疏黃連湯下之表裏證兼

有者宜神授衛生湯雙解之以減瘡勢膿將成必行托裏如潰破腐肉不去外貼巴膏以化之其餘治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門蓋此三證無論老少總以高腫紅活焮痛者爲順若漫腫塌陷焦枯紫黑者爲逆

荆防敗毒散見項部腦疽門

內疏黃連湯

神授衛生湯俱見腫瘍門

巴膏見潰瘍門膏藥類方

上搭手圖



上搭手

上搭手生肺俞穴左右名同經有別右屬肺兮左屬肝總由氣鬱痰熱結

註此證生於足太陽膀胱經肺俞穴在兩肩骨之動處無論左搭手右搭手其名雖同而偏在左者屬肝偏在右者屬肺故曰經有別也總由氣鬱痰熱凝結而成初宜神授衛生湯雙解之次以逍遙散清之兼以六鬱湯調之其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

逍遙散

當歸酒洗　白芍酒洗

白茯苓　白朮土炒

香附酒炒各一錢　柴胡八分

黃芩五分　陳皮一錢

薄荷五分　甘草生六分

水二鍾煎八分食遠服

方歌逍遙散能和氣血開鬱行滯又消結歸芍苓朮香柴芩陳薄甘草清毒熱

六鬱湯

香附酒炒　茯苓

陳皮　半夏製

川芎　山梔各一錢

蒼朮炒　縮砂仁

甘草生各五分

薑三片水二鍾煎八分服

方歌六鬱湯能開六鬱取其消痰又行氣芎縮二陳蒼山梔香附生薑兼化滯

神授衛生湯見腫瘍門

中搭手圖

中搭手

中搭手生近膏肓經屬膀胱脊骨旁七情不和憤怒火虛實寒熱細叅詳

註此證生在脊骨兩旁屬足太陽膀胱經膏肓穴一名龍疽由七情不和憤怒火凝而生遇氣寒而實便燥不渴者宜一粒金丹溫下之若氣熱而實便燥大渴者宜內疎黃連湯寒下之若氣血虛瘡不能發長者宜內托黃耆散托補之其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

一粒金丹

木香　乳香各五分

巴豆霜一錢五分　沉香五分

各爲細末和勻用肥膠棗個半去皮核搗爛和藥末爲丸如芡實大每服一丸細嚼用白滾水一口將藥送下少頃再飲白滾水一口即瀉一次若飲滾水二口即瀉二次遇胃氣壯實兼毒滯盛者服藥後連飲滾水三四口

卽瀉三四次不可太過毒滯瀉盡卽以米飲
補之

方歌 一粒金丹療惡瘡寒實不渴便燥良木乳沉
香巴豆肉棗肉爲丸服卽康

內托黃耆散

當歸 白芍炒
川芎 白朮土炒
陳皮 穿山甲炒研
皂刺 黃耆各一錢
檳榔三分 紫肉桂五分

水二鍾煎八分食前服

方歌 內托黃耆治瘍虛托裏諸瘡用最宜歸芍芎
朮陳皮桂山甲檳榔皂刺耆

內疏黃連湯見腫瘍門

下搭手圖



下搭手

下搭手生經膀胱穴在肓門腰窩旁房勞過度生
毒火紫陷腐爛透膜腸

註 此證發於腰窩旁開三寸屬足太陽膀胱經肓門穴由房勞過度有傷腎水水竭不能制火火旺以致榮衛不和逆於肉裏而生也初發紅活焮腫令人寒熱往來口渴煩躁百節疼痛宜服仙方活命飲宜解毒火次服內托黃耆散托毒發長將潰內外治法俱按癰疽

腫瘍潰瘍門若初腫腰痛如折不能俯仰者

險若色紫塌陷腐爛孔深透膜透腸者逆

仙方活命飲見腫瘍門

內托黃耆散見前中搭手

蓮子發圖

蓮子發

蓮子發名取象形膂與膀胱毒化成形斜平塌侵

督重形長高腫半背輕

註此證一名太陰疽生於脊背及兩脇屬膂與膀胱經火毒合化凝結而成若形斜平塌頭侵督脈尾站肋骨者屬毒重若形長高腫偏於半背中不過督脈旁不過肋骨屬毒輕遇氣實之人初宜蟾酥丸或麥靈丹汗之次宜一粒金丹下之遇氣虛之人初宜仙方活命

飲宜解之次宜內托黃耆散托補之其餘內外治法俱宜按癰疽腫瘍潰瘍門

蟾酥丸見疔瘡門

仙方活命飲見腫瘍門

一粒金丹

內托黃耆散俱見前中搭手

麥靈丹見腫瘍門

蜂窩發圖

蜂窩發

蜂窩發似蜂房形每在肩後脊旁生此證最忌頭向上急清心火免內攻

注 此證多生肩後及脊旁形似蜂房由膊經積熱更兼心火凝結成毒初起高腫如龜形胖脹半背者輕瘡勢橫斜漫大者重宜服內疏黃連湯若頭尖向上屬心火熱極防毒火內攻藏府亦有瘡形長若尺許根橫滿背名為竟體疽屬毒甚險初覺宜急服黃連消毒飲清心解毒庶免內攻其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

內疏黃連湯 見腫瘍門

黃連消毒飲 見頭部百會疽

陰陽二氣疽圖



陰陽二氣疽

陰陽二氣疽脊旁，腫消軟硬變不常，七情內乖逆榮衛，如期膿潰自無妨。

註 此證生於脊背之旁，乍腫乍消，時軟時硬。由七情內乖，榮衛不和而生也。初發令人寒熱往來，若大渴神清，高腫脈洪，二七膿成潰破者順；若不渴神昏，漫腫脈細，應期無膿，飲食不思者逆。初服奪命丹以退寒熱，次服仙方活命飲。其餘內外治法，俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

奪命丹

輕粉 麝香
白砒 各五分，麵裹火煨 白礬 煅
辰砂 為衣 血竭 各一錢
雄黃 二錢 蟾酥 二錢，乾者酒化入藥
乳香 沒藥
寒水石 煅 銅綠 各二錢
蝸牛 二十一個，連殼

右為細末，先將蝸牛研爛如泥，勻合前藥丸，如不成，加好黃酒少許，打三五百下為丸，如菉豆大。每服二三丸，先用葱白一寸，令病者嚼爛，自吐於手心內，男用左手，女用右手，將藥丸裹入葱泥內，用無灰酒一大鍾溫熱送下，被蓋汗出為度。重者不過三服，不可多用。

方歌 奪命丹中粉麝香，砒礬砂竭共雄黃，蟾酥乳沒寒水石，銅綠蝸牛用最良。

仙方活命飲 見腫瘍門

串疽圖



串疽

串疽生於背脇間連發相串色依然漫腫漸紅多疼痛積憤鬱火是其原

註 此證生於背脇之間初發一處其後挨次發出二三處形雖不同而色仍同也潰後多相串通故又名老鼠鑽又名遊走血脾癰初發漫腫無頭皮色如常漸腫漸透紅色多疼牽引旁處疼痛因積憤鬱火而成也初服仙方活命飲宜解鬱毒其次內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

仙方活命飲見腫瘍門

酒毒發圖

酒毒發

酒毒發生滿背間皮色不變如彈拳堅硬麻木痛徹內藥酒厚味使之然

註 此證生於脊背皮色不變纍纍如彈如拳堅硬如石時麻時木痛徹五內二便澀滯遍身拘急數日後頭面手足虛腫泄瀉似痢總由過飲藥酒更兼厚味積毒所致初起宜服連翹消毒飲次服內疏黃連湯其證或消或潰須宜速治為順若遷延日久不消不潰必腐

爛筋骨即成逆證其餘內外治法俱按癰疽
腫瘍潰瘍門

連翹消毒飲

連翹去心　梔子
桔梗　赤芍
當歸　元參
射干　黃芩
紅花　葛根
陳皮各一錢　甘草生五分
大黃初起便燥者加一錢　花粉一錢
水二鍾煎八分食遠服
有痰者加竹茹一錢

方歌　連翹消毒療諸瘡能解酒毒葛大黃紅花梔
桔元參草芍芩花粉射陳當

內疏黃連湯見腫瘍門

連珠發圖

連珠發

連珠毒發貫珠形在背微疼色淡紅發時尿閉少
腹滿陰囊作腫百節疼

註　此證生於背不論左右連腫三五塊形若貫
珠由榮血火毒或酒色過度而成其瘡微痛
皮色淡紅發時少腹脹滿小水閉澁陰囊作
腫百節疼痛初起宜服神授衛生湯加木通
車前其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

神授衛生湯見腫瘍門

丹毒發圖

丹毒發

丹毒發如湯火傷細瘤赤暈渴非常丹石剛劑致
此證紅活者生紫黯亡

註 此證生於背形如湯火所傷細瘤無數赤暈延開發時其渴非常由素服丹石剛劑所致初服黃連消毒飲兼國老膏服之外用牛肉薄片貼之其色紅活鮮潤神清者生若紫黯神昏更兼瘈瘲膨脹嘔噦者亡

國老膏

甘草大者二觔

搥碎河水浸一宿揉令漿汁濃去盡筋渣再用絹濾過銀器內慢火熬成膏用磁罐收貯每服三錢無灰溫酒調下或白滾水亦可

方歌 國老膏解丹石毒諸瘡用此腫卽消甘草二觔河水泡取汁熬膏溫酒調

黃連消毒飲 見頭部百會疽

禽疽圖

禽疽

禽疽毒由時氣成數塊似疹色紫紅背生形如拳打狀拘急麻木不作疼

註 此疽之毒由時氣風熱而成始發數塊如疹其色紫紅在背而生形如拳打之狀脊背麻木拘急而不作痛神清脉和服藥得汗者順若神昏脉躁或微或代發寒齒噤者逆初宜急服仙方活命飲加羌活獨活汗之外敷二味拔毒散或蝌蚪拔毒散消之若漫腫不潰即服托裏透膿湯其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

仙方活命飲

二味拔毒散

蝌蚪拔毒散 俱見腫瘍門

托裏透膿湯 見頭部侵腦疽

痰注發圖

痰注發

痰注發如布袋形按之木硬覺微疼其發不紅亦不熱濕痰七情鬱滯成

註 此證發於脊背長形如布袋短形如冬瓜按之木硬微覺疼痛不熱不紅皮色如常由濕痰七情鬱滯凝結於肌肉之分日積深久而成初起宜服疏科流氣飲外貼金鳳化痰膏消之如此證久遠疲頑治之不消者屆期要潰治法俱按癰疽潰瘍門

瘡科流氣飲

人參　厚朴 薑製

桔梗　防風

紫蘇　黃耆 鹽水炒

枳殼 麩炒　當歸

白芍 酒炒　肉桂

烏藥　甘草 各七分

川芎　南木香

白芷　檳榔 各五分

引加生薑一片水二鍾煎八分溫服

方歌　流氣飲舒痰涎壅人參朴桔芷防風蘇耆殼

桂木香草烏藥檳榔歸芍芎

金鳳化痰膏

鳳仙花 一棵去青蒂研末　大葱自然汁 一茶鍾

好米醋 一茶鍾　廣膠 三錢葱汁內泡之切如米粒大入

人中白 八錢火微煅存性研末

先將葱汁米醋廣膠投入鍋內熬化次下鳳

仙花末熬成膏再入人中白末將鍋離火不

時攪勻用時以重湯炖化量痰包之大小薄

紙攤貼候膏自落再換新膏

方歌　金鳳化痰消硬堅濕痰串注貼更痊鳳仙中

白廣膠醋葱汁同熬用紙攤

黃瓜癰圖

黃瓜癰

黃瓜癰在背旁生　脾火色紅黃瓜形　腫高寸餘長尺許　四肢麻木引心疼

註 此證生於背旁一名肉龜由脾火積毒而成皮肉色紅狀若黃瓜腫高寸餘長可尺許四肢麻木疼痛引心紅活速潰者順紫陷無膿微自汗譫語堅硬潰遲者逆初起宜服仙方活命飲加羌活柴胡或奪命丹治之其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

仙方活命飲 見腫瘍門

奪命丹 見陰陽二氣疽

腎俞發圖



腰部

腎俞發

腎俞發生腎俞穴　單者酒色兼濕熱　房勞怒火則雙生　紅活黑陷順逆別

註 此證生腎俞穴在腰骨兩旁陷肉處有單有雙單者由酒色濕熱而成雙者由房勞怒火而發若瘡形紅活高腫十四日生膿屬順若瘡形紫黑乾枯堅硬應期無膿屬逆或膿稀傷膜者係真陽血氣大虧初宜服人參養榮

湯或加減八味丸以救其源其順逆內外治
法俱按癰疽腫瘍潰瘍門
人參養榮湯
加減八味丸 俱見潰瘍門

中石疽圖

中石疽
石疽寒凝瘀血聚生於腰胯最纏綿堅硬如石皮
不變時覺木痛消潰難
註 此證由寒氣瘀血凝結生於腰胯之間纏綿難以收功其疽時覺木痛難消難潰堅硬如石皮色不變初宜內服沒藥丸外用鮮商陸搗爛貼於患處治之隨用艾壯當頂灸之以軟爲度潰後按癰疽潰瘍治法

沒藥丸
桃仁炒一兩 乳香
沒藥 川芎
川椒去目及合口者 當歸
赤芍各五錢 自然銅火燒醋淬七次二錢五分
共研細末用黃蠟二兩火化開入藥末不住手攪勻丸如彈子大每用一丸以好酒一鍾將藥化開煎至五分乘熱服下
方歌 沒藥丸治中石疽乳沒桃芎歸芍宜川椒自然銅黃蠟用酒服之行血瘀

纏腰火丹圖

纏腰火丹

纏腰火丹蛇串名乾濕紅黃似珠形肝心脾肺風
熱濕纏腰已徧不能生

註 此證俗名蛇串瘡有乾濕不同紅黃之異皆如纍纍珠形乾者色紅赤形如雲片上起風粟作癢發熱此屬肝心二經風火治宜龍膽瀉肝湯濕者色黃白水皰大小不等作爛流水較乾者多疼此屬脾肺二經濕熱治宜除濕胃苓湯若腰肋生之係肝火妄動宜用柴胡清肝湯治之其間小皰用線鍼穿破外用栢葉散敷之若不速治纏腰已徧毒氣入臍令人膨脹悶嘔者逆

龍膽瀉肝湯

龍膽草　連翹去心
生地　澤瀉各一錢
車前子　木通
黃芩　黃連
當歸　梔子生研

甘草生各五分　生軍二錢便秘加之

水二鍾煎八分食前服

方歌 龍膽瀉肝火丹生形如雲片粟多紅芩連梔
膽車歸尾生地軍翹瀉木通

除濕胃苓湯

蒼朮炒　厚朴薑炒
陳皮　豬苓
澤瀉　赤茯苓
白朮土炒　滑石

防風　山梔子生研
木通各一錢　肉桂
甘草生各三分
水二鍾燈心五十寸煎八分食前服
方歌 除濕胃苓火丹瘡　脾肺濕熱皰白黃　胃苓湯
用通梔子滑石防風共作湯

栢葉散
側栢葉炒黃爲末　蚯蚓糞韭菜地內者佳
黃蘗　大黃各五錢

雄黃　赤小豆
輕粉各三錢
右爲細末新汲水調搽香油調搽更效
方歌 栢葉散搽火丹方　大黃赤豆蘗雄黃　栢葉輕
粉蚯蚓糞研末香油調更良
柴胡清肝湯見頭部鬢疽

御纂醫宗金鑑卷六十五
編輯外科心法要訣目錄

眼部
眼胞菌毒
眼丹
鍼眼
眼胞痰核
椒瘡
粟瘡

皮翻證
漏睛瘡
目中努肉
鼻部
鼻疽
鼻疔
鼻淵
鼻䘌瘡
鼻痔

鼻痔

肺風粉刺

酒皶鼻

耳部

黑疔

耳疳

耳衄

耳痔

耳蕈

耳挺

旋耳瘡

口部

大人口破

鵝口瘡

口糜

脣部

反脣疔

鎖口疔

脣疽

繭脣

脣風

齒部

牙衄

牙宣

鑽牙疳

牙疔

牙癰

走馬牙疳

齒䘌

齒齲

編輯外科心法要訣

眼胞菌毒圖

眼部

眼胞菌毒

菌毒生於眼睫邊如菌黃亮水疱圓頭大蔕小漸垂出脾濕鬱熱結凝堅

註 此證生於上下眼胞睫邊初如菌形頭大蔕小黃亮水疱或有頭小蔕大者漸長垂出堅凝不痛有纏綿經年不愈者以致目病益眼胞屬脾其經素有濕熱思鬱氣結而生也初起宜用清涼圓洗即消有經年皮厚消之不應者法當用銀錫紙蘸水潤眼皮菌毒處少頃用左手大指甲墊於患根右手持鈹鍼尖頭齊根切下血出不妨即用翠雲錠磨濃塗之其血即止內服涼膈清脾飲忌海腥煎炒

清涼圓

當歸尾　石菖蒲

赤芍藥 各一錢　川黃連 生

地膚子　杏仁 生各一錢

羌活 五分　膽礬 二分

共研粗末以大紅紬包之如櫻桃大甜滾水浸泡乘熱蘸洗勿見塵土

方歌 清涼圓內用川連歸尾菖蒲芍膽礬羌活杏仁地膚子菌毒初起洗之痊

翠雲錠子

杭粉 五兩　銅綠

黃連 各一兩　輕粉 一錢

共為細末用糯米百粒水一盌煎半盌去米再煎至三分和藥作錠陰乾用時水磨令濃

以雞翎蘸塗患處

方歌 翠雲錠子能止血銅綠輕杭黃連强共爲細末和成錠菌毒切後塗之良

涼膈清脾飲

生地黃　連翹去心

梔子生研　薄荷

荆芥　防風

石膏煅　黃芩

赤芍各一錢　甘草生五分

水二鍾燈心二十根煎八分食遠服

方歌 涼膈清脾生地黃連翹梔子薄荆防石膏芩芍兼甘草醫治菌毒服卽康

眼丹圖

眼丹

眼丹眼胞上下生紅熱腫痛輭偏風燄熱紫硬偏於熱荆防敗毒服有功

註 此證由脾胃濕熱受風而成紅腫疼痛若腫輭下垂不能視物者偏於風盛也浮腫易消若焮紅色紫堅硬者偏於熱盛也腫硬難消初起俱宜荆防敗毒散散其風口渴便燥者宜內疏黃連湯瀉其熱有日久消之不應者宜服透膿散膿熟鍼之腫用如意金黃散洗

之潰用琥珀膏或白膏藥貼之此證宜速潰
遲則潰深穿透眼胞成漏難斂

荊防敗毒散 見項部腦疽

內疏黃連湯

如意金黃散

透膿散 俱見腫瘍門

琥珀膏 見頭部髮際瘡

白膏藥 見潰瘍門

鉞眼圖

鉞眼

鉞眼眼睫豆粒形輕者洗消膿不成甚則赤痛膿
鉞愈破後風侵浮腫生

注 此證生於眼皮毛睫間由脾經風熱而成形如豆粒有尖初起輕者宜用如意金黃散鹽湯冲洗膿不成即消矣風熱甚者色赤多痛洗之不消膿已成也候熟鉞之貼黃連膏亦有破後邪風侵入瘡口令人頭面浮腫目赤澀痛者外仍洗之內服芎皮散即愈

芎皮散

川芎二兩　青皮一兩

共為末每服二錢菊花湯調服

外以枯礬末雞子清調敷腫處

又用南星末同生地黃搗膏貼太陽穴自消

方歌 芎皮散內用川芎青皮減半用最靈為末菊
花湯調服醫治鉞眼自成功

如意金黃散 見腫瘍門

黃連膏 見鼻部鼻瘡內

眼胞痰核圖

眼胞痰核

眼胞痰核濕氣鬱核結如棗如豆形皮裏肉外推之動皮色如常硬不疼

註 此證結於上下眼胞皮裏肉外其形大者如棗小者如豆推之移動皮色如常硬腫不疼由濕痰氣鬱而成宜服化堅二陳丸外用生南星蘸醋磨濃頻塗眼皮日數淺者即消日數深者雖不能即消常塗令皮薄微微撥損以手指甲擠出如白粉汁即消貼貝葉膏收口從眼皮裏潰破者難斂

化堅二陳丸

陳皮　半夏製各一兩

白茯苓一兩五錢　甘草生三錢

白殭蠶炒二兩　川黃連三錢

共研細末荷葉熬湯合丸如梧桐子大每服二錢白滚水送下

方歌 化堅二陳丸消痰　週身結核服更痊　陳皮半夏茯苓草　殭蠶荷葉川黃連

貝葉膏見潰瘍門

椒瘡圖

粟瘡圖

椒瘡粟瘡

椒瘡粟瘡生胞裏　脾胃血熱是根苗
粟瘡黃輭濕易散　椒瘡赤硬熱難消

註此二證生於眼胞之裏雖皆由脾胃血熱所致然粟瘡偏於濕盛故色黃形輭其證易愈椒瘡偏於熱盛故色赤形硬其瘡難消俱宜服清脾涼血湯外以清涼圓洗之若眼皮裏有紅絲堆纍者乃血熱有瘀也法以燈草刮瘡處令血出即愈

清脾涼血湯

荊芥　防風
赤芍　黑參
陳皮　蟬蛻
蒼朮炒　白鮮皮各一錢
連翹去心　生大黃酒洗各一錢五分
厚朴薑炒　甘草生各五分
竹葉三十片水煎食遠服

方歌　清脾涼血椒粟瘡厚朴陳皮翹芍蒼蟬蛻黑

參荆防草白鮮皮，共生大黃

清涼圓見繭唇

皮翻證圖

皮翻證

皮翻證係眼胞翻，狀如舌舐唇一般，翻因胞腫睫緊故，血壅氣滯胃經原。

註 此證由胃經血壅氣滯而成，小兒多有之。眼皮外翻，如以舌舐唇之狀，又如痘風眼爛胞腫弦緊者，則眼皮亦翻，治宜瀉脾胃之積熱，以瀉黃散服之即愈。亦有內翻者，即目科拳毛倒睫，弦弛不內外翻者，即目科胞垂難視之證也。

瀉黃散

石膏 煅，五錢　梔子仁 生，一兩

甘草 生，三兩　防風 酒拌微炒香，二兩

豨薟草 酒蒸曬乾，四兩

共研細末，壯人二錢，弱人一錢，小兒六七分，白滾水調下。

方歌 瀉黃散治皮翻證，石膏梔子草防風，豨薟草同研細末，滾水調下有奇功。

漏睛瘡圖

漏睛瘡

漏睛瘡在大眥生肝熱風濕病睛明紅腫痛潰膿稠易青黑膿稀難長平

註此證生於目大眥由肝熱風濕病發於太陽膀胱經睛明穴其穴之處係藏淚之所初起如豆如棗紅腫疼痛瘡勢雖小根源甚深潰破出黏白膿者順出青黑膿或如膏者險初宜服疏風清肝湯潰後用黃靈藥撚入瘡口兼貼萬應膏其口漸漸收斂有膿從大眥內出者成漏難斂亦有瘡口過出淚液以致目內乾澀者收斂更遲若潰斷眼邊弦者不治

疏風清肝湯

當歸尾　赤芍
荊芥穗　防風
川芎　菊花
生梔　薄荷各一錢
柴胡　連翹去心各一錢五分
金銀花二錢　甘草生五分

燈心五十寸水煎食遠服

方歌　疏風清肝漏睛瘡又除肝熱散風強歸芍銀花芎菊草柴翹梔子薄荊防

黃靈藥

萬應膏俱見潰瘍門

目中努肉圖

目中努肉

目中努肉心火成實火大眥色深紅小眥紅絲淡
虛火努肉時覺或脹疼

註 此證生於目兩眥瘀肉努出時覺疼痛總屬心火所成然火有虛實如大眥紅肉色深紅者心經實火也宜黑參湯服之小眥紅絲色淡紅者心經虛火也宜決明散主之外俱用清涼圓泡洗久久自愈

黑參湯

黑參　苦參
梔子研　菊花
黃連　枳殼麸炒
草決明　車前子
防風　大黃炒
升麻各二錢

水煎食後服

方歌 黑參湯治大眥疼肉生努肉實火成苦參梔菊黃連殼草決車防大黃升

決明散

玉竹　黃連
枳殼麸炒　川芎
甘草生　羚羊角鎊各一兩
車前子　青葙子
草決明各五錢

共研細末每服三錢食後服臥時再用一服

方歌 決明努肉虛火攻玉竹黃連枳殼芎車前青葙羚羊草研末水調最有功

清涼圓見蕈毒

鼻疽圖

鼻部

鼻疽

鼻疽生於鼻柱間肺經鬱火發督原堅硬色紫常木痛千金仙方托裏痊

註此證生於鼻柱屬督脈經鼻為肺竅故又屬肺由肺經鬱火凝結而成堅硬色紫時覺木痛初宜服千金漏蘆湯宣解鬱毒次用仙方活命飲加梔子木通薄荷桔梗消之若腫痛不減勢欲作膿則宜托裏透膿湯主之外治

法按癰疽潰瘍門

千金漏蘆湯

漏蘆一兩　枳殼麩炒二兩
朴硝一兩　大黃一兩五錢
甘草生一兩　麻黃一兩
黃芩一兩　白斂一兩
連翹去心一兩　升麻一兩

共研末每用二錢水一鍾薑三片薄荷葉一錢煎五分溫服以取便利為度

方歌　千金漏蘆鼻疽發色紫堅疼效更嘉漏蘆枳殼硝黃草麻芩白斂翹升麻

仙方活命飲見腫瘍門

托裏透膿湯見頭部侵腦疽

鼻疔圖

鼻疔

鼻疔生在鼻孔中鼻竅腫引腦門疼甚則唇腮俱浮腫肺經火毒蟾離宮

註　此證生於鼻孔內鼻竅腫塞脹痛引腦門甚則唇腮俱作浮腫由肺經火毒凝結而成宜蟾酥丸汗之再用蟾酥丸研細末吹入鼻竅若腫硬外發用離宮錠塗之此證初起之時須當速治遲則毒氣內攻以致神昏嘔噦鼻腫如瓶者逆

蟾酥丸 見疔瘡門

離宮錠 見癰瘍門

鼻淵

鼻淵濁涕流鼻中久淋血水穢而腥膽熱移腦風寒火控腦砂因蝕腦蟲

註 此證內因膽經之熱移於腦髓外因風寒凝鬱火邪而成鼻竅中時流黃色濁涕宜奇授藿香丸服之若久而不愈鼻中淋瀝腥穢血水頭眩虛暈而痛者必係蟲蝕腦也即名控

腦砂宜天羅散服之但此證久則必虛當以補中益氣湯兼服之即效

奇授藿香丸

藿香連枝葉 八兩

研細末雄豬膽汁和丸如梧桐子大每服五錢食後蒼耳子湯下或黃酒送下

方歌 奇授藿香鼻淵流濁涕淋漓久不休豬膽汁合藿香末蒼耳湯下患可瘳

天羅散

絲瓜藤 近根處者 燒存性

為末每用三錢食後黃酒送下

方歌 天羅蟲蝕腦髓中頭痛鼻流血水腥絲瓜根燒研細末黃酒調服慣殺蟲

補中益氣湯 見潰瘍門

鼻䘌瘡圖

鼻䘌瘡

鼻䘌瘡多小兒生鼻下兩旁斑爛形總由風熱客於肺膿汁浸淫癢不疼

註 此證多生小兒鼻下兩旁色紫斑爛由風熱客於肺經膿汁浸淫癢而不痛宜服澤瀉散外搽青蛤散即愈

澤瀉散

澤瀉　鬱金

山梔生　甘草生各一錢

共研末每服一錢甘草煎湯調下

方歌 澤瀉散治鼻䘌患膿汁浸淫肺火毒澤瀉鬱金梔草末甘草煎湯調送服

青蛤散

蛤粉一兩煅　青黛三錢

石膏一兩煅　輕粉

黃蘗生末各五錢

共研細末先用香油調成塊次加涼水調稀薄塗瘡處

方歌 青蛤散塗鼻䘌消蛤粉青黛煅石膏輕粉黃蘗研極細香油拌塊涼水調

鼻瘡鼻痔圖

鼻瘡

鼻瘡肺熱生鼻中燥乾如火微腫疼內服黃芩外
定痛燥乾黃連膏潤靈

註此證生於鼻竅內初覺乾燥疼痛狀如粟粒甚則鼻外色紅微腫痛似火炙由肺經壅熱上攻鼻竅聚而不散致成此瘡內宜黃芩湯清之外用油紙撚粘辰砂定痛散送入鼻孔內若乾燥者黃連膏抹之立效

黃芩湯

黃芩一錢酒炒　甘草五分生
麥冬一錢去心　桑白皮一錢生
梔子一錢五分連皮酒炒　連翹去心
赤芍　桔梗
薄荷　荊芥穗各一錢

水煎食後服

方歌黃芩湯醫肺火盛鼻內生瘡赤腫疼芩草麥
冬桑梔翹赤芍桔梗薄荷荊

辰砂定痛散

辰砂五分末　冰片二分
胡黃連二兩末　石膏一兩煅

共研細末

方歌辰砂定痛鼻瘡乾冰片胡連膏煅研油紙撚
蘸入鼻孔消疼散熱效通仙

黃連膏

黃連三錢　當歸尾五錢
生地一兩　黃蘗三錢
薑黃三錢

香油十二兩將藥煠枯撈去渣下黃蠟四兩溶化盡用夏布將油濾淨傾入磁盌內以柳枝不時攪之候凝為度

方歌黃連膏潤諸燥瘡歸尾生地蘗薑黃油煠去
渣加黃蠟布濾攪凝塗抹強

鼻痔

鼻痔初起榴子形久垂紫硬礙氣通肺經風濕熱
鬱滯內服辛夷外點平

註此證生於鼻內形如石榴子漸大下垂色紫

微硬撐塞鼻孔礙人氣息難通由肺經風濕熱鬱凝滯而成內服辛夷清肺飲以清肺熱外以硇砂散逐日點之漸化爲水而愈宜戒厚味暴怒庶不再發

辛夷清肺飲

辛夷六分　甘草生五分

石膏煅　知母

梔子生研　黃芩各一錢

枇杷葉三片去毛蜜炙　升麻三分

百合　麥冬去心各一錢

水二鍾煎八分食遠服

或加羌活防風連翹薄荷

方歌　鼻痔辛夷清肺飲辛草膏知梔子芩枇杷升麻百合麥或加羌活翹薄斟

硇砂散見耳部耳痔內

肺風粉刺圖

肺風粉刺

肺風粉刺肺經熱面鼻疙瘩赤腫疼破出粉汁或結屑枇杷顛倒自收功

註　此證由肺經血熱而成每發於面鼻起碎疙瘩形如黍屑色赤腫痛破出白粉汁日久皆成白屑形如黍米白屑宜內服枇杷清肺飲外敷顛倒散緩緩自收功也

枇杷清肺飲

人參三分　枇杷葉二錢刷去毛蜜炙

甘草生三分 黃連一錢

桑白皮鮮者佳二錢 黃蘗一錢

水一鍾半煎七分食遠服

方歌 枇杷清肺枇杷葉參草黃連桑白皮黃蘗同煎食遠服肺風粉刺盡皆宜

顛倒散

大黃 硫黃各等分

研細末共合一處再研勻以涼水調敷

方歌 顛倒散敷功效極大黃硫黃各研細等分再勻涼水調耑醫酒皶肺風刺

酒皶鼻圖

酒皶鼻

酒皶鼻生準及邊胃火薰肺外受寒血凝初紅久紫黑宣鬱活瘀緩緩痊

註 此證生於鼻準頭及鼻兩邊由胃火薰肺更因風寒外束血瘀凝結故先紅後紫久變為黑最為纏綿治宜宣肺中鬱氣化滯血如麻黃宣肺酒涼血四物湯俱可選用使榮衛流通以滋新血再以顛倒散敷於患處若日久不愈以梔子仁丸服之緩緩取愈

麻黃宣肺酒

麻黃　　麻黃根各二兩

頭生酒五壺將藥入酒內重湯煑三炷香露

一宿早晚各飲一二五杯至三五日出膿成瘡

十餘日則膿盡膿盡則紅色退先黃後白而

愈

方歌麻黃宣肺酒皶鼻血熱上注外寒瘀麻黃並

根入酒泡重湯煑飲效不虛

涼血四物湯

當歸　　生地

川芎　　赤芍

黃芩酒炒　　赤茯苓

陳皮　　紅花酒洗

甘草生各一錢

水二鍾薑三片煎八分加酒一杯調五靈脂

末二錢熱服

氣弱者加酒炒黃耆二錢立效

方歌涼血四物皶鼻紅散瘀化滯又調榮芩苓四

物陳紅草薑煎加酒入五靈

梔子仁丸

梔子仁研末黃蠟溶化和丸如彈子大每服一

丸茶清嚼下忌辛辣之物

方歌梔子仁丸皶鼻赤紫黑纏綿皆可施梔子爲

末黃蠟化丸似彈子茶清食

顛倒散見肺風粉刺

耳部六證圖

耳部

黑疔

黑疔暗藏耳竅生色黑根深椒目形痛如錐刺引腮腦破流血水火毒攻

註　此證生於耳竅暗藏之處由腎經火毒所發亦有因服丹石熱藥積毒而成者色黑根深形如椒目疼如錐刺痛引腮腦破流血水急服蟾酥丸汗之再用蟾酥丸水調濃滴於耳竅內立效毒甚者以黄連消毒飲疎解之黄連解毒湯清之即瘥

黄連解毒湯

黄連　黄芩

黄蘗　生梔子研各一錢五分

水煎熱服

方歌　黄連解毒燎痛瘡諸般疔毒煩躁狂黄連芩蘗生梔子四味煎服保安康

蟾酥丸見疔瘡門

黄連消毒飲見頭部百會疽

耳疳

耳疳時出黑臭膿青震白纏黄色停胃濕相兼肝經火紅風偏肝血熱成

註　此證耳內悶腫出膿因膿色不一而名亦各殊如出黑色臭膿者名耳疳出青膿者名震耳出白膿者名纏耳出黄膿者名停耳俱由胃濕與肝火相兼而成宜柴胡清肝湯主之氣實火盛者以龍膽瀉肝湯服之惟風耳則出紅膿偏於肝經血熱宜用四物湯加丹皮

石菖蒲服之外俱用醬茄內自然油滴之俟
膿淨換滴耳油時時滴入腫消生肌自愈

滴耳油

核桃仁研爛擰油去渣得油一錢兌冰片二分
每用少許滴於耳內

方歌 滴耳油治耳痔證膿淨滴之效更深核桃擰
油消腫痛冰片發散熱通神

柴胡清肝湯見頭部鬢疽

龍膽瀉肝湯見腰部纏腰火丹

四物湯見潰瘍門

耳衄

耳衄上焦血熱成鮮血時流耳竅中肝火柴胡清
肝治胃熱生地麥門冬

註 此證由上焦血熱所致耳竅中時流鮮血若
肝脈弦數者以柴胡清肝湯服之腎脈虛數
者以生地麥冬飲主之總以涼血為急乃抽
薪止沸之法也外以神塞丸塞之即瘥

生地麥冬飲

生地黃 麥冬去心各五錢

水二鍾煎八分食後服

方歌 生地麥冬耳衄鮮上焦血熱是其原各用五
錢煎食後清肺降火保平安

神塞丸

麝香一分 生白礬一錢
沉香三分 糯米五十粒

共研細末麪糊為丸如梧桐子大每丸薄綿
裹之如左耳出血塞右鼻右耳出血塞左鼻
左鼻出血塞右耳右鼻出血塞左耳兩耳俱
出血塞兩鼻兩鼻俱出血塞兩耳

方歌 神塞麝香生白礬沉糯同研麪糊丸大如梧
子薄綿裹塞入耳鼻衄血痊

柴胡清肝湯見頭部鬢疽

耳痔 耳蕈 耳挺

耳痔蕈挺耳竅生肝腎胃火凝結成微腫悶疼皮
損破塞久令人必重聽

註 此三證皆生耳內耳痔形如櫻桃亦有形如

羊奶者耳蕈形類初生蘑菇頭大蒂小耳挺形若棗核細條而長努出耳外俱由肝經怒火腎經相火胃經積火凝結而成微腫悶疼色紅皮破不當觸犯偶犯之痛引腦巔皆宜服梔子清肝湯外用硇砂散點之漸漸消化

梔子清肝湯

梔子生研　川芎
當歸　柴胡
白芍酒炒　丹皮各一錢

甘草生五分　石膏煅
牛蒡子炒研各一錢　黃芩
黃連各五分

水二鍾煎八分食後服

方歌　梔子清肝蕈痔挺腎肝胃火忿怒成芎歸柴芍丹皮草膏蒡芩連用有功

硇砂散

硇砂一錢　輕粉
雄黃各三分　冰片五釐

共研細末水調濃用穀草細梗咬毛蘸點痔上

方歌　硇砂散實有奇功痔蕈挺在耳內生輕片雄黃研爲末水調點痔消縮形

旋耳瘡圖

旋耳瘡

旋耳瘡生耳後縫瘡延上下連耳疼狀如刀裂因濕熱穿粉散搽即成功

註 此證生於耳後縫間延及耳摺上下如刀裂之狀色紅時津黃水由膽脾濕熱所致然此瘡月盈則瘡盛月虧則瘡衰隨月盈虧是以又名月蝕瘡也宜穿粉散搽之即可成功

穿粉散

輕粉 研隔紙微炒　穿山甲 炙

鉛粉　黃丹 水飛過 各三錢

共研極細香油調敷

方歌 穿粉散敷旋耳瘡清熱滲濕油調良輕粉研細隔紙炒穿山甲共鉛粉黃

口部

大人口破

大人口破分虛實豔紅為實淡紅虛實則滿口爛斑腮虛白不腫點微稀

註 此證名曰口瘡有虛火實火之分虛火者色淡紅滿口白斑微點甚者陷露龜紋脈虛不渴此因思慮太過多醒少睡以致心腎不交虛火上炎宜服四物湯加黃蘗知母丹皮少佐肉桂以為引導從治之法也外以柳花散搽之實火者色豔紅滿口爛斑甚者腮舌俱腫脈實口乾此因過食膏粱厚味醇酒炙煿以致心脾實火妄動宜服涼膈散外搽赴筵散吐涎則效如口瘡舌乾黃硬作渴者宜服加減八味丸以滋化源俱禁水漱

柳花散

黃蘗 末 一兩　青黛 三錢

肉桂 一錢　龍腦香 即冰片 二分

各研細再合一處研勻每用少許搽於患處

方歌 柳花散治白口瘡黃蘗青黛龍腦香肉桂共研搽患處虛火上炎自平康

赴筵散

黃芩　黃連

梔子生　乾薑

黃蘗末　細辛各等分

共研細末每用少許搽於患處

方歌 赴筵散醫實火攻口瘡斑爛色多紅芩連梔子乾薑蘗細辛同研有神功

涼膈散見面部面發毒

加減八味丸見潰瘍門

鵞口瘡

鵞口滿口白斑點小兒心脾熱所生初生多是胎中熱甚則咽喉疊腫疼

註 此證小兒多有之屬心脾二經之熱所生初生小兒則屬胎熱上攻所致滿口皆生白色斑點作痛甚則咽喉疊疊腫起難於乳哺多生啼叫法用青紗一條裹筋頭上蘸新汲水揩去白胎以淨為度重手血出無妨隨用冰硼散搽之內服涼膈散即愈

冰硼散

冰片五分　硼砂

元明粉各五錢　硃砂六分

共研極細末用少許搽於瘡處如咽喉腫痛以蘆筒吹之立效

方歌 冰硼散治咽腫痛口瘡白點滿口生冰硼硃砂元明粉研末搽之立見功

涼膈散見面部面發毒

口糜

口糜陰虛陽火成膀胱濕水溢脾經濕與熱瘀薰胃口滿口糜爛色紅疼

註 此證由陽旺陰虛膀胱濕水泛溢脾經濕與熱瘀鬱久則化為熱熱氣薰蒸胃口以致滿口糜爛甚於口瘡色紅作痛甚則連及咽喉不能飲食初起宜服導赤湯口臭瀉泄脾虛濕者宜服連理湯糜爛延及咽喉日輕夜重

者服少陰甘桔湯便秘者服涼膈散外俱以
黃蘗散搽之有效

導赤湯

木通　生地各二錢
甘草生一錢
竹葉二十片水一鍾煎半鍾溫服

方歌 導赤湯醫口糜證脾濕化熱薰胃成木通生
地生甘草竹葉煎服熱自平

加味連理湯

白朮土炒二錢　人參
白茯苓　黃連
乾薑各一錢　甘草炙五分
水煎熱服

方歌 連理胃熱脾虛濕口糜臭氣瀉泄俱參苓白
朮炙甘草乾薑黃連脾胃宜

少陰甘桔湯

桔梗二錢　甘草生一錢
川芎　黃芩
陳皮　元參
柴胡各六分　羌活
升麻各四分
葱白一根水二鍾煎八分食遠服

方歌 少陰甘桔治口糜芎芩羌活桔陳皮元參柴
草升麻共葱白水煎神效奇

黃蘗散

乾薑　黃蘗末各等分
各研末共合一處研勻乾搽口內溫水漱口

方歌 黃蘗散搽口糜爛黃蘗乾薑各細研等分兌
勻搽患處溫水漱口效如仙

涼膈散見背部內發毒

反脣疔圖



鎖口疔圖



脣部

反脣疔 鎖口疔

反脣疔發脣裏稜鎖口疔在嘴角生粟米堅腫麻
癢痛脾胃心經火毒成

註 此二證俱由火毒而成反脣疔生於脣稜偏裏上脣屬脾下脣屬胃鎖口疔生於嘴角係心脾二經所屬二證初起形如粟米色紫堅硬如鐵腫甚麻癢木痛寒熱交作煩悶作嘔反脣甚則令脣外翻鎖口甚則口不能開俱

屬迅速之證須當速治遲則毒氣攻裏令人昏憒惡心即名走黃治法俱按疔門禁用灸法

脣疽圖

脣疽

脣疽生於上下脣寒熱交爭毒氣深紫硬時覺木痛甚脾胃積熱乃其因

註 此證生於脣無論上下左右由脾胃積熱所致色紫有頭大者如李小者如棗腫硬如鐵時覺木痛甚則寒熱交作初宜服神授衛生湯裏實者服雙解貴金丸外用離宮錠塗之即消若過數日猶不消者必欲潰破治法即按癰疽腫瘍潰瘍門

神授衛生湯

雙解貴金丸

離宮錠 俱見腫瘍門

繭脣圖

繭脣

繭脣脾胃積火成初如豆粒漸繭形痛硬潰若翻花逆久變三消定主凶

註 此證由脾胃積火結聚而成初起如豆粒漸長若蠶繭堅硬疼痛妨礙飲食初起及已成無內證者用蟾酥餅貼之陀僧膏蓋之日久漸消或口渴者宜服清涼甘露飲若面赤口脣燥裂便秘者此屬氣實宜服涼膈散若日輕夜重五心煩熱兩顴現紅脈虛數無力者

宜服加減八味丸以滋水養陰若潰後如翻花時津血水者屬逆失於調治久則變爲上消中消下消之證屬凶

清涼甘露飲

麥冬去心 知母

黃芩 石斛

枳殼麸炒 枇杷葉去毛蜜炙

銀柴胡 犀角鎊

生地 茵蔯蒿

甘草生各一錢

燈心五十寸淡竹葉一錢水二鍾煎八分食遠服

方歌 清涼甘露醫繭脣潤燥止渴又生津麥冬知草芩斛殼枇杷銀胡犀地茵

蟾酥餅見疔瘡門

陀僧膏見潰瘍門

涼膈散見面部面發毒

加減八味丸見潰瘍門

脣風圖

臂風

臂風多在下臂生陽明胃經風火攻初起發癢色紅腫久裂流水火燎疼

註 此證多生下臂由陽明胃經風火凝結而成初起發癢色紅作腫日久破裂流水疼如火燎又似無皮如風盛則臂不時瞤動俱內以雙解通聖散服之外以黃連膏抹之自愈

雙解通聖散

防風 荆芥
當歸 白芍酒炒
連翹去心 白朮土炒
川芎 薄荷
麻黃 梔子各五錢
黃芩 石膏煅
桔梗各一兩 甘草生二兩
滑石三兩

共研粗末每用五錢水一鍾半煎八分澄渣溫服

方歌 雙解通聖胃火風疎表清裏膏防荆歸芍連翹芩朮桔麻黃梔草薄滑芎

黃連膏見鼻部鼻瘡

齒部

牙衄

牙衄牙縫內出血胃腎二經虛實熱實多口臭牙

堅牢虛者反此當分別

註此證由熱而成當分虛實無論大人小兒若胃經實熱者則血出如湧口必臭而牙不動宜服清胃湯甚則服調胃承氣湯或用酒製大黃末三錢以枳殼五錢煎湯少加童便調服下黑糞即愈若胃經虛火者牙齦腐爛淡血滲流不已宜服二參湯及補中益氣湯加

黃連丹皮若腎經虛者血則點滴而出牙亦微痛口不臭而牙動或落者治宜滋腎有火者六味地黃丸無火者七味地黃丸俱加猴薑隨手應效若疳積氣臭兼服蘆薈丸外俱用小薊散擦牙隨用青竹茹醋浸一宿含漱甚效

清胃湯

石膏（煅）四錢　黃芩

生地各一錢　丹皮一錢五分

黃連　升麻各一錢

水二鍾煎八分食後服

方歌　清胃陽明實火結口臭相兼齒衄血芩連生地升麻膏丹皮同煎功效捷

調胃承氣湯

大黃（酒浸）四錢　芒硝三錢

甘草（炙）二錢

水三鍾煎一鍾去渣少少溫服

方歌　調胃承氣實火攻齒衄口臭用之靈酒浸大黃芒消草胃熱煎服立刻清

二參湯

人參　元參各等分

水煎溫服

方歌　二參湯醫虛火泛齦腐滲流血水淡人參元參各等分水煎服下有神驗

蘆薈丸

蘆薈　子青皮

白雷丸　白蕪荑
川黃連　胡黃連
鶴虱草各一兩　木香三錢
麝香一錢
共研末蒸餅糊丸如麻子大每服一錢空心
清米湯送下
方歌 蘆薈丸醫積氣盛木麝青皮胡黃連蕪荑雷
丸鶴虱草川連同末蒸餅丸

小薊散
小薊　百草霜
蒲黃微炒　香附子各五錢醋浸透曬乾
右研細末用搽牙上半刻時溫茶漱之
方歌 小薊散搽牙衄方蒲黃微炒百草霜香附同
研爲細末揩牙止血功效强
補中益氣湯見潰瘍門
六味地黃丸見面部雀斑
七味地黃丸即桂附地黃丸減去附子見面部頰瘍

牙宣

牙宣初起腫牙齦日漸腐頹久露根惡熱惡凉當
細別胃經客熱風寒侵

註 此證牙齦宣腫齦肉日漸腐頹久則削縮以
致齒牙宣露總由胃經客熱積久外受邪風
寒凉相搏而成有喜凉飲而惡熱者係客熱
遇寒凉凝滯於齦肉之間有喜熱飲而惡凉
者係客熱受邪風稽留於齦肉之內客熱遇
寒者牙齦出血惡熱口臭宜服清胃湯客熱
受風者牙齦惡凉遇風痛甚宜服獨活散外

有牙齦腐臭齒根動搖者屬胃中虛火而兼
腎虛齒乃腎之餘宜服三因安腎丸又有牙
齦腐臭時津白膿者屬胃中濕熱宜服犀角
升麻湯外俱用胡桐淚散搽之以食鹽冲湯
漱口惟牙齦動搖或兼疼痛者日以李杲牢
牙散搽之夜用固齒白玉膏貼之緩緩取效
若齦肉腐爛露牙床骨者逆

獨活散
獨活　羌活

防風　川芎各一錢六分
薄荷　生地
荊芥各一錢　細辛七分
右為粗末每用二錢水煎澄渣食後服日用
三服

方歌　獨活風毒注牙根齦腫嫌凉痛莫禁羌活防
風共生地薄荷荊芥合芎辛

三因安腎丸

補骨脂炒　胡盧巴炒

茴香炒　川楝子炒
續斷炒各三兩　山藥
杏仁炒　白茯苓
桃仁炒各一兩
共研細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二錢
空心淡鹽湯送下

方歌　三因安腎虛火爍牙齦腐臭齒根搖山藥杏
茴苓骨脂胡盧巴續川楝桃

胡桐淚散

胡桐淚　細辛
川芎　白芷各一錢五分
寒水石二錢煅　生地一錢
青鹽二分
共研細末乾搽牙齦患處待頓飯時以溫水
漱去少時再上

方歌　胡桐淚散牙齦腫津血宜露或出膿細辛寒
水石生地青鹽白芷共川芎

李杲牢牙散

龍膽草酒浸一兩五錢　羌活
地骨皮各一兩　升麻四分
共研末先以溫水漱口用少許搽之

方歌　李杲牢牙搽齒病牙齦搖動或兼疼膽草升
麻羌地骨研末漱口搽有功

固齒白玉膏

官粉研一兩　珍珠末三錢
陽起石一兩用燔鑪四十九條防風當歸川芎牙皂青鹽升麻白芷地骨皮各五錢細辛槀本各三錢共研粗末長流水五盌同藥入砂鍋內以桑柴火熬藥至二盌

去渣再入砂鍋內煎至一盞將龍骨陽起石火煅通紅入藥汁內淬之如此七次去藥汁將龍骨陽起石焙乾研末　龍骨二兩

麝香末二錢

象牙末五錢

用黃蠟三兩溶化濾淨再化離火候溫方入前藥和勻乘熱攤紙上如膏冷將熨斗燒熱仰放紙鋪熨斗底上攤之用時先以溫水漱口將膏剪一小條貼於患處閉口勿語

方歌　固齒白玉貼牙效一切牙疼及動搖官粉珍
珠陽起麝龍骨象牙黃蠟熬

清胃湯見牙衄

犀角升麻湯見面部頰瘍

鑽牙疳

鑽牙疳在牙根生突出硬骨銳而鋒痛如鍼刺殊
難忍證由肝胃積熱成

註　此證由肝胃二經積熱所致乃牙根肉內鑽出骨尖如刺疼痛異常小兒多有之法用鈹鍼就患處刺開好肉連牙齊根取出若血出不止者以濕紙換貼二次即止內服蘆薈消疳飲外以冰硼散搽之戒厚味其牙復生如舊

蘆薈消疳飲

蘆薈生　胡黃連

石膏煅　羚羊角鎊

梔子生研　牛蒡子炒研

銀柴胡　桔梗

大黃生　元參各五分

薄荷葉四分　甘草三分

水二鍾淡竹葉一錢煎六分食遠服

方歌　蘆薈消疳清胃肝羚膏梔子蒡胡連銀胡桔
梗大黃薄甘草元參竹葉煎

冰硼散見口部鵝口瘡

牙疔

牙疔牙縫胃火成大腸濕熱亦可生腫如粟米連
腮痛若兼麻癢即黑疔

註　此證由胃經火毒或大腸經濕熱皆可致之

每生於兩旁牙縫腫起一粒形如粟米痛連腮項若兼麻癢破流血水疼痛異常者即黑疔也屬腎火毒俱用銀簪尖挑破以見血爲度搽拔疔散再以蟾酥丸噙化徐徐嚥之若煩躁口渴者宜服黃連解毒湯即愈若失治毒反攻心令人煩躁昏憒者逆

拔疔散

硇砂　白礬

硃砂　食鹽 用鐵銚刀燒紅將白礬食鹽放於刀上煆之

各等分擇丁日午時研爲細末收之

方歌 拔疔散治諸疔毒硇砂白礬食鹽硃等分研末搽患處化硬搜根功效殊

蟾酥丸 見疔瘡門

黃連解毒湯 見耳部黑疔

牙癰

牙癰胃熱腫牙床寒熱堅硬痛難當破流膿水未收口誤犯寒凉多骨妨

註 此證由陽明胃經熱毒所致生於牙床堅腫疼痛身發寒熱腮頰浮腫初宜服荊防敗毒散若大渴煩嘔者蟾酥丸汗之便秘者雙解貴金丸下之腫處宜軟刺破搽冰硼散若初時堅腫破流血水久不收口過食寒凉者必生多骨俟骨尖刺出搖則內動始可取出其口方能收斂而愈

荊防敗毒散 見項部腦疽

蟾酥丸 見疔瘡門

雙解貴金丸 見腫瘍門

冰硼散 見口部鵝口瘡

走馬牙疳

走馬牙疳證不輕癖積疹痘毒火攻牙根腐臭隨變黑頑肉難脫不食凶

註 此證多由癖疾積火疹痘餘毒上攻最爲迅速總因積火熱毒而成牙根作爛隨變黑腐臭穢難聞若癖積毒火攻牙者初宜服蘆薈消疳飲脾胃虛者兼服人參茯苓粥若疹痘餘毒所中者宜服清疳解毒湯外勢輕者俱

用溺白散擦之若堅硬青紫漸腐穿腮齒搖者宜蘆薈散擦之如牙縫黑腐不盡及腐爛深坑藥不能到宜用勒馬聽徽絲塞之再用手法去其黑腐內見紅肉流鮮血者吉若取時頑肉難脫堅硬腐爛淋漓以致穿腮破脣宜貼青蓮膏身熱不食者逆但此證惟癖積攻牙成疳者好後易犯日積火時時上攻也惟在調理飲食得宜如山藥栗子蕎麪甜辣等物俱當禁忌若稍有疎忽必致復發慎之慎之

人參茯苓粥

人參一錢 白茯苓六錢

共研末同粳米一茶鍾熬成粥先以鹽湯將口漱淨後再食粥

方歌 人參茯苓粥扶脾 飲食短少服之宜 二味研末加粳米熬粥食之理胃虛

清疳解毒湯

人中黃 川黃連生 柴胡各五分 知母生 連翹去心 牛蒡子炒研 犀角鎊 黑參 荊芥 防風各一錢 石膏煅一錢五分

淡竹葉一錢燈心五十寸水二鍾煎八分食遠服

嘔加蘆葦根五錢

方歌 清疳解毒牙疳證 疹疫餘毒化熱成 中黃知連柴翹蒡犀角參膏荊芥風

溺白散

溺白垽即婦人尿桶中白鹻火煅五錢

白霜梅燒存性 枯白礬各二錢

右研細末先用韭根松蘿茶煎成濃汁乘熱以鷄翎蘸洗患處去淨腐肉見津鮮血再敷此藥日敷三次若爛至咽喉以蘆筒吹之

方歌 溺白散搽走馬疳 溺垢白霜梅白礬 韭根茶葉煎湯滌 蘸洗腐肉敷藥痊

蘆薈散

蘆薈一錢　黃蘗末五錢

人言五分用紅棗五枚去核每棗納人言一分火燒存性

共研細末先用米泔水漱淨疳毒後敷此藥於堅硬及腐處

方歌　蘆薈散搽牙疳爛色紫牙搖腮硬穿腮人言燒存性再加黃蘗末同研

勒馬聽徽絲

白砒末一分　麝香末三分

青綿燒研　青黛飛末各一兩

用香油拌勻用時先以清米泔水漱口次用鑷尖將絲挑少許塞於牙根縫內日三易之

方歌　勒馬聽徽疳漸蝕牙縫腐黑急速施油調砒麝青綿黛泔水漱口後塞之

青蓮膏

青黛二錢　乳香

輕粉各一錢　麝香五分

白砒一分即人言

右爲細末用香油調稠薄攤紙上用鎚搥實陰乾收之每於臥時以泔水漱淨口拭乾隨疳證大小剪膏藥貼之至曉揭去再以泔水將口漱淨吐之至晚再貼

方歌　青蓮膏貼腐疳宜化腐消堅效更奇乳麝白砒輕粉黛研末油調紙攤之

蘆薈消疳飲見鑽牙疳

齒䘌

齒䘌齒內生小蟲胃經瘀濕風火凝口臭只緣胃

火盛齒根腐爛出血膿

註　此證係齒內生蟲由胃經瘀濕風火凝聚而成齒根脹痛腐爛時出膿血若口臭甚者胃火盛極上攻所致也宜服玉池散外用雀麥連梃一把苦瓠三十片洗淨將麥剪長二寸以狐葉裹作五包廣一寸厚五分三年陳醋漬之至日中時以兩包火中炮炙令熱納口中熨齒外冷更易之取包置水中解視之即有蟲長三分老者黃色新者白色其效如神

玉池散

當歸　白芷

升麻　防風

甘草　地骨皮

川芎　細辛

藁本　槐花各一錢

生薑三片黑豆三十粒水煎去渣候溫含漱冷則吐之若用此方煎服更效

方歌　玉池疎風療蟲牙津膿根爛漱服佳歸芷升防甘地骨芎辛薑藁豆槐花

齒䘌

齒䘌風熱客陽明牙齦腫痛出臭膿遇風痛甚久宣露白馬懸蹄塞入齦

註　此證由風熱客於手足陽明二經而成初起牙齦宣腫堅痛遇風痛甚常作歪口吸氣之狀牙齦腐孔時出臭膿久則齦齒宣露初宜服清胃湯加羌活外用白馬懸蹄少許以綿裹之塞入膿孔甚效

清胃湯見牙衄

御纂醫宗金鑑卷六十六
編輯外科心法要訣目錄

舌部

紫舌脹

痰包

舌衄

重舌

痰核

重腭

舌疔

舌疳附瘰𤶡風

喉部

緊喉風附纏喉風

慢喉風

喉閉附酒毒喉閉

啞瘴喉風

弄舌喉風

喉疳

喉癬

上腭癰

鎖喉毒

乳蛾

喉瘤

胸乳部

甘疽

膻中疽

脾發疽

井疽

蜂窩疽

蠹疽

𤻶𤺊疽

內外吹乳

乳疽

乳癰

乳發

乳漏

乳中結核

乳勞

乳岩

御纂醫宗金鑑卷六十六

編輯外科心法要訣

舌部

紫舌脹

紫舌脹屬心經火熱盛血壅腫硬疼舌腫滿口宜鍼刺血色紫重色紅輕

註　此證由心經火盛血壅以致舌脹滿口堅硬疼痛宜用衣鍼紮筋頭上露鋒分許當舌刺數十刺令血出紅色者輕紫色者重隨以溫水漱口搽冰硼散內用涼膈散去朴消大黃加牛蒡子荊芥倍用梔子服之甚效

冰硼散（見口部鵝口瘡）

涼膈散（見唇部唇發疽）

痰包

痰包每在舌下生結腫綿軟似匏形痛脹舌下妨食語火稽痰涎流注成

註　此證生於舌下結腫如匏光軟如綿塞脹舌下有妨飲食言語色黃木痛由火稽痰涎流

注而成宜用立剪當包上剪破出痰涎如雞子清稠黏不斷拭淨搽冰硼散服加味二陳湯忌煎炒火酒等物

加味二陳湯

陳皮　半夏製

白茯苓　黄芩各八分

黄連　薄荷

甘草生各五分

水二鍾薑三片煎八分食前服

方歌　加味二陳療痰包結腫舌下形如匏二陳湯加芩連薄薑煎服下自然消

冰硼散見口部

舌衄

舌衄心火血分炎舌上生孔似鍼尖或如筋頭其色紫甚黑腐爛血出泉

註此證係舌上忽生孔小者如鍼尖大者如筋頭其孔色紫屬熱甚色黑防腐爛血出如泉湧由心火上炎以致血熱妄行而成宜服升麻湯兼搽必勝散甚效

升麻湯

升麻　小薊根

茜根各一兩五錢　艾葉七錢五分

寒水石三兩

共研每三錢水一鍾煎七分澄去渣入生地黄汁一羹匙再煎二滚溫服或加炒側栢葉五錢亦可

方歌　升麻舌衄心火炎小薊茜根各兩半艾葉七

錢五分加寒水三兩同研爛

必勝散

螺青另研　蒲黄各一錢

共合一處研細搽於患處後用溫鹽湯漱口

方歌　必勝心熱血妄行舌生小孔湧血紅螺青研末蒲黄炒同勻搽之自歸經

重舌　痰核　重腭　舌疔

舌證發於心脾經其證皆由積熱成重舌舌下血脈脹痰核舌上一核生重腭生於口上腭特覺心

煩梅子形舌疔舌上生紫皰其形如豆寒熱增

註此證無論大人小兒俱可以生重舌者由心脾經熱循經上冲舌本遂令舌下血脈脹起如小舌狀故名重舌宜用冰硼散搽之痰核者心脾痰涎鬱熱舌上生核強硬作痛宜用衣鍼點破搽冰硼散內服加味二陳湯重腭者心脾有熱以致上腭生瘡形如梅子外無寒熱內時作煩此屬熱極禁用鍼刺宜服黃連解毒湯加桔梗不時用紫雪散噙化舌疔

者心脾火毒舌生紫皰其形如豆堅硬寒熱疼痛應心初起宜用蟾酥丸含於舌下隨化隨嚥或再服三粒以解內毒甚者刺之服黃連解毒湯兼搽紫雪散及徐徐嚥之即愈

紫雪散

犀角鎊　羚羊角鎊

石膏　寒水石

升麻各一兩　元參二兩

甘草生八錢　沉香剉

木香剉各五錢

水五碗煎藥剩湯一盌將渣用絹濾去將湯再熬滾投朴消三兩六錢文火慢煎水氣將盡欲凝結之時傾入盌內下硃砂冰片各三錢金箔一百張各預研細和勻將藥盌安入凉水盆中候冷凝如雪爲度大人每用一錢小兒二分十歲者五分徐徐嚥之即效或用淡竹葉燈心煎湯化服亦可咽喉腫痛等證吹之亦效

方歌

紫雪散醫積熱效沉木犀羚元參草寒水升膏朴消加硃箔冰研入內攪

冰硼散見口部鵝口瘡

加味二陳湯見痰包

黃連解毒湯見耳部黑疔

蟾酥丸見疔瘡門

舌菌附瘰癧風

舌疳心脾毒火成如豆如菌痛爛紅漸若泛蓮難飲食綿潰久變瘰癧風

注此證由心脾毒火所致其證最惡初如豆次如菌頭大蒂小又名舌菌疼痛紅爛無皮朝輕暮重急用北庭丹點之自然消縮而愈若失於調治以致焮腫突如泛蓮或有狀如鷄冠舌本短縮不能伸舒妨礙飲食言語時津臭涎再因怒氣上冲忽然崩裂血出不止久久延及項頷腫如結核堅硬臖痛皮色如常頂軟一點色暗木紅破後時津臭水腐如爛棉其證雖破堅硬腫痛仍前不退此為綿潰

甚至透舌穿腮湯水漏出是以又名瘰癧風也蓋舌本屬心舌邊屬脾因心緒煩擾則生火思慮傷脾則氣鬱鬱甚而成斯疾其證外勢頗類喉風但喉風咽喉常腫湯水不能下嚥此證咽喉不腫可以下嚥湯水胃中亦思飲食因舌不能轉動迭送硬食故每食不能充足致令胃中空虛而怯證悉添日漸衰敗初起宜服導赤湯加黃連虛者服歸脾湯熱甚者服清涼甘露飲合歸脾湯便溏者服歸芍異功湯頷下腫核初起宜用錦地羅蘸醋磨濃敷之潰後宜水澄膏貼之自古治法雖多然此證百無一生縱施藥餌不過苟延歲月而已

清溪秘傳北庭丹

番硇砂　人中白各五分

瓦上青苔　瓦松

溏鷄矢各一錢

用傾銀罐子二箇將藥裝在罐內將口對嚴

外用鹽泥封固以炭火煅紅待三炷香為度候冷開罐將藥取出入麝香冰片各一分共研細末用磁鋒刺破舌菌用丹少許點上再以蒲黃蓋之

方歌　北庭丹點舌菌生瓦松溏鷄矢人中瓦上青苔番硇末罐封火煅入麝冰

歸芍異功湯

人參　白朮土炒

廣陳皮　白芍酒炒

當歸身各一錢　白茯苓二錢
甘草炙五分
燈心五十寸水煎空心服
方歌 歸芍異功扶脾氣健胃又能止瀉利四君歸
芍廣陳皮引加燈心是良劑

水澄膏
硃砂水飛二錢　白及
白歛　五倍子
鬱金各一兩　雄黃

乳香各五錢
右為細末米醋調濃以厚紙攤貼之
方歌 水澄膏貼潰核驗水飛硃砂末二錢及歛鬱
金雄黃乳五倍同研用醋攤

導赤湯見口部口糜
歸脾湯見乳部乳中結核
清涼甘露飲見脣部繭脣

喉部

緊喉風附纏喉風

緊喉膏粱風火成咽喉腫痛難出聲聲如拽鋸痰
壅塞穴刺少商吐下功

註 此證由膏粱厚味太過致脾胃積熱復受邪風風熱相搏上壅咽喉腫痛聲音難出湯水不下痰涎壅塞之聲頗似拽鋸初發暴速急刺手大指內側少商穴出紫黑血以瀉其熱痰盛者以桐油餞導吐之吐痰後隨用甘草

湯漱之以解桐油之氣內服雄黃解毒丸吐下之喉中吹白降雪散俟關開之後內宜服清咽利膈湯按法調治隨手應效者順若面青脣黑鼻流冷涕者逆若兼項外漫腫即名纏喉風其治法雖與此證相同然終屬險惡難治

桐油餞
溫水半盌加桐油四匙攪勻用硬鷄翎蘸油探入喉內撚之連探四五次其痰壅出再探再吐

以人醒聲高為度

方歌 桐油餞法導痰涎一切喉風用最靈半盞溫水桐油入鷄翎蘸探吐喉通

雄黃解毒丸

雄黃一兩　鬱金一錢

巴豆十四粒去皮油

共研末醋糊為丸如黍粒大每服五分津液送下

方歌 雄黃解毒緊喉風閉關通閉火能平巴豆去油鬱金末醋糊為丸黍粒形

白降雪散

石膏煅一錢五分　硼砂一錢

焰消　膽礬各五分

元明粉一分　冰片一分

共研極細末以筆管吹入喉內

方歌 白降雪散喉風證喉痺聲難風火凝煅石膏與膽礬末焰消硼片共元明

清咽利膈湯

牛蒡子炒研　連翹去心

荊芥　防風

梔子生研　桔梗

元參　黃連

金銀花　黃芩

薄荷　甘草生各一錢

大黃　朴消各一錢

水二鍾淡竹葉二錢煎八分食遠服

方歌 清咽利膈喉痛消疎風清熱蒡連翹荊防梔桔參連草銀花芩薄大黃消

慢喉風

慢喉發緩體虛生微腫咽乾色淡紅或由暴怒五辛火或因憂思過度成

註 此證有因平素體虛更兼暴怒或過食五辛而生者亦有憂思太過而成者俱屬體虛病實其發緩其色淡其腫微其咽乾舌見滑白胎大便自利六脉微細身如熱色若午前痛者服補中益氣湯加以清涼如麥冬黑參桔

梗牛蒡子服之若午後作痛作渴身熱足冷
者陰陽兩虛也忌用苦寒宜少陰甘桔湯以
宣達之若面赤咽乾不渴者其脈必虛大以
甘露飲服之必效俱兼用冰硼散一錢加燈
草煅灰存性三分吹之立驗

甘露飲

天冬去心　麥冬去心

黃芩　生地

熟地　枇杷葉蜜炙

石斛　枳殼麸炒

茵蔯蒿　甘草各等分

水二鍾煎八分食後服

方歌　甘露飲清內熱侵面赤咽乾生液津天麥冬
芩生熟地枇杷斛草枳茵蔯

補中益氣湯見背部[illegible]門

少陰甘桔湯見口部口[illegible]

冰硼散見口部鵝口瘡

喉閉附酒毒喉閉

喉閉肝肺火盛由風寒相搏腫咽喉甚則項外追
項外又有酒毒當細求

註　此證由肝肺火盛復受風寒相搏而成咽喉
腫痛面赤腮腫甚則項外漫腫喉中有塊如
拳湯水難嚥語言不出暴起身發寒熱急刺
少商穴或鍼合谷穴以開咽喉初宜疏散服
荆防敗毒散寒熱已退即用清咽利膈湯兼
吹紫雪散隨以薑汁漱口以宣其熱或用醋
漱以消積血痰壅塞者桐油餞探吐痰涎若
腫發於項外臃脹痛者防透咽喉不可輕鍼
急用皂角末吹鼻取嚏其腫即破或用皂
角末醋調厚敷項腫須臾即破初腫時用生
羊肉片貼之喉閉聲鼾者肺氣將絶急宜獨
參湯救之若卒然如啞吞吐不利係寒氣客
於會厭也宜蜜炙附子片含之切忌
用苦寒之藥恐難救療又有酒毒喉閉由
酒毒蒸於心脾二經熱壅咽喉腫色黃其
人面赤目睛上視以桐油餞導吐痰涎宜服

鼠黏子解毒湯亦用紫雪散吹之

鼠黏子解毒湯

鼠黏子炒研　桔梗
青皮　升麻
黃芩　花粉
甘草生　元參
梔子生研　黃連
連翹去心　葛根
白术土炒　防風

生地各等分

水煎食後服

方歌　鼠黏解毒消咽閉桔梗青皮能降氣升芩花粉草元參梔連翹葛术防地

荊防敗毒散見項部腦疽
清咽利膈湯
桐油餞俱見緊喉風
紫雪散見舌部重舌
獨參湯見潰瘍門

啞瘴喉風

啞瘴喉風腫痛咽牙關緊急不能言風痰湧塞咽膈上火盛生痰風搏源

註　此證頗類緊喉由肺胃蘊熱積久生痰外復受風邪與痰熱相搏湧塞咽膈之上而成斯疾初起咽喉腫塞疼痛湯水難嚥語言不出牙關緊急此屬險候急用雄黃解毒丸水化用細竹管將藥水吹入鼻孔直達咽喉藥入作嘔即令患者吐之其牙關頓鬆咽喉即稍

開通先與米飲飲之次服清咽利膈湯兼吹冰硼散用藥不應者險若脣黑鼻流冷涕者逆

雄黃解毒丸
清咽利膈湯俱見緊喉風
冰硼散見口部鵝口瘡

弄舌喉風

弄舌喉風心脾經實火外寒凝滯成舌出攪動因脹悶咽喉作腫更兼疼

註此證由心脾實火與外寒鬱遏凝滯而成咽喉腫痛痰涎堵塞音啞言澀舌出不縮時時攪動覺舌脹悶常欲以手捫之故名弄舌急刺少商穴穴在兩手大指裏側去指甲角旁韭葉寬即是用三稜鍼刺之有血者生無血者死嚥蟾酥丸徐嚥藥汁若痰涎上湧不能嚥藥者急用桐油餞探吐痰涎隨服清咽利膈湯吹金鎖匙若喉內如松子及魚鱗狀不堵塞者此屬虛陽上浮急用蜜炙附子片噙

嚥其汁即效

金鎖匙

冰片二分五厘　白殭蠶一錢

雄黃二錢　焰消一兩五錢

硼砂五錢

各研末共和勻以細筆管吹入喉內腫痛處

方歌　金鎖匙吹弄舌風心脾火鬱外寒乘消痰逐熱除疼痛冰片殭蠶雄焰硼

蟾酥丸 見疔瘡門

桐油餞

清咽利膈湯 俱見緊喉風

喉疳

喉疳初覺陰虛成嗌乾刺痛色淡紅腎火炎上金受剋破爛失音臭腐疼

註此證一名陰虛喉疳初覺咽嗌乾燥如毛草常刺喉中又如硬物嗌於咽下嘔吐酸水噦出甜涎淡紅微腫微痛日久其色紫暗不鮮頗似凍榴子色由腎液久虧相火炎上消爍肺金熏燎咽喉腫痛日增破爛腐衣疊若蝦

皮聲音雌瘂喘急多痰臭腐蝕延其疼倍增妨礙飲食胃氣由此漸衰而虛火益盛煩躁者宜服知柏地黃湯若吐酸噦涎者宜服甘露飲加川黃連便燥者兼服萬氏潤燥膏面唇俱白不寐懶食者宜歸脾湯加酒炒川黃連腫吹紫雪散腐吹八寶珍珠散其證投方應病或者十全一二否則難救

萬氏潤燥膏

豬脂一觔切碎煉油去渣加煉過白蜂蜜一觔攪勻候凝挑服二匙日用三五次

方歌 萬氏潤燥膏神驗降火清金滋便乾豬脂煉油加白蜜挑服失音也能痊

八寶珍珠散

兒茶　川連末

川貝母去心研　青黛各一錢五分

紅褐燒灰存性　官粉

黃蘗末　魚腦石微煅

琥珀末各一錢　人中白二錢煅

硼砂八分　冰片六分

京牛黃　珍珠各五分豆腐內煮半炷香時取出研末

麝香三分

各研極細末共兌一處再研勻以細筆管吹入喉內爛肉處

方歌 八寶珍珠喉疳腐冰麝兒茶連貝母紅褐官粉黛牛黃腦石中白蘗硼琥

知蘗地黃湯即六味地黃丸加知母黃蘗見面部雀斑

甘露飲見慢喉風

歸脾湯見乳部乳中結核

喉癬

喉癬咽乾生苔蘚初癢時增燥裂疼過飲藥酒五辛火黴爛延開蟻蛀形

註 此證一名天白蟻咽嗌乾燥初覺時癢次生苔蘚色暗木紅燥裂疼痛時吐臭涎妨礙飲食由過食炙煿藥酒五辛等物以致熱積於胃胃火薰肺而成斯疾宜服廣筆鼠黏湯未

潰吹礬精散已潰吹清涼散患者清心寡慾戒厚味發物或者十全一二若失治兼調理不謹致生黴爛延漫開大叠起腐衣旁生小孔若蟻蛀蝕之狀多致不救

廣筆鼠黏湯

生地黃　浙貝母各一錢去心研

元參　甘草生各一錢五分

鼠黏子酒炒研　花粉

射干　連翹去心各一錢

白殭蠶 炒研 一錢

苦竹葉二十片水二鍾煎八分飢時服

方歌 黄雀鼠黏喉癬乾初發生苦裂痛添生地元參花粉貝連翹射草白殭蠶

清溪秘傳礬精散

白礬 不拘多少研末用方磚一塊以火燒紅潑水於磚上將礬末佈於磚上以磁盤覆蓋四面灰擁一日夜礬飛盤上掃下用二錢

白霜梅 二個去核　眞明雄黄

穿山甲 炙 各一錢

共研細末以細筆管吹入喉內

方歌 礬精散用火燒磚水潑布礬上覆盤掃霜再兌雄梅甲研末吹喉癬自痊

清涼散

硼砂 三錢　人中白 煅 二錢

黄連末 一錢　南薄荷 六分

氷片 五分　青黛 四分

共研極細末吹入喉癬腐處

方歌 清涼散吹天白蟻胃火薰金成此疾薄黛氷

硼中白連腐裂疼痛皆可去

上腭癰

上腭癰若葡萄形少陰三焦積熱成舌難伸縮鼻紅涕口難開合寒熱增

註 此證又名懸癰生於口中上腭由心腎經與三焦經積熱而成形若紫葡萄舌難伸縮口難開合鼻中時出紅涕令人寒熱大作宜黄連消毒飲加桔梗元參服之兼吹氷硼散或日久腫硬下垂不潰者以燒鹽散日點三五次兼服射干丸過時失治飲食不入煩躁神昏者逆

燒鹽散

食鹽 火燒　枯白礬 各等分

二味研細以筯頭蘸點患上

方歌 燒鹽散治上腭癰懸似葡萄色紫形枯礬燒鹽等分末筯頭蘸點消熱壅

射干丸

射干　川升麻

杏仁去皮尖麸炒 甘草炙各五錢

木鼈子 川大黄炒各二錢

右研細末煉蜜和丸如小彈子大每用一丸

口中含化徐嚥

方歌 射干丸療懸癰患熱聚成形口開難大黄升

草木鼈杏蜜丸彈狀口中含

黄連消毒飲見頭部百會疽

冰硼散見口部鵞口瘡

鎖喉毒

鎖喉毒生因積熱外感風寒耳前結外似瘰癧漸

攻喉心與小腸聽會穴

註 此證由心與小腸積熱外感風寒凝結而成初生於耳前聽會穴形如瘰癧漸攻咽喉腫塞疼痛妨礙飲食證須速治宜服牛黄清心丸開關解熱兼服清咽利膈湯吹冰硼散投方應效方能成功

牛黄清心丸

九轉膽星一兩 雄黄

黄連末各二錢 茯神

元參 天竺黄

五倍子末 荆芥

防風 桔梗

犀角末 當歸各一錢

冰片 麝香

珍珠豆腐煮各五分 京牛黄

輕粉各三分

各研極細共和一處再研勻甘草熬膏和丸

如龍眼大硃砂為衣日中曬乾收入磁罐內將蠟封口扎嚴勿令出氣臨服時一丸薄荷湯化服

方歌 牛黄清心鎖喉毒茯輕冰麝參雄竺珍倍荆

防桔膽星犀角歸連熱退速

清咽利膈湯見緊喉風

冰硼散見口部鵞口瘡

乳蛾

乳蛾肺經風火成雙輕單重喉旁生狀若蠶蛾紅

腫痛關前易治關後凶

註 此證由肺經積熱受風凝結而成生咽喉之旁狀如蠶蛾亦有形若棗栗者紅腫疼痛有單有雙雙者輕單者重生於關前者形色易見吹藥易到手法易施故易治生於關後者難見形色藥吹不到手法難施故難治俱宜服清咽利膈湯吹冰硼散易見者膿熟鍼之難見者用雞翎探吐膿血若兼痰壅氣急聲小探吐不出者險急用三稜鍼刺少商穴出

紫黑血仍吹服前藥緩緩取效

清咽利膈湯 見緊喉風

冰硼散 見口部鵝口瘡

喉瘤

喉瘤鬱熱屬肺經多語損氣相兼成形如元眼紅絲裹或單或雙喉旁生

註 此證由肺經鬱熱更兼多語損氣而成形如元眼紅絲相裹或單或雙生於喉旁亦有頂大帶小者不犯不痛或醉酒炙煿或因怒氣喊叫犯之則痛忌用鍼刀宜服益氣清金湯以消瘤碧玉散點之即效

益氣清金湯

苦桔梗三錢 黃芩二錢
浙貝母去心研 麥冬去心
牛蒡子炒研各一錢五分
人參 白茯苓
陳皮 生梔子研
薄荷 甘草生各一錢

紫蘇五分

竹葉三十片水三鍾煎一鍾食遠服渣再煎服

方歌 益氣清金肺熱攻注喉成瘤元眼形陳蒡芩蘇苦桔貝麥冬梔薄草參苓

消瘤碧玉散

硼砂三錢 冰片
膽礬各三分

共研細末用時以筯頭蘸藥點患處

方歌

消瘤碧玉點喉瘤，開結通喉熱可搜，若以硼砂冰片兌，膽礬末入患皆瘳。

胸乳部

甘疽

甘疽憂思氣結成，膺生穀粒紫蔞形，寒熱硬痛宜速潰，潰遲須防毒陷攻。

註 此證由憂思氣結而成，生於膺上，即胸膛兩旁肉高處，屬肺經中府穴之下，無論左右皆能為患。初如穀粒色青，漸若栝蔞色紫，堅硬疼痛，憎寒壯熱，速潰稠膿者順。若過十日寒熱不退，仍膿不化，脈見浮數，防毒內陷攻裏

致生惡證屬逆初宜服荆防敗毒散以疎解寒熱次服內托黃耆散應期不潰者急服十全大補湯托之其餘內外治法按癰疽腫瘍潰瘍門

荆防敗毒散見項部腦疽

內托黃耆散見背部中搭手

十全大補湯見潰瘍門

膻中疽圖

膻中疽

膻中疽起粟粒形色紫堅硬漸焮疼七情火毒發任脈急隨證治緩成凶

注 此證生於心窩之上兩乳中央屬任脈經膻中穴由臟腑不和七情不平火毒凝結而成初起如粟色紫堅硬漸生焮熱腫痛憎寒壯熱宜急服仙方活命飲加蘇葉薄荷葉汗之或煩燥作嘔脣焦大渴宜奪命丹清之倏表證已退急服托裏透膿湯若瘡勢不起屬虛

宜十全大補湯托之但膻中爲氣海氣之所居焉施治貴早若遲則毒陷攻裏傷膜透氣者逆其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

仙方活命飲見腫瘍門

奪命丹見背部陰陽二氣疽

托裏透膿湯見頭部侵腦疽

十全大補湯見潰瘍門

脾發疽圖

脾發疽

脾發疽生心下旁，多烤毒酒火爲殃，初如粟粒時寒熱，漸增腫痛潰膿昌。

註 此證生於心窩下兩旁，屬脾經食竇穴，無論左右，俱生之皆由過食炙煿厚味藥酒，以致脾經積火成毒而發。初起形如粟粒，寒熱往來，漸增腫痛，若頂尖根束，紅活鮮潤，應期即潰稠膿者順；若頂平根散，色紫堅硬，屆期不潰，既潰膿如蟹沫者逆。初服荊防敗毒散汗

之；脣焦大渴煩躁者，宜服太乙紫金錠，次服內疏黃連湯清之。其餘內外治法，俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

太乙紫金錠 一名紫金丹 一名玉樞丹

雄黃 三錢，鮮紅大塊者，研末

硃砂 三錢，有神氣者，研末

麝香 三錢，揀淨毛皮，研末

川五倍子 一兩，一名文蛤，搥碎，洗淨，焙乾，研末

紅芽大戟 一兩，杭州紫大戟爲上，江南土大戟次之，北方綿大戟色白者性烈峻利，弱人服之反致吐血，慎之勿用，取上品者去蘆根，洗淨焙乾爲末，一兩五錢

山慈菇 二兩，洗去毛皮，焙乾研末

千金子 一兩，一名續隨子，仁白者，去油

以上之藥各擇精品，於淨室中製畢，候端午七夕重陽或天月德天醫黃道上吉之辰，凡入室合藥之人三日前俱宜齋沐，更換新潔衣帽，臨日方入室中，淨手焚香，預設藥王牌位，主人率衆焚香拜禱，事畢，各將前藥七味稱準，入於大乳鉢內，再研數百轉，方入細石臼中，漸加糯米濃汁，調和軟硬得中，方用杵搗千餘下，極至光潤爲度，每錠一錢，每服一

錠病勢重者連服二錠以取通利後用温粥
補之修合時除合藥潔淨之人餘皆忌見此
藥惟在精誠潔淨方效

方歌 太乙紫金諸瘡毒疔腫癰疽皆可除雄硃倍
麝千金子紅芽大戟山慈姑

一一切飲食藥毒蠱毒瘴氣惡菌河豚中毒自
死牛馬豬羊六畜等類之肉人悞食之必昏
亂卒倒或生異形之證並用水磨灌服或吐
或瀉其人必甦

一南方山嵐瘴氣烟霧癘疫最能傷人感之纔
覺意思不快惡寒惡熱欲嘔不嘔卽磨一錠
服之得吐利便愈

一癰疽發背對口疔瘡天蛇無名腫毒蛀節紅
絲等疔及楊梅瘡諸風癮疹新久痔瘡並用
無灰淡酒磨服外用水磨塗搽瘡上日夜數
次覺癢而消

一陰陽二毒傷寒心悶狂言亂語胸膈塞滯邪
毒未出瘟疫煩亂發狂喉閉喉風俱用薄荷
湯待冷磨服

一赤白痢疾肚腹泄瀉急痛霍亂絞腸痧及諸
痰喘並用薑湯磨服

一男子婦人急中顛邪喝叫奔走鬼交鬼胎鬼
氣鬼魘失心狂亂羊兒豬顛等風俱用石菖
蒲煎湯磨服

一中風中氣口眼歪邪牙關緊急言語蹇澀筋
脈攣縮骨節風腫遍身疼痛行步艱辛諸風
諸癇並用酒磨炖熱服之

一自縊溺死驚死壓死鬼魅迷死但心頭微温

未冷者俱用生薑續斷酒煎磨服

一切惡蛇風犬毒蠍溪澗諸惡等蟲傷人隨卽
發腫攻注徧身甚者毒氣入裏昏悶响叫命
在須臾俱用酒磨灌下再吃葱湯一盌被蓋
出汗立甦

一新久瘧疾臨發時東流水煎桃柳枝湯磨服

一小兒急慢驚風五疳五痢脾病黃腫癮疹瘡
瘤牙關緊急並用薄荷浸水磨濃加蜜服之

仍搽腫上年歲幼者每錠分作數服

一牙痛酒磨塗痛上仍含少許良久嚥下

一小兒父母遺毒生下百日內皮塌爛斑穀道眼眶損爛者俱用清水磨塗

一打撲傷損用松節無灰酒研服

一年深月近頭脹頭痛太陽痛極偏頭風及時瘡愈後毒氣攻注腦門作脹者俱用葱酒研服一錠仍磨塗太陽穴上

一婦人經水不通紅花湯下

一凡遇天行疫氣延街闔巷相傳徧染者用桃根湯磨濃滴入鼻孔次服少許任人病家再不傳染

一又治傳尸勞瘵諸藥不能取效一方士指教服此每早磨服一錠至三次後逐下惡物尸蟲異形怪類後得覽[illegible]活人不計其數

一一女子久患勞瘵為尸蟲所噬磨服一錠片時吐下小蟲十餘條後服蘇合香丸其病頓

失調理月餘而愈真濟世衛生之寶藥也

荊防敗毒散見項部腦疽

內疏黃連湯見腫瘍門

井疽圖

井疽

井疽心火發中庭初如豆粒漸腫疼心躁肌熱脣焦渴紅活易治黑陷凶

注 此證生於心窩屬任脈中庭穴由心經火毒而成初如豆粒腫痛漸增心躁如焚肌熱如火自汗脣焦大渴飲冷急服內疏黃連湯或麥靈丹若煩悶作嘔發熱無汗者奪命丹汗之如紅活高腫者順黑陷平塌者逆其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門若潰後經年不愈者必成穿心冷瘻難治

內疏黃連湯

麥靈丹 俱見腫瘍門

奪命丹 見背部陰陽二氣疽

蜂窩疽圖

蜂窩疽

蜂窩疽形似蜂窩胸側乳上瘡孔多漫腫紫痛心火毒黑陷者逆順紅活

注 此證生於胸側乳上亦有徧身而發者由心火毒盛而成色紫漫腫疼痛身發寒熱初起六七孔漸漸延開有三五寸亦有六七寸者形似蜂房即有數十竅每竅出黃白膿宜腫瘡而全腐腐脫有新肉色紅鮮潤者順若出黑水氣穢平塌者逆始終內外治法俱按癰

疽腫瘍潰瘍門遇氣寒之人至八九日不潰
以神燈照每日照之應期即潰
神燈照法 見首卷

蠹疽圖

蠹疽

蠹疽生於缺盆中初豆漸李堅紫疼寒熱尿澁宜
蒜灸證由膽胃積熱生

註 此證一名缺盆疽又名鎖骨疽生在胸上項下鎖子骨內軟陷中缺盆穴屬膽胃二經積熱而成初發寒熱往來筋骨拘急飲食不思胸腹膨脹小水短澁初發如豆漸大如李色紫堅硬疼痛初宜艾壯隔獨頭蒜片灸之內服奪命丹汗之次服六一散通利小水膿勢

將成宜服內托黃耆散氣血虛甚者宜服十全大補湯托補之其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門此證宜急托治若失治腐爛內陷瘡口難斂必成敗證

六一散

滑石六兩　甘草一兩生

共為末每服三錢燈心煎湯調服

方歌 六一散醫小水癃能除煩渴熱有功滑石甘
草研成末燈心湯調服立通

奪命丹 見背部陰陽二氣疽

內托黃耆散 見背部中搭手

十全大補湯 見潰瘍門

㾬癧癰圖

㾬癧癰

㾬癧癰在乳旁生結核紅腫硬焮疼包絡痰凝脾氣鬱治宜溫舒化堅凝

註 此證生於乳旁初腫堅硬形類結核發長緩慢漸增焮腫色紅疼痛由包絡寒痰脾氣鬱結而成係寒證非熱證也治宜溫和舒鬱化堅以內補十宣散服之外敷回陽玉龍膏消之如不消膿勢將成也內外治法即按癰疽腫瘍潰瘍門

內補十宣散

人參 黃耆
當歸各二兩 桔梗
厚朴薑製 川芎
白芷 肉桂
防風 甘草炙各一兩

共研末每服三錢熱黃酒調服

不飲酒者木香煎湯調下

方歌 內補十宣諸腫毒已成令潰未成消參耆桂

朴芎歸草芷桂防風熱酒調

回陽玉龍膏 見腫瘍門

內外吹乳

吹乳乳毒乳腫疼內吹胎熱痛焮紅外吹子鼻涼氣襲寒熱煩渴結腫疼

註 乳房屬胃乳頭屬肝而有內吹外吹之分內吹者懷胎六七月胸滿氣上乳房結腫疼痛若色紅者因多熱也不紅者既因氣鬱且兼胎旺也多熱者宜服柴胡清肝湯氣鬱者宜

服逍遙散外俱敷沖和膏必消或初腫失於調治或本人復傷氣怒以致大腫大痛其勢必欲成膿宜用逍遙散加川芎白芷連翹以養血排膿治之潰後宜服八珍湯以養血氣待生產後按潰瘍治法方得收口妊娠用藥禁忌另有歌訣詳載首卷外吹者由乳母肝胃氣濁更兼子吮乳睡熱鼻孔涼氣襲入乳房與熱乳凝結腫痛令人寒熱往來煩躁口渴初宜服荊防牛蒡湯外用隔蒜灸法俟寒熱退仍腫者服橘葉栝蔞散外敷沖和膏消之其腫消之不應者將欲作膿即用透膿散其餘內服外敷之法俱按癰疽腫瘍潰瘍門又有至如內未懷胎外未行乳而生毒者係皮肉爲患未傷乳房此肝胃濕熱凝結而成乳毒也法當按癰瘡治之無有不效者

荊防牛蒡湯

荊芥 防風

牛蒡子炒研 金銀花

陳皮 花粉

黃芩 蒲公英

連翹去心 皂刺各一錢

柴胡 香附子

甘草生各五分

水二鍾煎八分食遠服

方歌 荊防牛蒡乳外吹寒熱腫疼俱可推銀花陳草柴香附花粉芩蒲翹刺隨

橘葉栝蔞散

橘葉二十個 栝蔞量證用半個或一個
川芎 黃芩
梔子生研 連翹去心
石膏煅 柴胡
陳皮 青皮各一錢
甘草生五分

水二鍾煎八分食遠服渣再煎服

紫腫焮痛用石膏紅腫者去之

方歌 橘葉栝蔞吹乳證凉襲熱乳凝結成芎芩梔連翹等石膏柴與陳皮青

柴胡清肝湯見頭部鬢疽

逍遙散見背部上搭手

沖和膏

透膿散俱見腫瘍門

隔蒜灸法見首卷灸法內

乳疽圖



乳癰圖

乳疽 乳癰

乳疽乳癰乳房生肝氣鬱結胃火成癰形紅腫焮熱痛疽形木硬覺微疼癰發膿成十四日疽發月餘膿始成未潰托裏排膿治已潰大補養榮靈

註 此證總由肝氣鬱結胃熱壅滯而成男子生者稀少女子生者頗多俱生於乳房紅腫熱痛者爲癰十四日膿成若堅硬木痛者爲疽月餘成膿初起寒熱往來宜服栝蔞牛蒡湯寒熱悉退腫硬不消宜用復元通氣散消之

若不應復時時跳動者勢將潰膿宜用托裏透膿湯膿脹痛者鍼之宜服托裏排膿湯虛者補之如人參養榮十全大補等湯俱可選用外敷貼之藥俱按癰疽腫瘍潰瘍門

栝蔞牛蒡湯

栝蔞仁 牛蒡子炒研
花粉 黃芩
生梔子研 連翹去心
皂刺 金銀花
甘草生 陳皮各一錢
青皮 柴胡各五分

水二鍾煎八分入煮酒一杯和勻食遠服

方歌 栝蔞牛蒡胃火鬱憎寒壯熱乳癰疽青柴花粉芩翹刺銀花梔子草陳皮

復元通氣散見腫瘍門

托裏透膿湯見頭部侵腦疽

托裏排膿湯見項部魚尾毒

人參養榮湯

十全大補湯俱見潰瘍門

乳發 乳漏

乳發如癰胃火成男女皆生赤腫疼潰久不斂方成漏只爲膿清肌不生

註 此證發於乳房焮赤腫痛其勢更大如癰皮肉盡腐由胃腑濕火相凝而成治法急按乳癰未成形者消之已成形者托之腐脫遲者黃靈藥撒之以免徧潰乳房致傷囊槅難以收斂若久不收口外寒侵襲失於調養特流

清水者即成乳漏外用紅升丹作撚以去腐生肌再兼用豆豉餅灸法緩緩灸之以祛寒内當大補氣血節勞煩慎起居忌發物漸可生肌斂口而愈

黄靈藥

紅升丹 俱見潰瘍門

豆豉餅 見首卷灸法内

乳中結核

乳中結核梅李形按之不移色不紅時時隱痛勞岩漸證由肝脾鬱結成

註 此證乳房結核堅硬小者如梅大者如李按之不移推之不動時時隱痛皮色如常由肝脾二經氣鬱結滯而成形勢雖小不可輕忽若耽延日久不消輕成乳勞重成乳岩慎之慎之初起氣實者宜服清肝解鬱湯氣虛宜服香貝養榮湯若鬱結傷脾食少不寐者服歸脾湯外俱用木香餅熨法消之甚效

清肝解鬱湯

當歸 生地

白芍酒炒 川芎

陳皮 半夏製各八分

貝母去心研 茯神

青皮 遠志去心

桔梗 蘇葉各六分

梔子生研 木通

甘草生各四分 香附醋炒一錢

水二鍾薑一片煎八分食遠服

方歌 清肝解鬱貝茯神四物青皮遠夏陳梔桔通蘇香附草能消乳核氣鬱伸

歸脾湯

人參 白朮土炒

棗仁炒研 龍眼肉

茯神各二錢 黃耆一錢五分

當歸酒洗一錢 遠志去心

木香末 甘草炙各五分

生薑三片紅棗肉二枚水煎服

方歌　歸脾湯治脾胃怯食少怔忡夜不安棗遠龍眼參歸草茯神耆朮木香煎

木香餅

生地黃 一兩 搗爛　木香 五錢 研末

共和勻量結核大小作餅貼腫上以熱熨斗間日熨之堅硬木痛者每日熨之

方歌　木香餅消乳核方舒通結滯功倍強生地研爛木香末和餅貼患熨之良

香貝養榮湯 見項部上石疽

乳勞

乳勞初核漸腫堅根形散漫大如盤未潰先腐黴斑點敗膿津久勞證添

註　此證即由乳中結核而成或消之不應或失於調治耽延數月漸大如盤如碗堅硬疼痛根形散漫串延胸肋腋下其色或紫或黑未潰先腐外皮黴黑爛斑數處漸漸通破輕津白汁重流臭水即敗漿膿也日久潰深傷膜內病漸添午後煩熱乾嗽顴紅形瘦食少陰虛等證俱見變成瘵勞初結腫時氣實者宜服蔞貝散及神效栝蔞散氣虛者逍遙散及歸脾湯合而用之陰虛之證已見宜服六味地黃湯以培其本外治法按癰疽潰瘍門然此瘵成勞至易獲效甚難

蔞貝散

栝蔞　貝母 去心研

南星　甘草 生

連翹 各一錢 去心

水二鍾煎八分澄渣加酒二分食遠服

一加青皮升麻

方歌　蔞貝散治乳結核漸大失調變乳勞初腫氣實須服此南星甘草共連翹

神效栝蔞散

大栝蔞 一個去皮焙為末　當歸

甘草 各五錢生　沒藥

乳香 各二錢

共研粗末每用五錢醇酒三鍾慢火熬至一

鍾去渣食後服之

方歌 神效栝蔞沒乳香甘草當歸研末良乳勞初腫酒煎服消堅和血是神方

逍遥散 見背部上搭手

歸脾湯 見乳中結核

六味地黄湯 即六味地黄丸改作煎劑見面部雀斑

乳岩圖

乳岩

乳岩初結核隱疼肝脾兩損氣鬱凝核無紅熱身寒熱遠灸養血免患攻艱延積發如堆栗堅硬岩形引腋胸頂透紫光先腐爛時流污水日增疼潰後翻花怒出血即成敗證藥不靈

註 此證由肝脾兩傷氣鬱凝結而成自乳中結核起初如豆粟漸如棋子無紅無熱有時隱痛速宜外用灸法內服養血之劑以免內攻若年深日久即潮熱惡寒始覺大痛牽引胸

腋腫如覆盌堅硬形如堆栗高凸如岩頂透紫色光亮肉含血絲先腐後潰污水時津有時湧出臭血腐爛深如岩穴翻花突如泛蓮疼痛連心若復因急怒暴流鮮血根腫愈堅期時五臟俱衰即成敗證百無一救若患者果能清心滌慮靜養調理庶可施治初宜服神效栝蔞散次宜服歸脾湯外貼季芝鯽魚膏其核或可望消若反復不應者疮勢已成不可過用尅伐峻劑致損胃氣即用香貝

養榮湯或心煩不寐者宜服歸脾湯潮熱惡寒者宜服逍遙散稍可苟延歲月如得此證者於腫核初起即加醫治宜用豆粒大艾壯當頂灸七壯次日起皰挑破用三稜鍼刺入五六分插入冰螺散撚子外用紙封糊至十餘日其核自落外貼絳珠膏生肌玉紅膏內服舒肝養血理脾之劑生肌斂口自愈

季芝鯽魚膏

活鯽魚肉　鮮山藥去皮各等分

右共搗如泥加麝香少許塗核上覺癢極勿搔動隔衣輕輕揉之七日一換旋塗即消

方歌　鯽魚膏貼乳岩疾腫如覆盌似堆栗山藥同研加麝香塗於患處七日易

冰螺撚

硇砂二分　大田螺五枚去殼線穿曬乾

冰片一分　白砒即人言一錢二分麪裹煨熟去麪用砒

將螺肉切片同白砒研末再加硇片同碾細以稠米糊搓成撚子磁罐密收用時將撚插

入鍼孔外用紙糊封貼核上勿動十日後四邊裂縫其核自落

方歌　冰螺撚消諸核癧硇砂螺肉煨白砒再加冰片米糊撚乳岩堅硬用之宜

神效栝蔞散見乳勞

香貝養榮湯見項部上石疽

清肝解鬱湯

歸脾湯俱見乳中結核

逍遙散見背部上搭手

絳珠膏

生肌玉紅膏俱見潰瘍門

御纂醫宗金鑑卷六十七

編輯外科心法要訣目錄

腹部

幽癰

中脘疽

嚇癰

衝疽

臍癰 附臍中出水

少腹疽

腹皮癰

緩疽

腋部

腋癰

腋疽

黯疔

肋部

肋疽

淵疽

內發丹毒

脇癰 附疽

內癰部

肺癰

大小腸癰

胃癰

脾癰

肝癰

心癰

腎癰

三焦癰

內癰總論

驗內癰法

御纂醫宗金鑑卷六十七

編輯外科心法要訣

幽癰圖

腹部

幽癰

幽癰臍上七寸生初小漸大腫硬疼憂思厚味火毒發咬牙寒戰毒陷攻

註 此證生臍上七寸初起如粟漸增漫腫疼痛形如鵞卵甚則堅硬痛牽胸肋由過食膏粱厚味憂思氣結腸胃不通火鬱成毒自內而外發也初起腫痛皮色未紅時若心煩嘔噦脈沉實者當疎火毒以絕其源宜內疎黃連湯服之欬腫痛甚邪氣實也宜服托裏散外用艾壯隔蒜片灸之脈見沉遲其膿未成用補中益氣湯托之脈見洪數其膿已成用托裏透膿湯膿熱脹痛不潰係氣血虛也急用十全大補湯温補之外兼用卧鍼開卧鍼者斜入斜出防傷內膜也或誤行汗下或誤敷寒凉以致腫而不潰潰而不斂者急用十全大補湯加乾薑附子以救之已潰朝寒暮熱者氣血虛也食少作瀉脾胃虛也胸痞痰涌

脾肺虛也俱服六君子湯服後諸證悉退換十全大補湯調理即愈外治之法按癰疽腫瘍潰瘍門無論已潰未潰忽咬牙寒戰係氣虛不能勝毒毒陷攻裏之兆或潰後膿水忽多忽少瘡口如蟹吐沫者係內膜已透俱爲逆證

托裏散

皂刺　金銀花

黄芩　牡蠣煅

當歸　赤芍
朴消　大黃
花粉　連翹去心各等分
共研粗末每用五錢酒水各一鍾煎八分去
渣服
方歌 托裏散醫諸瘡毒腫甚焮疼煎服消皂刺銀
花芩牡蠣歸芍消黃花粉翹
內疎黃連湯見腫瘍門
隔蒜灸法見首部灸法

托裏透膿湯見頭部侵腦疽
補中益氣湯
十全大補湯
六君子湯即香砂六君子湯減去藿香砂仁俱見潰瘍門

中脘疽圖

中脘疽

中脘疽由胃火生臍上四寸隱隱疼堅硬漫腫無
紅熱不食嘔噦毒內攻

註 此證一名胃疽發於心胸之下臍上四寸任脈經中脘穴隱痛日久向外生疽堅硬漫腫皮色無紅無熱由過食炙煿以致胃腑火毒而成入迎脈盛是毒氣攻裏作嘔不食咳嗽膿痰者逆初宜服仙方活命飲色紫堅硬宜服山甲內消散膿勢將成內外治法俱按癰

疽腫瘍潰瘍門若起長膿遲或瘡不焮痛者
急用艾壯隔獨頭蒜片置患上灸之回陽

山甲內消散

穿山甲 炒三大片　當歸尾
大黃　甘草節 各三錢
土木鱉 三個　黑牽牛
殭蠶 炒各一錢

酒水各一鍾煎八分空心服渣再煎服大便
行三四次方食稀粥淡味調理

方歌 山甲內消火毒積色紫堅疼中脘疽歸尾大
黃殭草節木鱉牽牛加酒宜

仙方活命飲 見腫瘍門

嚇癰圖



嚇癰

嚇癰七情鬱火成臍上三寸粟微紅緊腫焮痛二
七潰頂陷色黑潰遲凶

註 此證由七情鬱火凝結而成生臍上三寸屬
任脈經建里穴初如粟米癢痛相兼其腫迅
速寒熱往來甚則嘔噦牽引臍痛初腫微紅
頂尖根束漸透赤色時痛時止十四日潰膿
者順若頂陷紫黑根脚漫腫面赤大渴脈見
浮數而散大者逆內治與幽癰參考外治法

按癰疽腫瘍潰瘍門

衝疽圖

衝疽

衝疽臍上二寸生心火毒熾入腎紅高腫焮痛速潰吉若見七惡定然凶

註 此證生於任脈臍上二寸下脘穴一名中發疽又名壅腎瘡由心火熾盛流入腎經而成色赤高腫應在二七一日潰破膿稠受補者順初宜瘡科流氣飲或仙方活命飲消之膿將成時內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門其證若平塌紫黑膿水清稀七惡證見者逆

瘡科流氣飲 見背部痰注發

仙方活命飲 見腫瘍門

臍癰圖

臍癰 附臍中出水

臍癰毒發在臍中腫大如瓜突若鈴無紅無熱宜
蒜灸稠膿為吉污水凶

註 此證由心經火毒流入大腸小腸所致生於
臍中屬任脈經神闕穴此穴禁鍼腫大如瓜
高突若鈴無紅無熱最宜隔蒜灸之初宜服
仙方活命飲加升麻消之便結實者內疏黃
連湯通利之將欲成膿內外治法俱按癰疽
腫瘍潰瘍門潰後得稠膿者順時出污水臭
穢者逆亦有臍中不痛不腫甚癢時津黃水
此屬腸胃濕熱積久宜服黃連平胃散外用
三妙散乾撒滲濕即愈當忌酒麪生冷果菜
不致再發若水出不止者亦屬逆

黃連平胃散

黃連五錢 陳皮
厚朴各三錢薑炒 甘草二錢生
蒼朮炒一兩

共研細末每服三錢白滾水調服

方歌 黃連平胃散陳甘厚朴蒼朮共細研專除濕
熱兼消積能令臍水立時乾

三妙散

檳榔 蒼朮生
黃蘗生各等分

共研細末乾撒肚臍出水津淫成片止癢滲
濕又治濕癬以蘇合油調搽甚效

方歌 三妙散用檳榔蒼黃蘗同研滲濕瘡蘇合油
調治濕癬收乾止癢效稱強

隔蒜灸法見首卷灸法

仙方活命飲

內疎黃連湯俱見腫瘍門

少腹疽圖

少腹疽

少腹疽生臍下邊證由七情火鬱纒高腫紅疼牽
背易漫硬將腐水膿難

註此證由七情火鬱而生每發於氣海丹田關
元三穴氣海在臍下一寸五分丹田在臍下
二寸關元在臍下三寸皆屬任脈經此三穴
或一穴發腫即爲少腹疽高腫紅活疼痛牽
背易潰稠膿者易治若漫腫堅硬綿潰腐爛
膿稀如水者難治凡遇此證初起急用艾灸

腫頂七壯至三七壯以痛癢通徹爲度宜服
仙方活命飲氣實之人大渴便秘者宜服內
疎黃連湯通利之老弱之人宜服內補十宣
散令其速潰若潰遲恐透內膜外治法同癰
疽腫瘍潰瘍門

仙方活命飲

內疎黃連湯俱見腫瘍門

內補十宣散見胸部[illegible]

腹皮癰圖



腹皮癰

腹皮癰生腹皮內皮裏膜外腫隱疼腹痛不止膿成候證由膏粱鬱火生

註此證生於腹皮裏膜外無論左右隱疼日久後發癰腫於皮外右關脈見沉數而腹痛甚者是其候也由膏粱火鬱而成初起壯實者用雙解貴金丸下之虛弱者減半用之不應再服半劑凡下之後腹痛不止膿將成也急用托裏透膿湯潰後與癰疽潰瘍門治法相同不可過用尅伐之劑若希圖消散過傷胃氣則腫不能潰潰不能斂立見危亡矣

雙解貴金丸見腫瘍門

托裏透膿湯見頭部侵腦疽

緩疽圖

緩疽

緩疽脾經氣積凝少腹旁生堅又疼數月不潰生
寒熱食少削瘦效難成

註此證由太陰脾經氣滯寒積而成生於少腹之旁堅硬如石不紅不熱痛引腰腿數月不潰若兼食少削瘦者終屬敗證不可棄而不治初宜服山甲内消散不應不可強消徒損胃氣以十全大補湯加烏藥附子胡盧巴温補之外用木香餅熨之兼用獨頭蒜搗爛鋪於患上艾壯灸之以知熱為止次日再灸以或消或潰為效若潰後即按癰疽潰瘍門治法

山甲内消散見中脘疽
十全大補湯見潰瘍門
木香餅見乳部乳中結核

腋癰圖

腋部

腋癰

腋癰暴腫生腋間腫硬焮赤痛熱寒肝脾血熱兼
忿怒初宜清解潰補痊

註此證一名夾肢癰發於腋際即俗名肐肢窩也屬肝脾血熱兼忿怒而成初起暴腫焮硬色赤疼痛身發寒熱難消必欲作膿初宜服柴胡清肝湯外敷冲和膏疼痛日增宜服透膿散加金銀花甘草節桔梗膿脹痛者鍼之

已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門此證首尾
忌用寒凉中年易愈老弱之人難痊

柴胡清肝湯 見頭部鬢疽

沖和膏

透膿散 俱見腫瘍門

腋疽圖

腋疽

腋疽初起若核形肝恚脾憂氣血凝漫腫堅硬宜
蒜灸日久紅熱潰先疼

註 此證一名米疽又名疚疽發於肱膊窩正中初起之時其形如核由肝脾二經憂思恚怒氣結血滯而成漫腫堅硬皮色如常日久將潰色紅微熱疼痛也初宜艾壯隔蒜片灸法內服柴胡清肝湯加烏藥消之虛弱之人宜服香貝養榮湯外用烏龍膏敷之早治或有

全消者遲則膿成宜服托裏透膿湯膿脹痛者鍼之膿出痛減隨患者虛實補之其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門此證初終內外治法禁用寒凉中年易愈衰老難痊

隔蒜灸法 見首卷灸法

柴胡清肝湯 見頭部鬢疽

香貝養榮湯 見項部上石疽

烏龍膏 見腫瘍門

托裏透膿湯 見頭部侵腦疽

黯疔圖

黯疔

黯疔藏於腋下生肝脾火毒癢而疼寒熱拘急色紫黑急按疔門治即寧

註　此證生於腋下由肝脾二經火毒而成堅硬勢若釘頭癢而且痛寒熱往來四肢拘急其色紫黑煩躁作嘔痛引半身宜服麥靈丹其次內外急按疔門治之即愈

麥靈丹見腫瘍門

脇疽圖

脇部

脇疽

脇疽始發屬肝經火毒鬱怒結腫形紫痛梅李甚如盌急宜鍼砭免內攻

註　此證一名夾熒疽生於脇條骨間由肝經火毒鬱怒結聚而成初如梅李漸大如盌色紫焮痛連及肩肘患在左痛牽右脇患在右痛牽左脇二十一日之內膿潰稠黏者順屆期不潰既潰出清水者逆初服急宜磁鍼砭出

紫血庶免毒氣攻裏砭後赤腫痛甚煩躁脈實作嘔為有餘之證宜服雙解貴金丸下之腫硬不潰宜服透膿散脈弱作嘔此胃虛也宜服香砂六君子湯補之亦有痛傷胃氣而作嘔者即同胃虛治之若感受寒邪及偶觸穢氣而作嘔者雖腫時尤宜壯胃助氣為主蓋腫時作嘔因毒氣內侵者十有一二停飲內傷者十有八九惟醫人臨證詳辨之膿熟用針開之餘按癰疽潰瘍門治法

雙解貴金丸
透膿散 俱見腫瘍門
香砂六君子湯 見潰瘍門

淵疽圖

淵疽

淵疽肝膽憂恚成生於肋下硬腫疼潰破有聲內膜透未潰當服護膜靈

註 此證因憂恚太過以致肝膽兩傷而成生於肋下初起堅硬腫而不紅日久方潰得稠白膿者順如豆漿水者險瘡口有聲似乎兒啼此屬內膜透也即於陽陵泉穴灸二七壯其聲即止穴在膝臏骨外臁下一寸陷中蹲坐取之即得內外治法皆同脇疽凡脇肋腰

腹空軟之處發癰疽者當在將潰未潰之際多服護膜散可免透膜之患

護膜散

白蠟　白及各等分

共研細末輕劑一錢中劑二錢大劑三錢黃酒調服米湯亦可

方歌 護膜散內二味藥白蠟白及爲細末或酒或以米湯調將膿預服不透膜

內發丹毒圖

內發丹毒

丹毒肝脾熱極生肋上腰胯赤霞形急宜砭出紫黑血嘔噦昏脹毒內攻

註 此證由肝脾二經熱極生風所致生於肋骨延及腰胯色赤如霞遊走如雲痛如火燎急向赤腫週圍砭出紫黑血以瘦牛肉片貼之羊肉片亦可其毒即可減半初服雙解貴金丸汗之次服化斑解毒湯投方應病者順若嘔噦昏憒胸腹膜脹徧身青紫者則爲毒氣

內攻屬逆

化斑解毒湯

升麻　石膏

連翹去心　牛蒡子炒研

人中黃　黃連

知母　黑參各一錢

竹葉二十片水二鍾煎八分服

方歌 化斑解毒熱生風致發丹毒雲片紅升膏翹蒡中黃等黃連知母黑參同

雙解貴金丸 見肺癰門

脇癰圖

脇癰 附疽

脇癰焮紅高腫疼疽堅塌漫冷不紅皆屬肝膽怒
火結遲潰敗漿冷虛凶

註此證生於輭肋有硬骨者爲肋肋下輭肉處爲季脇癰疽二證皆由肝膽怒火凝結而成多生於體虛之人初如梅李漸長如盌如盆色紅焮痛高腫二七潰破膿稠爲癰若堅硬平塌漫腫木痛不紅不熱月餘潰破稀膿爲疽若失治屆期不潰攻擊成膿腫如鼓脹破出敗漿腥臭膿者逆癰疽二證初腫時俱宜急服柴胡清肝湯解鬱瀉火如已成者服托裏透膿湯膿熟脹痛俱用臥鍼開之已潰以排餘膿補氣血爲要餘按癰疽潰瘍門治法投補不應者難治

柴胡清肝湯 見頭部鬢疽

托裏透膿湯 見頭部侵腦疽

五臟六腑

諸募穴圖



內癰部

肺癰

肺癰肺熱復傷風肺藏生癰隱痛胸狀若傷寒燥欬甚稠濁痰涎腥臭膿未潰射干麻黃汗壅不得臥葶藶攻潰後膿稠能食吉膿清兼血不食凶

註此證係肺藏蓄熱復傷風邪鬱久成癰以致胸內中府穴隱隱疼痛振寒脈數狀類傷寒咽燥不渴欬而喘滿唾稠黏黃痰兼臭穢膿血也治之者於未潰時乘膿未成風鬱於表者法宜疎散用射干麻黃湯以汗之如氣壅喘滿身不得臥者急服葶藶大棗湯以瀉之如欬有微熱煩滿胸中甲錯膿欲成者宜千金葦莖湯以吐之若吐膿腥臭形如米粥者宜桔梗湯以排餘膿若吐膿腥臭欬而胸滿者宜外臺桔梗白散以開瘀塞若咯吐膿血兼午後身熱煩躁宜金鯉湯主之兼飲童便若潰後胸膈脇肋隱痛不止口燥咽乾煩悶多渴自汗盜汗眠臥不得欬吐稠痰腥臭此

係癰膿不盡而兼裏虛宜寧肺桔梗湯主之若癰膿已潰喘滿腥臭濁痰俱退惟欬嗽咽乾咯吐痰血脇肋微痛不能久臥者此屬肺痿氣虛未歛宜紫菀茸湯清補之渴甚去半夏加石膏服之若癰膿潰後欬嗽無休膿痰不盡形氣虛羸者宜清金寧肺丸主之凡治此證惟以身溫脈細膿血交粘痰色鮮明飲食甘美膿血漸止便潤者爲吉若手掌皮粗潰後六脈洪數氣急顴紅污膿白血懶食及

大便結燥者爲凶中府穴又名肺募在乳上第三根肋骨間

射干麻黃湯

射干十三枚或三兩 麻黃
生薑各四兩 細辛
紫菀 款冬花各三兩
大棗七枚 五味子
半夏洗各半升

水煎溫服

方歌 射干麻黃欬上氣肺癰喉中水雞聲射麻生薑辛菀夏五味大棗並款冬

葶藶大棗湯

苦葶藶輕者五錢重者一兩 大棗輕者十枚重者十枚去核

以水三鍾煎至一鍾服之

方歌 葶藶大棗治肺壅欬不得臥有癰膿葶藶苦寒瀉實熱佐棗之甘和胃經

千金葦莖湯

葦莖二升 薏苡仁炒

瓜瓣冬瓜仁各半升 桃仁五十粒去皮尖炒研

水煎服

方歌 千金葦莖肺癰欬微熱煩滿吐敗濁皮膚甲錯宜葦莖薏苡桃仁瓜瓣合

桔梗湯

苦桔梗一兩 甘草生二兩

水煎服

方歌 桔梗湯用排餘膿肺癰吐膿米粥形清熱解毒須甘草開提肺氣桔梗功

外臺桔梗白散

苦桔梗　貝母各三分

巴豆一分去皮熬研如脂

右三味爲散强人飲服半錢匕羸者減之病在膈上者吐膿在膈下者瀉出若下多不止飲冷水一盃則定

方歌 外臺桔梗白散方肺癰便秘服之良桔梗貝母與巴豆藥微力大功速强

金鯉湯

金色活鯉魚一尾約四兩重　貝母二錢

先將鯉魚連鱗剖去肚腸勿經水氣用貝母細末摻在魚肚內線紮之用上白童子便半大盌將魚浸童便內重湯燉煑魚眼突出爲度少頃取出去鱗骨取淨肉浸入童便內燉熱肉與童便作二三次一日食盡一枚其功效甚捷

方歌 金鯉湯中效罕稀法同貝母活鯉魚童便浸魚重湯燉肺癰煩熱善能醫

寧肺桔梗湯

苦桔梗　貝母去心

當歸　栝蔞仁研

生黃耆　枳殼麩炒

甘草節　桑白皮炒

防己　百合去心

薏苡炒各八分　五味子

地骨皮　知母生

杏仁炒研　苦葶藶各五分

水二鍾薑三片煎八分不拘時服

欬甚倍加百合

身熱加柴胡黃芩

大便不利加蜜炙大黃一錢

小水澀滯加燈心木通

煩躁痰血加白茅根

胸痛加人參白芷

方歌 寧肺桔梗肺癰膏歸蔞貝殼甘桑皮防己百合葶五味杏知苡仁地骨宜

紫菀茸湯

紫菀茸　犀角末

甘草炙　人參各五分

桑葉用經霜者　款冬花

百合去心　杏仁炒研

阿膠便潤炒用便燥生用　貝母去心

半夏製　蒲黃生各七分

引薑三片水二鍾煎八分將犀角末調入食後服

方歌　紫菀茸湯參犀角款冬桑葉杏百合阿膠甘夏貝蒲黃專醫肺癰不久卧

清金寧肺丸

陳皮　白茯苓

苦桔梗　貝母去心

人參　黃芩各五錢

麥冬去心　地骨皮

銀柴胡　川芎

白芍炒　胡黃連各六錢

五味子　天冬去心

生地酒浸搗膏　熟地搗膏

歸身　白术炒各一兩

甘草炙三錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸食遠白滚湯送下

方歌　清金寧肺丸肺癰陳苓桔貝參二冬柴芩歸芍黃連草术味生熟地骨芎

大小腸癰

大小腸癰因濕熱氣滯瘀血注腸中初服大黃行瘀滯膿成薏苡牡丹平

註　此二證俱由濕熱氣滯凝結而成或努力瘀血或産後敗瘀蓄積流注於大腸小腸之中初起發熱惡風自汗身皮甲錯關元天樞二穴隱痛微腫按之腹內急痛大腸癰多大便墜腫小腸癰多小水澁滯脈俱遲緊此時癰膿未成宜大黃湯下之瘀血利盡若小水閉澁仍宜大黃湯加琥珀末木通利之自效若

癰成日久不潰身皮甲錯內無積聚腹急腹痛身無熱而脈數者係腸內陰冷不能為膿宜薏苡附子散主之若脈見洪數肚臍高突腹痛脹滿不食動轉側身則有水聲便淋刺痛者癰膿已成宜薏苡湯主之腹滿而痛少腹急脹時時下膿者毒未解也宜丹皮湯治之如膿從臍出腹脹不除飲食減少面白神勞此屬氣血俱虛宜八珍湯加牡丹皮肉桂黃耆五味子斂而補之患者轉身動作宜徐

緩而勿驚慎之如毓延日久因循失治以致毒攻內藏腹痛牽陰腸胃受傷或致陰器紫黑腐爛色敗無膿每流汚水衾幃多臭煩躁不止身熱嗌乾俱屬逆證關元穴又名小腸募在臍下三寸天樞穴又名大腸募在臍旁開二寸

大黃湯

大黃剉炒　牡丹皮

消石研　芥子

桃仁炒先以滾水去皮尖雙仁勿用

右各等分共剉碎每用五錢水二鍾煎至一鍾去渣空心溫服以利下膿血為度未利再服

方歌　大黃湯善治腸癰少腹堅痛膿未成牡丹皮與大黃炒芥子桃仁消石寧

薏苡附子散

附子炮二分　敗醬五分

薏苡仁炒一錢

右為末每服方寸匕以水二合煎頓服小水當下三因云薏苡附子同前敗醬用一兩一分每四錢水盞半煎七分去渣空心服

方歌　薏苡附子散甲錯腸癰腹脹痛脈數附子敗醬薏苡仁為末水煎空心服

薏苡湯

薏苡仁　栝蔞仁各三錢

牡丹皮　桃仁泥各二錢

水二鍾煎至一鍾不拘時服

方歌 薏苡湯治腹水聲腸癰便淋刺痛疼牡丹皮
共栝蔞子還有桃仁薏苡仁

丹皮湯

丹皮　栝蔞仁各一錢
桃仁泥　朴消各二錢
大黃五錢

水二鍾煎一鍾去滓入消再煎數滚不拘時
服

方歌 丹皮湯療腸癰證腹濡而痛時下膿消黃丹

蔞桃仁共水煎服之有奇功

八珍湯見潰瘍門

胃癰

胃癰中脘穴腫疼不欬不嗽吐血膿飲食之毒七
情火候治腸癰大法同

註 此證初起中脘穴必隱痛微腫寒熱如瘧身
皮甲錯並無咳嗽咯吐膿血由飲食之毒七
情之火熱聚胃口成癰脈來沉數者初服清
胃射干湯下之若脈濇滯者瘀血也宜服丹
皮湯下之脈洪數者膿成也赤豆薏苡仁湯
排之體倦氣喘作渴小水頻數者肺氣虛也
補中益氣湯加麥冬五味子補之其候證生
死治法與大小腸癰同中脘穴又名胃募在
臍上四寸

清胃射干湯

射干　升麻
犀角　麥冬去心
元參　大黃
黃芩各一錢　芒消

梔子　竹葉各五錢

水煎服

方歌 清胃射干湯射干升麻犀角麥冬全參芩大
黃芒消等竹葉山梔胃癰痊

赤豆薏苡仁湯

赤小豆　薏苡仁
防巳　甘草各等分

水二鍾煎八分食遠服

方歌赤豆薏苡湯最神甘已赤豆薏苡仁胃癰膿
成脈洪數二鍾水煎服八分

丹皮湯 見大小腸癰

補中益氣湯 見潰瘍門

脾癰

脾癰濕熱瘀血凝章門穴腫兼隱疼腹脹嗌乾小
水短利下濕瘀補收功

註 此證始發章門穴必隱疼微腫由過食生冷
兼濕熱或瘀血鬱滯脾經而成令人腹脹咽

嗌乾小水短澁初宜大黃湯赤豆薏苡仁
湯二方合而用之以攻滯鬱二便通利腹脹
全消宜六君子湯扶脾調理順逆看法與胃
癰同章門穴又名脾募在臍旁開六寸高上
二寸

大黃湯 見大小腸癰

赤豆薏苡仁湯 見胃癰

六君子湯 即香砂六君子湯去藿香砂仁 見潰瘍門

肝癰

肝癰憤鬱氣逆成期門穴腫更兼疼臥驚胠滿溺
不利清肝滋腎即成功

註 此證始發期門穴必隱痛微腫令人兩胠脹
滿脇痛側臥則驚便溺艱難由憤鬱氣逆而
成初服復元通氣散次服柴胡清肝湯痛腫
已止宜服六味地黃丸脾虛食少則佐以八
珍湯滋腎補脾治之取效禁用溫補鍼灸期
門穴又名肝募在乳旁一寸半再直上一寸
半

復元通氣散 見腫瘍門

柴胡清肝湯 見頭部鬢疽

六味地黃丸 見面部雀斑

八珍湯 見潰瘍門

心癰

心癰巨闕腫隱疼酷飲嗜熱火毒成面赤口渴身
作痛治法陽熱總宜清

註 此證始發巨闕穴必隱痛微腫令人寒熱身
痛頭面色赤口渴隨飲隨乾由心火熾盛更

兼酷飲嗜熱而成宜服凉血飲酒毒爲病者
宜服升麻葛根湯治之此證甚屬罕有但治
法不可不備巨闕穴又名心募在臍上六寸
五分

凉血飲

木通　瞿麥
荆芥　薄荷
白芷　花粉
甘草　赤芍

麥冬去心　生地
山梔子　車前子
連翹去心各等分

引用燈心若潮熱加淡竹葉水煎溫服

方歌 凉血飲善治心癰瞿荆荷芷草翹通赤芍山
梔乾生地車前花粉麥門冬

升麻葛根湯

山梔　升麻
葛根　白芍
柴胡　黄芩各一錢
黄連　木通
甘草各五分

水二鍾煎八分不拘時服

方歌 升麻葛根湯山梔酒毒心癰黄連宜柴芍通
芩升葛草水煎溫服不拘時

腎癰

腎癰腎經不足生京門微腫隱隱疼少腹脇下䐜
脹滿房勞形寒邪外乘

註 此證始發京門穴必隱痛微腫令人寒熱往
來面白不渴少腹及脇下䐜脹塞滿由腎虛
不足之人房勞太過身形受寒邪氣自外乘
之初服五積散加細辛寒盡痛止宜用桂附
地黄丸調理京門穴又名腎募在身側腰中
監骨下脇間

五積散

蒼朮炒二錢　陳皮
桔梗　川芎

當歸　白芍各一錢
麻黃　枳殼麩炒
桂心　乾薑
厚朴各八分　白芷
半夏製　甘草生
茯苓各四分

引薑一片水二鍾煎八分不拘時服
頭痛惡寒者加連鬚葱頭三個蓋臥汗出甚
效

方歌　五積散蒼殼陳苓麻黃半桔歸芍芎芷朴桂
心乾薑草腎癰寒邪服成功

桂附地黃湯見潰瘍門

三焦癰

三焦癰由濕熱凝石門穴上腫隱疼寒結治同腸
癰法內癰俱係膜內生

註　此證始發石門穴必隱疼微腫令人寒熱往
來二便秘澀由濕熱遇寒凝結而成治法與
大小腸癰同凡內癰俱係膜內成患外皮不
腐石門穴又名三焦募在臍下二寸

內癰總論

凡人胸腹有十二募募者各藏府陰會之所也靈
樞云發內癰內疽者其本經募上肉必浮腫募中
必時時隱痛浮腫爲癰隱痛爲疽此即內癰內疽
之驗也茲內癰有治法內疽無治法何也蓋內癰
內疽其病原無殊惟在根淺根深之別耳根淺爲
癰根深爲疽若臨證用藥攻補得宜無不收效至
募有十二而內癰僅九證者何也蓋膽府形如膜

皮無出無納汁清氣潔不生內癰內疽若夫膀胱
亦如膜皮中惟濁水故古今書籍並無講及內癰
內疽者是以未敢詳載雖然中極穴即膀胱募也
令人間有中極穴或浮腫或隱痛者所見證候竟
同小腸癰治法亦當按小腸癰治之可也俟後之
學者留意焉

驗內癰法

凡遇生內癰之人與生黃豆五粒嚼之口中無豆
味者是其候也

御纂醫宗金鑑卷六十八

編輯外科心法要訣目錄

肩部

肩中疽

乾疽

過肩疽

髎疽

肩風毒

樂疽

臑部

臑癰　附藕包毒

魚肚發

石榴疽

肘癰

臂部

臂癰　附疽

腕癰

兌疽

穿骨疽

骨蝼疽

蝼蛄串

手部

手發背

掌心毒

虎口疽　附合谷疔

病鰕

手丫發

調疽

蛇頭疔

天蛇毒

蛇眼疔

蛇背疔

蛀節疔

蛇腹疔

泥鰍疽

代指

蜣螂蛀
瘑瘡
狐尿刺
鵝掌風

御纂醫宗金鑑卷六十八

編輯外科心法要訣

肩中疽圖

乾疽圖

過肩疽圖



肩部

肩中疽　乾疽　過肩疽

肩疽瘫發正肩中疽硬紫暗瘫腫紅乾疽肩前過
肩後風濕積熱血瘀凝

註此疽生於肩中廉屬三焦膽二經紅活高腫
一名疵瘍堅硬平塌為肩中疽肩之前廉屬
大腸經名乾疽一名疔疽肩之後廉屬小腸
經名過肩疽勢無論大小惟在發源之處
命名總由濕熱風邪鬱成亦有負重瘀血凝

結而成高腫紅活焮熱速潰者順若平塌堅
硬無紅無熱潰遲者險甚則臑痛連及臂胛
口噤寒戰大痛不食或兼綿潰便瀉者逆治
法初起有表證者俱宜荊防敗毒散汗之有
裏證者內疏黃連湯下之汗下之後腫痛不
退膿勢將成宜用托裏透膿湯膿熟開之至
於引經之藥惟在臨證時因經加之潰後內
外治法俱按癰疽潰瘍門

荊防敗毒散見項部腦疽

內疏黃連湯見腫瘍門

托裏透膿湯見頭部侵腦疽

髎疽圖

肩風毒圖

髎疽　肩風毒

髎疽肩後腋外生小腸肩貞風火凝肩風毒生臑端上大腸肩髃風濕成

注髎疽生於肩之後下腋之後外微上岐骨縫之間經屬小腸肩貞穴由風火凝結而成初起如粟堅硬腫痛肩膊拘急不能舉揚初服荊防敗毒散便燥實者服雙解貴金丸雙解之肩風毒生於肩梢臑上骨尖處經屬大腸肩髃穴由邪風深襲骨縫與濕積留化熱而成初起宜腫色赤大者如桃小者如杏痛連肩膊更兼拘急初服獨痛無憂散汗之即消若腫痛日深不能盡消者膿勢將成也宜服托裏透膿湯二證潰後內外治法俱按癰疽潰瘍門

獨痛無憂散

番木鱉香油炸浮　當歸酒洗

甘草生各二兩　麻黃二兩

穿山甲[illegible]炒　川烏黑豆酒煮去皮尖

草烏 薑汁煮　蒼朮 米泔水浸炒

半夏 各二兩製　威靈仙 一兩

各製為末共和勻每服五七分至一錢無灰酒調服再飲酒以醉為度蓋臥出汗避風此方加鬧羊花四兩亦治頭風痛

方歌 鐲痛無憂肩風毒風襲骨縫與濕凝番鱉歸草麻黃甲川芎烏蒼半威靈

荊防敗毒散 見項部腦疽

雙解貴金丸 見腫瘍門

托裏透膿湯 見頭部侵腦疽

樂疽圖

樂疽

樂疽肩前腋上生骨縫開合凹陷中堅如鷄卵痛入骨包絡血熱氣鬱成

註 此證生於肩前腋之上骨縫開合空凹陷中初起如椒子漸腫堅硬大如鵝卵按之疼痛入骨屬包絡經血熱氣鬱而成其證屆期潰破出稠膿腫消者順月餘不潰既潰出清水腫硬不退者逆初宜服神授衛生湯若惡風太過倍加葱白汗之次服托裏透膿湯潰遲

者十全大補湯潰後內外治法俱按癰疽潰瘍門

神授衛生湯見腫瘍門

托裏透膿湯見頭部侵腦疽

十全大補湯見潰瘍門

臑癰圖

藕包毒圖

臑部 自肩至肘曰臑

臑癰 附藕包毒

臑癰肩肘過匝腫色赤焮疼乘癰殭藕包毒狀鴨鴨卵臑內三陰外三陽

注 此證由風濕或風火凝結而成生於肩下肘上週匝漫腫色赤焮痛初起形如粟米一攢亦有起一粒痼疙瘩者漸次焮腫紅熱釋膿痛甚紅腫之外無暈者順有二暈者險三四暈者逆腫發臑內或臑外結腫一枚如桃如鴨鵝卵者名藕包毒毒者癰之輕證也臑癰藕包內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門此癰毒發苗之處若在臑內者屬手三陰經在臑外者屬手三陽經隨證用引經之藥必然獲效

魚肚發圖

魚肚發

魚肚發如魚肚形青靈穴生心火凝暴腫紅活焮熱痛癰疽治法即成功

注 此證生於臑之後垂肉處屬心經青靈穴由火毒凝結而成暴腫色赤焮熱疼痛形如魚肚腫潰治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門其引經之藥惟存臨證加之

石　榴　疽

石榴疽

石榴疽起肘尖上粟𤶼根開堅腫疼破翻如榴寒熱甚三焦相火與濕凝

註　此證生於肘尖上寸餘屬三焦經天井穴初起黃粟小𤶼根脚便覺開大色紅焮腫堅硬疼痛腫如覆盌破翻如榴寒熱如瘧由三焦相火與外濕相搏而成初起宜蟾酥丸汗之外以艾灸九壯貼蟾酥餅用萬應膏蓋之焮腫處敷冲和膏服菊花清燥湯煩躁熱甚者服護心散九日後作膿痛減宜食表裏證俱退者順反此者逆破後用菊花蕋煎湯洗之次以菊花燒灰存性加輕粉少許兌勻敷之神效至透膿脫腐生肌時內外治法俱按癰疽潰瘍門

菊花清燥湯

甘菊花二錢　當歸
生地　白芍酒炒
川芎　知母
貝母去心研　地骨皮
麥冬去心各一錢　柴胡
黃芩　升麻
犀角鎊　甘草生各五分

竹葉二十片燈心二十寸水二鍾煎八分食後溫服

方歌　菊花清燥石榴疽腫硬焮紅痛可醫四物柴芩知貝草升麻地骨麥冬犀

蟾酥丸

蟾酥餅 即蟾酥丸料捏成餅見疔瘡門

萬應膏 見潰瘍門

冲和膏

護心散 俱見腫瘍門

肘癰圖



肘癰

肘癰發於肘圍邊高腫焮熱赤紅疼心肺積留風邪火勢小為癤勢大癰

註 此證生於肘之圍遶暴發高腫焮熱色紅疼痛由心肺風火之邪稽留凝滯而成形勢小者為癤毒形勢大者為癰初服荊防敗毒散汗之次服白芷升麻湯消托之外敷二味拔毒散將潰治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

白芷升麻湯

黃芩二錢半生半酒炒 連翹二錢去心

黃耆三錢 白芷八分

升麻 桔梗各五分

紅花酒洗 甘草炙各一分

酒水各一鍾煎八分食遠熱服

方歌 白芷升麻醫腫痛解熱除煩托肘癰芩翹桔梗紅花草黃耆酒水各一鍾

荊防敗毒散 見項部腦疽

二味拔毒散 見腫瘍門

臂癰圖

臂部　自肘至腕曰臂

臂癰附疽

臂癰臂疽遶臂生　平紫硬疽紅腫癰　榮衛風邪逆肉理　甚則拳縮徹骨疼

註此證生臂外側屬三陽經臂裏側屬三陰經高腫紅活焮痛潰速者爲癰平陷紫暗堅硬木痛潰遲者爲疽俱由榮衛不週感受風邪逆於肉理而成初起形如粟粒憎寒壯熱宜服荊防敗毒散汗之焮痛煩熱宜服白芷升麻湯消之膿勢將成宜服托裏透膿湯膿熟鍼之若疽證木痛無紅無熱此屬氣血兩虛無論已潰未潰宜服十全大補湯托之潰後內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門若拳縮筋不能舒疼痛徹骨者係潰深傷筋也屬逆

荊防敗毒散　見項部腦疽

白芷升麻湯　見臑部臑癰

托裏透膿湯　見頭部侵腦疽

十全大補湯　見潰瘍門

腕癰圖

腕癰

腕癰三陽風火凝手腕背面結癰形高腫速潰順
易治腐爛露骨逆難功

註　此證生於手腕背面屬手三陽經由風火凝結而成高腫紅活在十四日潰破膿出痛減者順而易治手腕乃皮肉澆薄之處若遷延日久不潰或漫腫平塌既潰腐爛露骨者逆難於收功初服荊防敗毒散汗之外用太乙紫金錠敷之膿成將潰即按癰疽腫瘍潰瘍

治法

荊防敗毒散 見項部腦疽

太乙紫金錠 見胸部脾發疽

兌疽圖

兌疽在手腕裏面橫紋前稍動脈之間左右同



兌疽

兌疽生腕動脈間堅硬漫腫兌骨邊痛徹手膊為
險證本屬肺經穴太淵

註　此證生於手腕裏面橫紋前稍動脈之間兌骨裏側屬肺經太淵穴由憂思氣滯風火結成堅硬漫腫疼痛徹骨手膊不能轉動此動脈處乃肺經門戶若發此疽或潰深大洩肺氣最為險候內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

穿骨疽圖

穿骨疽

穿骨疽生間使穴掌後三寸包絡經堅硬漫腫因蘊熱毒盛潰深穿骨疼

【註】此證生於間使穴處在掌後橫紋上三寸兩筋陷中屬包絡經蘊熱凝結而成初起如粟漸增堅硬漫腫微紅膠熱疼痛應期速潰者順若潰破遲緩膿毒潰穿骨縫從臂外側出膿者險內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

骨螻疽圖

骨螻疽

骨螻疽生臂外廉經屬陽明憂怒纏痞疼根束多善順紫暈腐串七惡難

【註】此證生於臂外側前廉大骨之後屬手陽明大腸由憂鬱暴怒凝結而成初如粟豆旬日大如桃李腫硬疼痛痞根收束多見五善之證者順若紫暈開大腐爛斑點串通肌肉抽搐拘急多見七惡之證者逆始終內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

螻蛄串圖

螻蛄串

螻蛄串生臂內中思傷脾氣包絡凝筋骨如中流矢痛內潰串孔似漏形

註 此證生於臂內中廉屬包絡經由思慮傷脾脾傷則運化遲故生濁液流於肌肉腑氣滯鬱不舒凝結而成此患初起筋骨如中流矢疼痛漸增漫腫堅硬不紅不熱連腫數塊臂膊不能轉動日久其腫塊漸次潰破孔孔時流白漿內潰串通諸孔外勢腫硬不消膿水淋漓如漏虛證悉添如面黃食少削瘦甚則午後寒熱交作而成敗證也初起宜服逍遙散外敷太乙紫金錠次服人參養榮湯調和氣血扶助脾胃十中可保二三潰按癰疽潰瘍治法若投藥不效者屬逆

逍遙散 見背部上搭手

太乙紫金錠 見胸部脾發疽

人參養榮湯 見潰瘍門

手發背圖

手部

手發背

手發背初芒刺形三陽風火與濕凝堅硬潰傷筋骨險高腫速潰易收功

註此證生於手背屬手三陽經由風火與濕凝滯而成初起形如芒刺漸覺疼痛高腫紅活焮熱潰速爲順若漫腫堅硬無紅無熱潰遲爲逆其證無論形勢大小但潰深露筋骨者難痊初俱宜服羌活散汗之次服內疎黃連湯清之其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

羌活散

羌活 當歸各一錢

獨活 烏藥

威靈仙各一錢五分 升麻

前胡 荊芥

桔梗各一錢 甘草生五分

肉桂三分

酒水各一鍾煎一鍾食遠服

方歌 羌活散醫手發背除濕發汗把風追升麻前獨荊歸草烏藥威靈桔桂遂

內疎黃連湯見腫瘍門

掌心毒圖

掌心毒

掌心毒生赤腫疼經屬包絡積熱成偏於掌邊名穿掌初宜發汗次宜清

註　此證生於手掌心赤腫疼痛屬包絡經勞宮穴積熱而成若偏於掌邊名穿掌毒一名穿埂毒又名鵝䕶初起治同手發背其餘治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

虎口疽圖

虎口疽　附合谷疔

虎口疽生合骨穴經屬大腸熱濕凝根深爲疔大爲疽堅硬木痛汗鍼明

註　此證生於合谷穴在手大指次指岐骨間屬大腸經濕熱凝結而成一名丫叉毒一名擘蟹毒初起如豆漫大色青木痛堅硬名虎口疽若初起黃粟小皰癢熱焮痛根深有紅線上攻腋內即名合谷疔無論疔疽初俱宜羌活散汗之內疎黃連湯清之疽證體熱鍼之

餘治法按癰疽腫瘍潰瘍門疔證於初起將
疔根挑去有紅絲者當紅絲盡處用鍼砭斷
其餘治法俱按疔門

羌活散 見手發背

內疏黃連湯 見腫瘍門

病鰕圖

病鰕

病鰕每在手背生形勢如鰕赤腫疼內宜消毒外
湯洗手三陽經熱毒成

註 此證生於手背屬手三陽經積熱毒盛而成
形勢如鰕高埂赤腫疼痛初宜服黃連消毒
飲外用食鹽酒糟香油同炒合香滓以滚湯
淋洗患處即消如高埂不消再用蟾酥餅貼
之外用巴膏蓋之以腐盡埂子次敷生肌散
仍用膏蓋收斂

黃連消毒飲 見頭部百會疽

蟾酥餅 即蟾酥丸作餅見疔毒門

巴膏

生肌散 俱見潰瘍門

手丫發圖

手丫發

手丫發生手指岐濕火凝結本於脾初粟漸豆焮熱痛內外治法按疔醫

註此證生於手丫岐骨縫間除大指合谷穴其餘指丫生患即名手丫發本於脾經濕火凝結而成初起如粟色紅漸大如豆焮熱疼痛潰後疼痛不止者俟膿塞脫出其痛方止內外治法俱按疔證門

調疽圖

調疽

調疽大指肺熱生如粟如李青紫疼六日刺出膿血青黑腐延蔓斷指凶

註此證生於手大指由肺經積熱而成初如粟豆漸腫如李青紫麻木癢痛徹心六日刺破出稠膿雜血者吉出黑血者險初服麥靈丹汗之次服仙方活命飲外敷白錠子其餘內外治法俱同癰疽腫瘍潰瘍門若黑腐延蔓不痛者名斷指屬逆治法與足部脫疽同

麥靈丹
仙方活命飲
白錠子 俱見癰瘍門

蛇頭疔圖

天蛇毒圖



蛇頭疔　天蛇毒

蛇頭疔皰紫硬疼天蛇毒疼悶腫紅二證俱兼脾經火看生何指辨專經

註 此二證俱生於手指頂尖夫手指雖各有專經然俱兼脾經火毒而成蛇頭疔自筋骨發出根深毒重初起小皰色紫疼痛堅硬如釘初宜服蟾酥丸汗之外敷雄黃散天蛇毒自肌肉發出其毒稍輕初起悶腫無頭色紅痛如火燎初宜服蟾酥丸汗之外敷雄黃牡蠣

散二證膿勢將成俱服仙方活命飲膿熟開之外貼琥珀膏煨膿生肌治之虛不能斂者補之但手指係皮肉淺薄之處不宜灸法亦不宜開早若誤灸開早以致皮裂努肉翻出疼痛倍增者不能速愈慎之手指經絡圖歌俱見首卷

雄黃散

明雄黃二錢　輕粉五分

蟾酥二分　冰片一分

共研細末新汲水調濃重湯炖溫敷於患指用薄紙蓋之日換三四次

方歌　雄黃散治蛇頭疔紫痛極堅火毒攻冰片蟾酥輕粉末汲水調塗用紙封

雄黃牡蠣散

牡蠣四錢　明雄黃一錢

另研細共和一處再研勻蜜水調濃重湯炖溫塗於患指能止疼痛日用五六次

方歌　雄黃牡蠣天蛇毒指頭焮紅悶腫疼二味細研加蜜水調敷止痛效又靈

蟾酥丸 見疔瘡門

仙方活命飲 見腫瘍門

琥珀膏 見頭部髮際瘡

蛇眼疔圖

蛇背疔圖



蛙節疔圖



蛇腹疔圖

泥鰍疽圖



蛇眼疔　蛇背疔　蛀節疔
蛇腹疔　泥鰍疽

蛇眼疔在甲旁生甲後名爲蛇背疔蛀節疔生中節骨蛇腹指內魚肚形泥鰍疽生徧指腫牽引肘臂熱焮疼看生何指分經絡總由臟腑火毒成

註此證有五如蛇眼疔生於指甲兩旁形如豆粒色紫半含半露硬似鐵釘蛇背疔生於指甲根後形如半棗色赤胖腫蛀節疔又名蛇節疔生於中節遶指俱腫其色或黃或紫蛇腹疔又名魚肚疔生於指中節前面腫如魚肚色赤疼痛泥鰍疽一指通腫色紫形如泥鰍焮熱痛連肘臂初起俱宜服蟾酥丸汗之外敷雄黃散次服仙方活命飲膿熟開之貼琥珀膏煨膿生肌處不能斂者補之但此五證總不外乎火毒凝結而成至於屬何經臟臨證看生何指以辨之手指經絡各詳註首卷

蟾酥丸見疔瘡門

雄黃散見蛇頭疔

仙方活命飲見腫瘍門

琥珀膏見頭部髮際瘡

代指圖

代指

代指每生指甲身先腫焮熱痛應心輕潰微膿重脫甲經脈血熱是其因

注 此證生於手指甲身內由經脈血熱凝結而成初起先腫焮熱疼痛應心宜用甘草朴硝各五錢熬水浸洗即瘥痛仍不止三四日後指甲背面上微透一點黃白色此係內膿已成但無門潰出急用線鍼在指甲身就膿近處撚一小孔膿方得出隨手挒盡餘膿用黃

連膏貼之易愈或失治或過敷寒涼藥以致肌肉寒凝膿毒浸淫好肉不甲潰空必然脫落用琥珀膏貼之一兩月即愈

黃連膏 見鼻部鼻瘡

琥珀膏 見頭部髮際瘡

蜣螂蛀圖

蜣螂蛀

蜣螂蛀由痰氣凝指節堅腫蟬肚形初起不疼久方痛潰久膿清癆病成

注 此證多生於體虛人手指骨節由濕痰寒氣凝滯而成初起不紅不熱不痛漸次腫堅形如蟬肚屈伸艱難日久方知木痛初腫時宜先服六君子湯益氣除濕化痰外以離宮錠蔥汁磨敷或兼陽燧錠於堅痛處灸之自消若失於調治腫處漸漸腐爛膿如清水淋瀝

不已腫仍不消然在骨節之處潰久大泄氣
血每成瘡癆之證宜豫服人參養榮湯補之
外貼蟾酥餅子陀僧膏蓋之遇壯年人如法
治之可愈若年老及尫羸之人不能收功

六君子湯 即香砂六君子湯減去藿香砂仁見腫瘍門

離宮錠 見腫瘍門

陽燧錠 見首卷灸法

人參養榮湯

陀僧膏 俱見潰瘍門

蟾酥餅 見疔瘡門

瘑瘡圖

瘑瘡

瘑瘡每發指掌中兩手對生茱萸形風濕癢痛津汁水時好時發久生蟲

〔註〕此證生於指掌之中形如茱萸兩手相對而生亦有成攢者起黃白膿皰癢痛無時破津黃汁水時好時發極其疲頑由風濕客於膚腠而成以消風散服之若日久不愈其癢倍增內必生蟲治以殺蟲為主用蘆薈膏擦之甚效忌動風雞鵝魚腥等物

藜蘆膏

藜蘆　苦參各一兩

猪脂油八兩將二味煠枯濾去渣入松香一兩溶化離火再加枯礬末雄黃末各一兩攪勻候温塗之以痊爲度

方歌 藜蘆膏用苦參良脂油煠濾入松香再加枯礬雄黃攪殺蟲止癢抹瘑瘡

潤肌膏 見頭部白屑風

狐尿刺圖

狐尿刺

狐尿刺生手足間悶腫焮痛紅紫斑常因螳精尿沾積毒誤觸肌膚痛不眠

註 此證大成書名狐狸刺外臺總錄一書名狐尿刺由螳螂盛暑交媾精汁染於諸物乾久有毒人手足誤觸之則成此患初起紅紫斑點肌膚乾燥悶腫焮痛不眠十日後腐開瘡口日寬內宜服黃連解毒湯外以蒲公英連根濃煎温洗若得鮮蒲公英搗汁塗患處更佳蓋螳螂又名野狐鼻涕此證取名蓋本於此將潰治法按癰疽潰瘍門

黃連解毒湯 見耳部黑疔

鵝掌風圖

鵝掌風

鵝掌風生掌心間皮膚燥裂紫白斑楊梅餘毒血燥熱兼受風毒凝滯源

注此證生於掌心由生楊梅餘毒未盡又兼血燥復受風毒凝滯而成初起紫白斑點疊起白皮堅硬且厚乾枯燥裂延及徧手外用二礬散先之三油膏搽之內用祛風地黃丸料加土茯苓白鮮皮當歸爲佐作丸服之甚效若年久成癬難愈又有不因楊梅後無故掌心燥癢起皮甚則枯裂微痛者名掌心風由脾胃有熱血燥生風血不能榮養皮膚而成宜服祛風地黃丸外用潤肌膏久久擦之即愈

祛風地黃丸

生地 熟地各四兩

白蒺藜 川牛膝酒洗各三兩

知母 黃蘗

枸杞子各二兩 菟絲子酒製

獨活各一兩

共研末煉蜜和丸如梧桐子大每服三錢黃酒送下夏月淡鹽湯下

方歌 祛風地黃除血熱鵝掌風生服即瘥知蘗蒺藜牛膝菟獨杞同研煉蜜和

二礬散

白礬 皂礬各四兩

兒茶五錢 側柏葉八兩

水十盌煎數滾聽用先以桐油搽患處再用

紙撚桐油浸透火點向患處薰片時次用前湯乘熱貯淨木桶內手架桶上以布將手連桶口蓋嚴湯氣熏手勿令泄氣待微熱將湯傾入盆內蘸洗良久一次即愈七日切不可見水

方歌 二礬掌起紫白斑礬與兒茶栢葉煎先以桐油搽患處油撚燃薰後洗痊

三油膏

牛油 柏油

香油 銀朱各一兩

官粉 麝香各一錢研細

將三油共合火化入黃蠟一兩溶化盡離火再入朱麝官粉等末攪勻成膏搽患處火烘之以油乾滋潤為度

方歌 三油膏潤鵝掌風初斑漸裂燥癢攻牛柏香油朱粉麝蠟熬擦患火上烘

潤肌膏 見頭部白屑風

御纂醫宗金鑑卷六十九

編輯外科心法要訣目錄

下部

懸癰

穿襠發

跨馬癰

便毒

疳瘡

陰虱瘡

腎囊癰

腎囊風

婦人陰瘡

臀部

鸛口疽

坐馬癰

臀癰

上馬癰下馬癰

涌泉疽

臟毒

痔瘡

坐板瘡

御纂醫宗金鑑卷六十九

編輯外科心法要訣

下部

懸癰

懸癰毒生會陰穴初如蓮子漸如桃三陰虧損濕
熱鬱潰久成漏爲瘡勞

注 此證一名騎馬癰生於篡間係前陰之後後陰之前屏翳穴即會陰穴係任脈經首穴也由三陰虧損兼憂思氣結濕熱壅滯而成其初生如蓮子微癢多痛日久焮腫形如桃李色紅作膿欲潰若破後潰深久則成漏以致潰盡氣血變爲瘡勞初起氣壯實尚未成膿小水澀滯者宜用九龍丹瀉去病根稍虛者仙方活命飲利去濕熱如法治之遇十證可消三四如十餘日後腫勢已成不能內消宜服托裏消毒散或托裏透膿湯自破如不破腫高光亮脹痛者用卧鍼刺之穢膿一出其腫全消者順朝服六味地黃丸午服十全大

補湯溫補滋陰又有過食膏粱厚味氣實者初服龍膽瀉肝湯潰服滋陰八物湯又有房勞過度羸弱者初服八珍湯潰服十全大補湯脾虛不食六君子湯日久成漏者國老膏化湯送服琥珀蠟礬丸外治法按癰疽潰瘍門當戒房勞怒氣魚腥發物慎重調理

九龍丹

木香　乳香

沒藥　兒茶

血竭　巴豆不去油

等分為末生蜜調成一塊磁盒收貯臨用時旋丸豌豆大每服九丸空心熱酒一杯送下行四五次方食稀粥腫甚者間日再用一服

白消

方歌 九龍丹醫懸癰毒初起未破膿未成木香乳沒兒茶竭巴豆蜜丸酒服靈

滋陰八物湯

當歸　生地黃

白芍藥酒炒　川芎

丹皮　花粉各一錢

澤瀉五分　甘草節一錢

水二鍾燈心五十寸煎八分食前服

大便秘者加蜜炒大黃一錢

方歌 滋陰八物過膏粱懸癰已潰服此方四物丹皮花粉瀉草節便秘加大黃

仙方活命飲

琥珀蠟礬丸

托裏消毒散俱見腫瘍門

托裏透膿湯見頭部侵腦疽

六味地黃丸見面部雀斑

十全大補湯

八珍湯

六君子湯即香砂六君子湯減去藿香砂仁俱見潰瘍門

龍膽瀉肝湯見腰部纏腰火丹

國老膏見背部丹毒發

穿襠發

穿襠毒發會陰前憂思勞傷濕鬱源焮痛紅順塌
陷逆腐深漏溺收斂難

註 此證生於會陰穴之前腎囊之後由憂思勞傷濕鬱凝結而成初起如粟漸生紅亮焮痛潰出稠膿者順若起如椒子黑焦陷於皮肉之內漫腫紫暗並無焮熱痛連睾丸及腰背肛門者逆此係皮囊空處凡生毒患宜速潰根淺但遇根深遲潰腐傷尿管漏溺不能收斂者至險內治按懸癰外治按癰疽腫瘍潰

瘍門

跨馬癰

跨馬癰生腎囊旁重墜肝腎火濕傷紅腫焮痛宜
速潰初清托裏勿寒涼

註 此證一名騗馬墜生於腎囊之旁大腿根裏側股縫夾空中由肝腎濕火結滯而成初如豆粒漸漸腫如鵝卵時隨墜重色紅焮痛綦起高腫速潰稠膿者順若漫腫平塌微熱微紅潰出稀膿者險多成串皮漏證此處乃至陰之下醫治不可過用寒涼初宜服仙方活命飲消之次服托裏透膿湯既潰之後內外治法俱按癰疽潰瘍門

仙方活命飲 見腫瘍門

托裏透膿湯 見頭部侵腦疽

便毒

便毒生於腿縫間忍精瘀血怒傷肝堅硬木痛寒
熱作初汗次下灸之痊

註 此證又名血疝又名便癰無論男女皆可以

生發於少腹之下腿根之上摺紋縫中經屬肝腎由強力房勞忍精不洩或慾念不遂以致精搏血留聚於中途壅遏而成或為暴怒傷肝氣滯血凝而發初如杏核漸如鵝卵堅硬木痛微熱不紅令人寒熱往來宜荊防敗毒散汗之若煩躁作渴氣鬱者宜山甲內消散以消解之若過於堅硬大痛者宜紅花散瘀湯舒通之前藥用之不應者宜九龍丹攻之若無痛無熱則不可攻下宜陽燧錠日灸

五七壯以或輭或消或潰為止膿勢將成不可強消宜黃耆內托散托之甚虛者托裏透膿湯既潰宜八珍湯十全大補湯補中益氣湯因證用之外用五色靈藥撒之化腐煨膿兼琥珀膏萬應膏貼之生肌斂口斯證潰後即名魚口因生於摺紋縫中其瘡口潰大身立則口必合身屈則口必張形如魚口開合之狀故有魚口之名但此毒係忍精不洩怒氣傷肝而成至於生楊梅而兼有便毒者另詳註於楊梅門

紅花散瘀湯

紅花　當歸尾
皂刺各一錢　生軍三錢
連翹去心　蘇木
穿山甲炙研　石決明
殭蠶炒　乳香
貝母去心研各一錢　黑牽牛二錢

酒水各一鍾煎八分空心服行五六次方食稀粥補之

方歌 紅花散瘀消堅硬便毒初起腫痛添歸刺軍翹蘇木甲石決殭蠶乳貝牽

黃耆內托散

黃耆二錢　白朮土炒一錢
當歸　川芎各二錢
金銀花　皂刺
天花粉各一錢　澤瀉
甘草炙各五分

水二鍾煎八分食前服

方歌 黃耆內托醫便毒腫盛不消托潰良白朮歸芎銀皂刺天花澤草力同勛

荊防敗毒散見項部腦疽
山甲內消散見腹部中脘疽
九龍丹見前懸癰
陽燧錠見首卷灸法
托裏透膿湯見頭部侵腦疽
八珍湯

十全大補湯
補中益氣湯
五色靈藥
萬應膏 俱見潰瘍門
琥珀膏 見頭部髮際瘡

疳瘡

疳瘡統名有二原慾火未遂溲淋雜房術塗藥痛癢紫光亮赤腫梅毒慾

注 此證統名疳瘡又名妬精瘡生於前陰經云

前陰者宗筋之所主督經脈絡循陰器合篡間又云腎開竅於二陰是瘡生於此屬肝督腎三經也其名異而形殊生於馬口之下者名下疳生莖之上者名蛀疳莖上生瘡外皮腫脹包裹者名袖口疳疳久而偏潰者名蠟燭疳痛引睪丸陰囊腫墜者名雞膯疳痛而多癢潰而不深形如剝皮爛杏者名瘙疳生馬口旁有孔如棕眼眼內作癢捻之有微膿出者名鏇根疳生楊梅時或誤用薰搽等藥以致腐爛如臼者名楊梅疳又有生楊梅時服輕粉水銀打成塊藥以致便溺尿管內刺痛者名楊梅內疳諸疳原由有三一由男子慾念萌動淫火猖狂未經發泄以致敗精濁血留滯中途結而爲腫初起必先淋漓溲溺澁痛次流黃濁敗精腐物漸損甚則腫痛腐爛治當疏利肝腎邪火以八正散清肝導滯湯主之一由房術熱藥塗抹玉莖洗搽陰器僥倖不衰久頓不洩以致火鬱結腫初起陽

物癢痛堅硬漸生瘡色紫腐爛血水淋漓不時興舉治當瀉火解毒以黃連解毒湯蘆薈丸主之一由娼家婦人陰器瘀精濁氣未淨輒與交媾以致淫精傳染梅毒初起皮腫紅亮甚如水晶破流脂水麻癢時發腫痛日增治當解毒以龍膽瀉肝湯主之次服二子消毒散外通用大豆甘草湯洗之紅腫熱痛以鯉魚膽汁敷之損破腐爛以鳳衣散旱螺散珍珠散銀粉散加吞脫疳散因證敷之惟

楊梅疳與楊梅內疳二證多服五寶散甚效

八正散

萹蓄　生軍各一錢
滑石二錢　瞿麥
甘草生　車前子
梔子　木通各一錢

水二鍾煎八分食前服

方歌 八正散清積火盛小水作淋結腫疼萹蓄車滑瞿麥草車前梔子木通靈

清肝導滯湯

萹蓄四錢　滑石二錢
甘草一錢生　大黃二錢便秘者用
瞿麥三錢

水二鍾燈心五十寸煎八分空心服

方歌 清肝導滯清肝熱玉莖腫疼小水澁萹蓄滑石草大黃燈心瞿麥服通徹

二子消毒散

土茯苓八兩　豬脂二兩切碎
杏仁炒去皮尖　殭蠶炒
蟬蛻各七個　牛膝
荊芥　防風各一錢
皂角子七個　金銀花三錢
肥皂子七個　豬牙皂角一錢

水八盌煎三盌作三次服如結毒服三七日自愈

袖口疳加黃蘗一錢肥皂子倍之

楊梅疳加薏苡仁皂刺各一錢側栢葉綠豆

糯米各三錢

楊梅內疳加海金沙五加皮白丑各一錢五分

方歌 二子消毒梅毒疳土苓豬脂杏殭蟬膝荊防皂角子銀花肥皂豬牙煎

大豆甘草湯

黑豆一合　甘草生一兩
赤皮葱三莖　槐條六十寸

水煎濃澄湯候溫日洗二次

方歌 大豆甘草湯神方諸般疳證洗之良止癢消
疼能解毒赤葱槐條共熬湯

鳳衣散

鳳凰衣一錢 雞抱卵殼 輕粉四分
冰片二分 黃丹一錢

共研細末鴨蛋清調敷或乾撒亦可

方歌 鳳衣散能敷潰疳輕粉冰片共黃丹化腐生
肌兼止癢鴨蛋清調痛即安

旱螺散

白田螺殼煅三錢 輕粉一錢
冰片 麝香各三分

共研細末香油調敷

方歌 旱螺散用易生肌潰疳癢痛俱可醫煅螺殼
與輕冰麝香油調敷去腐宜

珍珠散

珍珠 黃連末
黃蘗末 定粉
輕粉 象牙末
五倍子炒 兒茶
沒藥 乳香各等分

共研極細末先以米泔水洗患處再撒此藥
甚效

方歌 珍珠散治下疳瘡清熱除瘀脫腐強連蘗兒
茶輕定粉五倍象牙沒乳香

銀粉散

上好錫六錢火化開入硃砂末二錢攪炒砂枯
去砂留錫再化開投水銀一兩和勻傾出聽用

定粉一兩研極細鋪綿紙上捲成一條一頭點
火煨至紙盡爲度吹去紙灰用粉同前錫汞再
加輕粉一兩共合一處研成極細末先以甘草
湯淋洗患處拭乾隨撒此藥能生肌止痛收斂
甚效

方歌 銀粉散醫疳腐蝕莖損梅毒爛皆施錫炒硃
砂水銀入定輕二粉對研之

回春脫疳散

黑鉛五錢火化開投水銀二錢五分研不見星

爲度再加寒水石三錢五分輕粉二錢五分硼砂一錢共研細末先以葱艾花椒煎湯洗患處再撒此藥

方歌 回春散先化黑鉛次下水銀要細研寒水硼砂輕粉入下疳蝕爛撒之痊

五寶散

石鍾乳四錢如乳頭下垂敲破易碎似蜻蜓翅者方真

硃砂一錢　珍珠二錢豆腐內煮半炷香時取出

氷片一錢　琥珀二錢

各研極細和一處再研數百轉磁罐密收用藥二錢加飛羅麪八錢再研和勻每用土茯苓一觔水八盌煎至五盌濾去渣作五次每次加五寶散一分和勻量病上下服日用十十如鼻子腐爛每日土茯苓內加辛夷三錢煎服引藥上行忌食海腥牛羊鵝肉火酒煎炒房事等件

方歌 五寶散硃鍾乳珍氷珀飛羅麪細勻楊梅疳瘡結毒證土苓湯調服最神

黃連解毒湯見耳部黑疔

蘆薈丸見齒部牙衄

龍膽瀉肝湯見腰部纏腰火丹

陰虱瘡

陰虱瘡蟲毛際內肝腎濁熱不潔生瘙癢抓紅含紫點若還梅毒蠟皮形

註 此瘡一名八脚蟲生於前陰毛際內由肝腎氣濁生熱兼淫慾失洗不潔搏滯而成瘙癢難忍抓破色紅中含紫點內宜服蘆薈地黃

丸外用鍼挑破去虱隨擦銀杏無憂散易愈若毛際內如豆如餅發癢結如蠟皮者楊梅毒也即按楊梅毒治之

銀杏無憂散

水銀鉛製　輕粉

杏仁去皮尖搗膏　蘆薈

雄黃　狼毒各一錢

麝香一分

除水銀杏仁膏共研篩細再入銀杏同研勻

先以石菖蒲煎湯洗之用鍼挑破去虱隨用津唾調擦使藥氣入內愈不復發切忌牛犬鱉肉

方歌 銀杏無憂散止癢熱滯毛際陰虱瘡鉛製水銀輕粉杏蘆薈雄黃狼麝香

蘆薈地黃丸 即六味地黃丸加蘆薈五錢鹽炒黃蘗一兩見面部雀斑

腎囊癰

腎囊紅腫發為癰寒熱口乾焮痛疼肝腎濕熱流注此失治潰深露睾凶

注 此證生於腎囊紅腫焮熱疼痛身發寒熱口乾飲冷由肝腎濕熱下注腎囊而成初起宜服荊防敗毒散汗之外用蔥磁熬湯燙之寒熱已退宜服清肝滲濕湯消解之不應者膿勢將成也急服滋陰內托散若氣怯食少者宜服托裏透膿湯外用二味拔毒散圍敷腫根膿脹痛者用卧鍼鍼之出稠膿者順出腥水者險宜服托裏排膿湯外用琥珀膏貼之俟腫消膿少痛減時用生肌散生肌玉紅膏以生肌斂口此癰本於肝腎發出以滋陰培補氣血為要生肌斂口時朝服六味地黃湯暮服人參養榮湯滋補之甚效此證若失治潰深露睾丸者險然不可棄而不治宜杉木灰托之蘇子葉包之患者仰卧靜以養之或可取效

清肝滲濕湯

黃芩　梔子生研
當歸　生地

白芍藥酒炒　川芎
柴胡　花粉
龍膽草各一錢酒炒　甘草生
澤瀉　木通各五分

水二鍾燈心五十寸煎八分食前服

方歌 清肝滲濕消囊癰小水淋漓腫痛攻芩梔四物柴花粉膽草燈甘瀉木通

滋陰內托散

當歸　熟地

白芍藥酒炒　川芎各一錢五分

穿山甲炙研　澤瀉

皂刺各五分　黃耆一錢五分

水二鍾煎八分食前服

方歌 滋陰內托將潰劑囊癰欲膿托最宜四物穿山瀉皂刺食前煎服入黃耆

荆防敗毒散見項部腦疽

托裏透膿湯見頭部侵腦疽

二味拔毒散見腫瘍門

托裏排膿湯見項部魚尾毒

琥珀膏見頭部髮際瘡

生肌散

生肌玉紅膏

人參養榮湯俱見潰瘍門

六味地黃湯即六味地黃丸改作湯劑見面部雀斑

腎囊風

腎囊風發屬肝經證由風濕外襲成麻癢搔破流脂水甚起疙瘩火燎疼

註 此證一名繡毬風係腎囊作癢由肝經濕熱風邪外襲皮裏而成初起乾燥癢極喜浴熱湯甚起疙瘩形如赤粟麻癢搔破浸淫脂水皮熱痛如火燎者此屬裏熱俱宜龍膽瀉肝湯服之外用蛇床子湯薰洗之洗後擦狼毒膏甚效

蛇床子湯

威靈仙　蛇床子

當歸尾各五錢　縮砂殼三錢

土大黃　苦參各五錢

老葱頭七個

水五盌煎數滾傾入盆內先薰候溫浸洗

方歌 蛇床子湯洗囊風止癢消風除濕靈威靈歸尾縮砂殼土大黃與苦參葱

狼毒膏

狼毒　川椒

硫黃　檳榔

文蛤　蛇床子

大風子　　枯白礬各三錢

共研細末用香油一茶鍾煎滚下公豬膽汁一枚和勻調前藥擦患處

方歌 狼毒膏擦繡毬風濕癢浸淫火燎疼椒硫檳蛤床風子枯礬豬膽油調成

龍膽瀉肝湯見腰部纏腰火丹

婦人陰瘡

婦人陰瘡係總名各有形證各屬經陰挺如蛇脾虛弱陰腫勞傷血分成陰蝕胃虛積鬱致陰脫憂

思太過生陰癩氣血雙虛損隨證施治諸證平

註 此證俱生於陰器如陰中挺出一條如蛇形者名為陰挺由脾經虛弱或產後過怒受風所致初宜服逍遙散加荊芥防風次宜朝服補中益氣湯倍用升麻晚服龍膽瀉肝湯外以蛇床子煎湯薰洗之如陰戶忽然腫而作痛者名為陰腫又名蚌疽由勞傷血分所致宜四物湯加丹皮澤瀉花粉柴胡服之或服秦艽湯外用艾葉一兩防風六錢大戟五錢煎湯薰洗如陰器外生疙瘩內生小蟲作癢者名為陰蝕又名䘌瘡由胃虛積鬱所致宜四物湯加石菖蒲龍膽草黃連木通服之若寒熱與虛勞相似者蟲入臟腑也宜逍遙散吞送蘆薈丸早晚各一服外以溻癢湯薰洗次以銀杏散塞入陰中殺蟲止癢如陰戶開而不閉癢痛出水者名為陰脫由憂思太過所致宜逍遙散或歸脾湯俱加柴胡梔子白芍丹皮服之由產後得者補中益氣湯加五

味子醋炒白芍服之外俱用荊芥枳殼訶子文蛤大劑煎湯薰洗如子宮脫出名為陰癩俗名瘣葫蘆由氣血俱虛所致宜補中益氣湯去柴胡倍用升麻加益母草服之外以蓖麻子肉搗爛貼頂心再用枳殼半觔煎湯薰洗由思慾不遂肝氣鬱結而成者必先於小便似有堵塞之意因而努力久之隨努而下令穩婆扶正葫蘆令患婦仰臥以枕墊腰吹嚏藥收之收入即緊閉陰器隨以布帛將腿

縛定內仍服補中益氣湯自愈

秦艽湯

秦艽六錢　石菖蒲

當歸各三錢

葱白五個水二鍾煎一鍾食前服

方歌 秦艽湯治蚌疽生腫痛能除效可徵石菖蒲
與當歸片食前葱白水煎成

湯癢湯

苦參　狼毒

蛇床子　當歸尾

威靈仙各五錢　鶴虱草一兩

用河水十盌煎數滚濾去渣貯盆內乘熱先
薰待温投公豬膽汁二三枚和勻洗之甚效

方歌 湯癢殺蟲療陰蝕熬湯薰洗不宜遲苦參狼
毒床歸尾豬膽威靈鶴虱施

銀杏散

輕粉　雄黃

水銀鉛製　杏仁生用各一錢

右各研共和一處再勻每用五分棗肉一枚
和丸用絲綿包裹線紮緊將藥入陰內留線
頭在外如小解時將藥取出解完復入內一
日一換四五箇自愈

方歌 銀杏散醫熱下侵輕粉雄黃製水銀杏仁棗
肉綿包裹陰癢生瘡用有神

逍遙散見背部上搭手

歸脾湯見乳部乳中結核

補中益氣湯見潰瘍門

龍膽瀉肝湯見腰部纏腰火丹

四物湯見耳部耳瘡

蘆薈丸見齒部牙衄

鸛口疽圖



臀部

鸛口疽

鸛口疽生尻尾尖，經屬督脈濕痰源，腫如魚肫潰鸛嘴，少壯易愈老難痊。

註 此證一名銳疽，生於尻尾骨尖處，初腫形如魚肫，色赤堅痛，潰破口若鸛嘴，屬督脈經，由濕痰流結所致，朝寒暮熱，夜重日輕，潰出稀膿，為不足；或流稠膿鮮血，為有餘。少壯可愈，老弱難斂，易於成漏。初起宜滋陰除濕湯以和之；已成不得內消者，用和氣養榮湯以托之；氣血虛弱，潰而斂遲者，滋腎保元湯以補之；若失治久而不斂者，宜服先天大造丸，兼服琥珀蠟礬丸，久久收斂。外治法按癰疽腫瘍、潰瘍門。

滋陰除濕湯

當歸　熟地
川芎　白芍各一錢 酒炒
陳皮　柴胡

知母　貝母去心研
黃芩各八分　澤瀉
地骨皮　甘草生，各五分

水二鍾，薑三片，煎八分，食前服。

方歌 滋陰除濕鸛口疽，退熱消痰初起宜，四物陳柴知母草，澤瀉黃芩地骨皮。

和氣養榮湯

人參　白朮土炒
白茯苓　丹皮

陳皮　熟地
當歸　黃耆各一錢
沉香　甘草炙各五分
水二鍾煎八分食前服
方歌 和氣養榮托銳疽將膿煎服潰更宜四君丹
皮陳熟地當歸沉香共黃耆
滋腎保元湯
人參　白朮土炒
白茯苓　當歸身

熟地　黃耆
山萸肉　丹皮
杜仲各一錢　肉桂
附子製　甘草炙各五分
水二鍾薑三片紅棗肉二枚建蓮子七個去
心煎八分食前服
方歌 滋腎保元潰後虛斂遲膿清水淋漓十全大
補除芎芍山萸附子杜丹皮
先天大造丸

人參　白朮土炒
當歸身　白茯苓
菟絲子　枸杞
黃精　牛膝各二兩
補骨脂炒　骨碎補去毛微炒
巴戟肉　遠志去心各一兩
廣木香　青鹽各五錢
丁香以上共研末　熟地酒煮搗膏四兩
仙茅漿浸去赤汁蒸熟去皮搗膏　何首烏去皮用黑豆同蒸熟去豆搗膏

膠棗肉各二兩搗膏　肉蓯蓉去鱗甲酒浸搗膏
紫河車一具白酒煮爛搗膏以上六膏共入前藥末內
右為細末搗膏共合一處再加煉過白蜂蜜
為丸如梧桐子大每服七十丸空心溫酒送
下
方歌 先天大造補氣血專治瘰癧潰後虛膿水清
稀難收斂參朮歸苓地首烏補骨青鹽骨碎
補枸杞黃精遠菟絲巴戟仙茅丁木棗河車
牛膝蓯蓉俱

琥珀蠟礬丸見肺癰門

坐馬癰圖

坐馬癰

坐馬癰屬督脈經，尻尾略上濕熱凝，高腫速潰稠膿順，漫腫潰遲紫水凶。

註　此證生於尻尾骨略上，屬督脈經，由濕熱凝結而成。高腫潰速膿稠者順；若漫腫潰遲出紫水者險。虛人患此，易於成漏。初宜艾壯隔蒜片灸之，以宣通結滯，令其易潰易斂。內服之藥，與鸛口疽同。潰後內外俱按癰疽潰瘍門。

隔蒜灸法見首卷灸法

臀癰圖



臀癰

臀癰證屬膀胱經　堅硬悶腫濕熱凝　肉厚之處遲潰斂　最宜紅活高腫疼

註　此證屬膀胱經濕熱凝結而成，生於臀肉厚處，腫潰斂俱遲慢。初宜隔蒜片艾灸，服仙方活命飲消之；不應者，即服透膿散；膿熟鍼之。潰後內外治法，俱按癰疽潰瘍門。

隔蒜灸法（見首卷灸法）

仙方活命飲

透膿散（俱見腫瘍門）

上馬癰下馬癰圖



上馬癰　下馬癰

上馬癰與下馬癰，上左下右摺紋生，膀胱濕熱憂憤起，黑陷屬重高腫輕。

〔注〕此證生於臀肉之下摺紋中，屬膀胱經濕熱，又兼七情不和，憂憤凝滯而成。初起如粟，黃膿小疱，漸生焮痛，寒熱往來，高腫紅亮爲輕，平陷黑硬爲重。初服荊防敗毒散以退寒熱，次服內托羌活湯，膿勢將成，服托裏透膿湯，其餘內外治法，俱按癰疽潰瘍門。

內托羌活湯

羌活　黃蘗酒炒，各二錢

黃耆一錢五分　當歸尾

陳皮　藁本

連翹　蒼朮炒

甘草炙　防風各一錢

肉桂三分

水一鍾，酒半鍾，煎八分，食前服。

〔方歌〕內托羌活宣堅硬，燥濕能托臀下癰，歸黃陳蘗同甘草，藁本連翹蒼桂風。

荊防敗毒散見項部腦疽

托裏透膿湯見頭部侵腦疽

涌泉疽圖

涌泉疽

涌泉疽生尻骨前形如伏鼠腫痛堅督脈濕熱潰破險少壯易愈老弱難

註此證生尻骨之前長強穴屬督脈經首穴由濕熱凝結而成初腫堅硬疼痛狀如伏鼠十日可刺得白膿者順潰出青膿者險紫黑水者逆內治法同鸛口疽外治潰後按癰疽潰瘍門少壯者得此易愈老年氣衰弱者多成冷漏難痊

臟毒圖

臟毒

臟毒毒注在肛門內外虛實各有因醇酒厚味兼辛苦外屬陽分內屬陰

註此證有內外陰陽之別發於外者由醇酒厚味勞苦蘊注於肛門兩旁腫突形如桃令大便秘結小水短赤甚者肛門重墜緊閉下氣不通刺痛如錐脈數有力多實多熱屬陽易治宜服一煎散通利二便菩提露搽之腫痛仍前不全退者膿將成也宜服托裏透膿湯膿脹痛鍼之膿出之後治同潰瘍門發於內者兼陰虛濕熱下注肛門內結壅腫刺痛如錐大便虛閉小水淋漓寒熱往來遇夜尤甚脈數微細爲虛爲濕屬陰難治宜服五灰散膿毒自然潰出膿生遲者服十全大補湯托之潰後按潰瘍門

一煎散

當歸尾　穿山甲炙研

甘草生　桃仁泥

皂角刺各二錢 川黃連一錢五分
枳殼麩炒 檳榔
天花粉 烏藥
赤芍 生地
白芷各一錢 元明粉
大黃各三錢 紅花五分
水二鍾浸一宿次早煎一滾空心服俟行三
四次以稀粥補之
方歌 一煎散消臟毒方歸甲甘連桃枳榔天花皂

刺紅烏藥芍地元明芷大黃

菩提露
熊膽三分 冰片一分
涼水十茶匙調化開搽於患處甚效
方歌 菩提露消積熱痛臟毒堅疼焮腫增水調熊
膽加冰片搽於患處毒漸輕

五灰散
血管鵝毛 血餘
蜈蚣 穿山甲

生鹿角各燒存性
各等分研細共合勻每服五錢空心溫黃酒
調下
方歌 五灰散用鵝管毛血餘蜈甲鹿角燒臟毒腫
痛肛門內每服五錢黃酒調

托裏透膿湯見頭部侵腦疽
十全大補湯見潰瘍門

痔瘡

痔瘡形名亦多般不外風濕燥熱源肛門內外俱可發潰久成漏最難痊

註 此證係肛門生瘡有生於肛門內者有生於肛門外者初起成瘟不破者爲痔易治破潰而出膿血黃水浸淫淋瀝久不止者爲漏難痊斯證名因形起其名雖有二十四種總不外乎醉飽入房筋脈橫解精氣脫泄熱毒乘虛下注或憂思太過蘊積熱毒憤鬱之氣致

生風濕燥熱四氣相合而成如結腫脹悶成塊者濕盛也結腫痛如火燎二便閉者大腸小腸熱盛也結腫多癢者風盛也肛門圍遶摺紋破裂便結者火燥也初俱服止痛如神湯消解之外俱用菩提露或田螺水點之若堅硬者以五倍子散唾津調塗之兼用朴消葱頭煎湯洗之頂大蒂小者用藥線勒於痔根每日緊線其痔枯落隨以月白珍珠散撒之收口亦有頂小蒂大者用枯痔散枯之內痔不出者用喚痔散塡入肛門其痔即出隨以朴消葱頭煎湯洗之又有因勤苦勞役負重遠行以致氣血交錯而生痔者俱用止痛如神湯加減服之又有血箭痔生肛門或裏或外堵塞隆腫每逢大便用力則鮮血急流如箭不論糞前糞後由腸胃風熱而兼暴怒成之初服生熟三黃丸若脣白面色痿黃四肢無力屬氣血兩虛宜十全大補湯倍川芎參者服之外用自己小便洗之童便熱洗亦可其血自止亦有腸風下血點滴而出糞前

者宜防風秦艽湯糞後出血者爲酒毒宜服苦參地黃丸效後必多服臟連丸二三料除根又有產後用力太過而生痔者宜補中益氣湯加桃仁紅花蘇木服之又有久瀉久痢而生痔者宜補中益氣湯加槐花皂莢子煅末服之如痔已通腸汚從漏孔出者用胡連追毒丸酒服之服後膿水反多者藥力到也勿以爲懼如漏有管者用黃連閉管丸服之

可代鍼刀藥線之力凡痔未破已破及成漏者俱用却毒湯燙洗或用喇叭花煎湯日洗二次喇叭花即土地黃苗兼戒房勞河豚海腥辛辣椒酒等物有久患痔而後咳嗽者取效甚難久病咳嗽而後生痔者多致不救

止痛如神湯

秦艽去苗 桃仁去皮尖研

皂角子燒存性研各一錢 蒼朮米泔水浸炒

防風各七分 黃蘗酒炒五分

當歸尾酒洗 澤瀉各三分

檳榔一分 熟大黃一錢二分

右除桃仁皂角子檳榔用水二鍾將群藥煎至一鍾再入桃仁皂角子檳榔再煎至八分空心熱服待少時以美膳壓之不犯胃也忌生冷五辛火酒硬物大料濕麪之類

如腫有膿加白葵花五朵去蕊心 青皮五分 木香三分則膿從大便出也

如大便秘甚倍大黃加麻仁枳實

如腫甚倍黃蘗澤瀉加防已豬苓條芩

如痛甚加羌活郁李仁

如癢甚倍防風加黃耆羌活麻黃藁本甘草

如血下倍黃蘗多加地榆槐花荊芥穗白芷

如小便澀數不通者加赤茯苓車前子燈心萹蓄

方歌 止痛如神諸痔瘡風濕燥熱總能防歸蘗桃榔皂角子蒼朮艽風澤大黃

田螺水

大田螺一枚用尖刀挑起螺靨入冰片末五釐平放磁盤內待片時螺窩內滲出漿水用鷄翎蘸點患處勤勤點之其腫自然消散

方歌 田螺水點痔瘡效冰片裝入田螺窩少時化水取點瘡止痛消腫有奇妙

五倍子散

川文蛤大者一枚敲一小孔用陰乾荔枝草揉碎塞入文蛤內令滿用紙塞孔濕紙包煨片時許取出去紙研為細末每一錢加輕

粉三分冰片五釐共研極細末唾津調塗患
處

方歌 五倍子散痔痛隆堅硬腫疼立刻抑輕粉冰
片各研細荔枝草入蛤中煨

藥線

芫花五錢 壁錢二錢

用白色細衣線三錢同芫花壁錢用水一盌
盛貯小磁罐內慢火煮至湯乾爲度取線陰
乾凡遇痔瘡瘻瘤頂大蒂小之證用線一根

患大者二根雙扣繫紮患處兩頭留線日漸
緊之其患自然紫黑冰冷不熱爲度輕者七
日重者十五日後必枯落以月白珍珠散收
口甚效

方歌 藥線芫花共壁錢再加白扣線同煎諸痔瘻
瘤繫根處生似蕈形用此捐

枯痔散

天靈蓋 用童子者佳又用青綠末將天靈蓋浸片時撈出以火煅紅再入青綠水內淬之如此七次淨用四錢

砒霜一兩 白礬二兩生

輕粉四錢 蟾酥二錢

共爲極細末入小新鐵鍋內上用粗磁盌密
蓋鹽泥封固炭火煅至二炷香待冷揭開盌
將藥研末搽痔上每日辰午申三時用溫水
洗淨患處上藥三次上至七八日其痔枯黑
堅硬住藥裂縫待其自落

方歌 枯痔天靈蓋煅淬砒礬輕粉共蟾酥入鍋盌
蓋泥固煅痔瘡新久搽皆除

喚痔散

枯白礬五分 食鹽三分炒

草烏生 刺蝟皮各一錢煅存性

麝香五分 冰片二分

共研細末先用溫水洗淨肛門隨用唾津調
藥三錢塡入肛門片時卽出

方歌 喚痔散把內痔呼刺蝟皮鹽麝草烏冰片枯
礬同研細津調塡入片時出

生熟三黃湯

生地　熟地各一錢五分
黃連　黃蘗
黃芩　人參
蒼朮米泔水浸炒　白朮土炒
厚朴薑炙　當歸身
陳皮各一錢　地榆
防風　澤瀉
甘草生各六分　烏梅二個
水二鍾煎八分食前服

方歌　生熟三黃連蘗參蒼芩厚朮共歸陳榆風澤瀉烏梅草崩腸血箭痔如神

防風秦艽湯

防風　秦艽
當歸　生地
白芍酒炒　川芎
赤茯苓　連翹去心各一錢
梔子生研　蒼朮米泔水浸炒
槐角　白芷
地榆　枳殼麩炒
檳榔　甘草生各六分
水二鍾煎至八分食前溫服
如便秘者加大黃

方歌　防風秦艽治腸風墜腫津血最止疼四物梔蒼槐角芷地榆枳草翹檳苓

苦參地黃丸

苦參切片酒浸濕蒸曬九次為度炒黃為末淨一觔
生地黃酒浸一宿蒸熟四兩搗爛和入苦參末內

加煉過蜂蜜為丸如梧桐子大每服三錢白滾水送下或酒下亦可日服二次

方歌　苦參地黃糞後紅皆因酒毒熱來攻二味酒蒸蜂蜜煉為丸水送最有功

臟連丸

黃連八兩研淨末　公豬大腸肥者一段長一尺二寸水洗淨

右二味將黃連末裝入大腸內兩頭以線紮緊放砂鍋內下煮酒二斤半慢火熬之以酒乾為度將藥腸取起共搗如泥如藥濃再曬

一時許復搗爲丸如梧桐子大每服七十丸
空心溫酒送下久服除根
方歌 臟連丸用川黃連研入豬腸煮酒煎搗爛爲
丸溫酒服便血肛門墜腫痊

胡連追毒丸

胡黃連 切片薑汁拌炒研末　刺蝟皮 各一兩炙切片再炒黃研末
麝香 二分研細
共和一處研勻軟飯爲丸如麻子大每服一
錢食前溫酒送下

方歌 胡連追毒丸醫痔成漏通腸服最宜連麝蝟
皮飯丸服排盡瘀膿換好肌

黃連閉管丸

胡黃連 一兩淨末　穿山甲 香油內炸黃
石決明 煆　槐花 微炒各五錢
共研細末煉蜜爲丸如麻子大每服一錢空
心清米湯送下早晚服二次至重者不過四
十日而愈
如漏四邊有硬肉突起者加殭蠶二十條炒
研末入藥內及徧身諸般漏證服此方皆可
有效
方歌 黃連閉管丸穿山石決槐花共細研能除漏
管米湯送蜜丸麻子大一般

却毒湯

瓦松　馬齒莧
甘草 生各五錢　川文蛤
川椒　蒼朮
防風　葱白

枳殼　側柏葉 各三錢
焰消 一兩
水五盌煎三盌先薰後洗日用三次
方歌 却毒湯洗痔漏效瓦松甘草蛤川椒齒莧蒼
風葱枳殼栢葉同熬加焰消

菩提露 見臟毒

月白珍珠散

十全大補湯

補中益氣湯 俱見潰瘍門

坐板瘡圖

坐板瘡

坐板瘡在臀腿生形如黍豆癢焮疼暑濕熱毒凝
肌肉初宜燙洗油撚烘

註 此證一名風疳生於臀腿之間形如黍豆色紅作癢甚則焮痛延及谷道勢如火燎由暑令坐日曬几凳或久坐陰濕之地以致暑濕熱毒凝滯肌肉而成初宜芫花川椒黃蘗熬湯燙洗即消或毒盛癢痛仍不止者宜用油紅靑布三指寬一條香油調雄黃末一錢撚於布上捲之燃着吹滅焰頭向瘡烘之其癢痛即止甚效

御纂醫宗金鑑卷七十

編輯外科心法要訣目錄

股部
附骨疽
咬骨疽
股陰疽
橫痃疽
陰疽
伏兔疽
股陽疽
環跳疽
肚門癰
箕門癰
腿遊風
青腿牙疳
膝部
膝癰
疵疽

膝眼風
鶴膝風
下石疽
緩疽
委中毒
上水魚
人面瘡

編輯外科心法要訣

附骨疽圖

咬骨疽圖



股部

附骨疽　咬骨疽

附骨大腿外側生在腿裏側咬骨名體虛寒濕乘虛入寒熱往來不焮紅痛甚徹骨難屈轉寒濕化熱腫胖形蒜灸起皰無皰逆潰後最忌敗漿膿

註此二證生於大腿裏外外側屬足三陽經裏側屬足三陰經附骨疽生於大腿外側咬骨疽生於大腿裏側由體虛之人露卧風冷浴後乘涼寒濕侵襲或房慾之後蓋覆單薄寒邪乘虛入裏遂成斯疾初覺寒熱往來如同

感冒風邪隨後筋骨疼痛不熱不紅甚則痛如錐刺筋骨不能屈伸動轉經久陰極生陽寒鬱爲熱熱甚腐肉爲膿外形腫胖無頭皮色如常漸透紅亮一點內膿已成凡治此證初起寒熱往來覺痛時輕者卽服萬靈丹重者服五積散加牛膝紅花痛處用雷火鍼鍼之發汗散寒通行經絡膿成開之潰後餘治俱按潰瘍門又有漫腫疼痛發於尻臀部位

者宜服內托羌活湯又有發於腿之裏側近膝者屬足太陰脾足厥陰肝二經部位宜服內托黃耆湯又有發於腿外側者屬足少陽膽經部位宜服內托酒煎湯又有發於腿之正面者屬陽明胃經部位頭目昏眩嘔吐不食胸膈不利心煩熱悶者宜服茯苓佐經湯又有發於腿之裏側屬太陰脾經部位骨節焮痛四肢拘急自汗短氣小水不利手足浮腫者宜服附子六物湯又有發於腿之後面

屬足太陽膀胱經部位腿足攣痺關節重痛憎寒發熱無汗惡寒或兼惡風頭痛者宜服麻黃佐經湯又有三陰不足外邪過盛大腿通腫皮色不變疼痛日增不消不潰者此屬虛寒骨冷急服大防風湯補虛逐寒日久消之不應者勢欲作膿外用隔蒜片灸之起皰艾爆有聲為吉灸之無皰骨中不覺熱者屬逆灸後宜服十全大補湯加牛膝羌活防己或八珍湯加附子補托之膿成脹痛鍼之出黏白膿為順若出白漿水或豆汁者俱為敗漿終屬險候數證潰後內外治法亦俱按癰疽潰瘍門以上之證皆由沉寒痼冷中來外敷內服不可用苦寒損脾泄氣等藥犯之必至氣血冰凝內肉瘀腐日久化為污水不治之證也按準繩等書云傷寒汗後餘邪成流注流注之壞證成附骨疽夫汗後流注易愈惟失治乃為壞證不能復生似不能變成附骨疽況附骨疽係調治可愈之證若果數變

之後則壞而又壞矣又豈能復有成功乎是流注壞證變成附骨之說存而不論可也

雷火神鍼

蘄艾三錢　丁香五分

麝香二分

藥與艾揉和用夾紙一張將藥平鋪紙上用力實捲如指粗大收貯臨用以紙七層平放患處將鍼點著一頭對患向紙捺實待不痛方起鍼病甚者再鍼一次七日後火瘡大發

其功甚效

方歌 雷火神鍼攻寒濕附骨疽痛鍼之宜丁麝二
香共蘄艾燃鍼痛處功效奇

內托黃耆湯

黃耆鹽水拌炒　當歸
木瓜　連翹去心
柴胡各一錢　羌活
肉桂　生地
黃蘗各五分

酒水各一鍾煎一鍾空心熱服

方歌 內托黃耆歸木瓜羌柴翹桂地蘗加疽生膝
股肝脾位酒水煎之服最佳

內托酒煎湯

當歸　黃耆各一錢
柴胡一錢五分　大力子
連翹去心　肉桂各一錢
升麻　黃蘗
甘草各五分

酒水各一鍾煎一鍾食前服

方歌 內托酒煎寒濕凝腿外少陽附骨生歸耆大
力柴翹桂升蘗甘加酒水靈

茯苓佐經湯

白茯苓　蒼朮米泔水炒
陳皮　白朮土炒
半夏製各一錢　厚朴薑炒
木瓜　柴胡
藿香　澤瀉

葛根　甘草各五分

生薑三片水二鍾煎八分食前服

方歌 茯苓佐經足陽明腿面焮疼煩熱乘平胃木
瓜柴朮半藿瀉加葛引經

附子六物湯

附子　甘草各一錢
防己　白朮土炒
白茯苓各八分　桂枝五分

生薑三片水二鍾煎八分食遠服

方歌 附子六物風寒濕流注脾經須服之四肢拘急骨節痛防己朮甘苓桂枝

麻黃佐經湯

麻黃　蒼朮米泔水浸炒

防風　防已

羌活　白茯苓

葛根各一錢　桂心

甘草生　細辛各五分

生薑三片紅棗肉二枚水二鍾煎八分食前服

方歌 麻黃佐經足太陽風寒濕注本經傷蒼朮二防羌活桂苓甘細葛棗生薑

大防風湯

人參二錢　防風

白朮土炒　黃耆

牛膝　杜仲

當歸　熟地

白芍酒炒　川芎

羌活　甘草

附子製各一錢

生薑三片水二鍾煎八分食前服

方歌 大防風療寒邪傷附骨疽歷色如常參朮黃耆牛膝仲四物羌甘附子薑

萬靈丹方見腫瘍門

內托羌活湯方見臀部上馬癰

隔蒜灸法方見首卷灸法

十全大補湯

八珍湯俱見潰瘍門

五積散見內癰部臀癰

股陰疽圖

股陰疽

股陰疽發大股中，陰囊之側堅腫疼，七情不和憂憤致，潰後纏綿功難成。

註　此證一名赤施，發生於股內合縫下近陰囊之側，因偏在厥陰經，故名大股也。堅硬漫腫木痛，由七情不和，憂思憤鬱凝結而成。因在陰經，起長潰膿俱屬遲緩，潰後尤見纏綿，收斂成功者甚少。初起與附骨疽治法同，腫潰俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

橫痃疽圖



陰疽圖

橫痃疽　陰疽

橫痃疽左陰疽右股內合縫腫硬疼痛牽睾丸長蛤樣三陰七情鬱滯凝

注此二證俱生股內合縫摺紋間左爲橫痃疽右爲陰疽屬三陰經由七情鬱滯凝結而成漫腫堅硬時疼甚則痛牽睾丸上及少腹形長如蛤一兩月方能潰破其膿深可知破後膿稠可愈敗漿最難斂口久必成漏初治同附骨疽潰按癰疽潰瘍門若膿水淋漓日久有生蟲者形類蚘蟲亦係膿深鬱久之所化也屬逆

伏兔疽圖

伏兔疽在大腿正面用力肉高處兩腿同

伏兔疽

伏兔穴處忌生疽腫硬鍼灸不相宜疼痛徹心寒熱作胃火毒滯潰難醫

注經云伏兔不宜生癰蓋伏兔乃胃經穴道在膝蓋之上六寸正中用力大如掌一堆高肉處禁用鍼灸始發寒熱交作疼痛徹心由胃火毒滯而成潰後最難收斂初治同附骨疽潰按潰瘍門

股陽疽圖

股陽疽在髀外側髀尖骨之後左右同

環跳疽圖

環跳疽在環跳穴漫腫腰胯俱脹左右同

股陽疽　環跳疽

股陽疽生股外側內搏於骨不變色環跳疽腫腿難伸俱由風濕寒凝結

註股陽疽生於股外側髀尖之後其毒內搏骨節腫深至骨故漫腫不變色也環跳疽生胯骨節間之環跳穴所以腰難屈伸漫腫隱痛也此二證皆由風濕寒凝結而成屬足少陽膽經初起宜服黃狗下頦方更刺委中穴出黑血其腿即能轉動若漫腫大痛者俱宜服

內托黃耆湯痛而筋攣者萬靈丹汗之痛止換服神應養真丹徧身走注作痛兩腳面胖腫者亦服萬靈丹汗之痛止則宜服大防風湯倍加參朮歸耆等藥宣消之若時時跳痛將潰宜托裏透膿湯服之潰後膿清稀者宜十全大補湯加牛膝外以豆豉餅灸之瘡口紫陷者十全大補湯加附子服之外換附子餅灸之食少者胃弱也諸虛皆稟於脾胃宜香砂六君子湯減去砂仁加當歸服之俟胃

口強盛仍服十全大補湯潰而反痛者氣血虛也治宜峻補始終外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門但環跳疽潰破多成踵疾

黃狗下頦方

黃狗下頦連舌皮毛劈下入罐內鹽泥封固鐵盞蓋口煅一炷香覺烟清即止務宜存性取出色黑如灰爲度若帶白色其性已過則無用矣用時研極細末用下頦宜於居家已殺者製用若生取待殺恐反招不祥

豌豆粉　白斂末

三味各等分共和勻每服五錢溫黃酒空心

調服外以此藥用香油調敷患處服藥之後出臭汗及熟睡爲準

方歌　黃狗下頦連舌皮入罐泥封火煅宜豌豆粉研加白斂酒調將腿疽蠲

內托黃耆湯

大防風湯　俱見附骨疽

萬靈丹　見腫瘍門

神應養眞丹　見頭部油風

托裏透膿湯　見頭部侵腦疽

十全大補湯

香砂六君子湯　俱見潰瘍門

附子餅　見首卷灸法

肚門癰圖



肚門癰在大腿肚左右同

箕門癰圖

肚門癰　箕門癰

肚門癰在股肚生股內近膝箕門癰二證紅腫焮熱痛膀胱脾經濕熱成

註此二證俱屬濕熱凝結而成肚門癰生於大腿肚屬足太陽膀胱經箕門癰生於股內近膝屬足太陰脾經初起紅腫焮痛者宜服神授衛生湯若焮腫便秘煩躁飲冷脈數者熱淫於內也宜內疏黃連湯或雙解貴金丸下之若腫痛寒熱脈沉而無力胸腹脹滿飲食如常者宜服檳蘇散如腫痛寒熱已止即換服逍遙散若腫痛色不變寒熱食少體倦者由肝虛濕痰下注也宜補中益氣湯加茯苓半夏芍藥服之若思此入房腫硬二便不通者宜六味地黃丸加牛膝車前俟二便通利仍服補中益氣湯餘治按癰疽腫瘍潰瘍門

檳蘇散

檳榔　紫蘇

香附　木瓜

陳皮　大腹皮各一錢

羌活五分　木香三分

生薑三片葱白三寸水二鍾煎一鍾空心服

方歌 檳蘇腹脹氣不舒股內箕門癰可除香附木瓜陳大腹木香羌活檳榔蘇

神授衛生湯

內疏黃連湯

雙解貴金丸俱見腫瘍門

逍遙散見背部上搭手

補中益氣湯見潰瘍門

六味地黃丸見面部雀斑

腿遊風圖

腿遊風

腿遊風在遠腿生赤腫如雲焮熱疼榮衛風熱相搏滯宜砭出血雙解清

註此證兩腿裏外忽生赤腫形如堆雲焮熱疼痛由榮衛風熱相搏結滯而成凡遇此證先施砭石放出惡血隨服雙解通聖散次以當歸拈痛湯清解治之外貼牛肉片以拔風毒甚效

當歸拈痛湯

當歸　羌活

茵蔯蒿　蒼朮米泔水浸炒

防風各一錢　苦參

白朮土炒　升麻各七分

葛根　澤瀉

人參　知母

黃芩　豬苓

甘草各五分　黃蘗三分

水二鍾煎八分食前服

方歌 當歸拈痛腿遊風羌活人參二朮升茵蔯葛草苓知檗苦參風瀉共豬苓

雙解通聖散見肆部麻風

青腿牙疳圖

青腿牙疳

青腿牙疳何故生只緣上下不交通陽火炎熾陰寒閉凝結為毒此病成青腿如雲茄黑色疲頑腫硬履難行牙疳齦腫出臭血穿破腮唇腐黑凶

注 此證自古方書罕載其名僅傳雍正年間北路隨營醫官陶起麟頗得其詳畧云軍中凡病腿腫色青者其上必發牙疳凡病牙疳腐血者其下必發青腿二者相因而至推其原皆因上為陽火炎熾下為陰寒閉鬱以至陰陽上下不交各自為寒為熱各為凝結而生此證也相近內地間亦有之邊外雖亦有不甚多惟內地人初居邊外得此證者竟十居八九蓋中國之人本不耐邊外嚴寒更不免坐臥濕地故寒濕之痰生於下致腿青腫其病形如雲片色似茄黑肉體頑硬所以步履艱難也又緣邊外缺少五穀多食牛羊等肉其熱與濕合蒸瘀於胃毒火上薰致生牙疳牙齦腐腫出血若穿腮破唇腐爛色黑即為

危候邊外相傳僅有令服馬乳之法麟初到軍營診視青腿牙疳之證亦僅知投以馬乳閱歷既久因悟馬腦之力較馬乳爲效倍速令患者服之是夜即能發出大汗而諸病減矣蓋腦爲諸陽之首其性溫煖且能流通故耳兼服活絡流氣飲加味二妙湯宣其血氣通其經絡使毒不得凝結外用砭法令惡血流出以殺毒勢更以牛肉片貼敷以拔出積毒不數日而愈蓋黑血出則陰氣外泄陽氣

即隨陰氣而下降兩相交濟上下自安也由是習爲成法其中活者頗多因不敢自私著之於書以公於世並將所著應驗諸方傳詳於後

服馬乳法

治青腿牙疳用青白馬乳早午晚隨擠隨服甚效如無青白馬雜色馬亦可

服馬腦法

治青腿牙疳用馬腦子一個用竹刀挑去筋膜放在盤內先將馬腦攪勻再用滾黃酒沖服或一觔或半觔俱可倘一次不能服盡分作二次沖服亦可

活絡流氣飲 一名和中既濟湯

蒼朮　木瓜
羌活　附子生
山查肉　獨活
懷牛膝　麻黃各二錢
黃藥　烏藥

乾薑　檳榔
枳殼各一錢五分　甘草八分

黑豆四十九粒生薑三片水四鍾煎一鍾服渣水三鍾煎八分

如牙疳盛減去乾薑附子加胡黃連一錢龍膽草二錢

如牙痛輕而腿疼重加肉桂二錢

如寒熱已退減去羌活麻黃加威靈仙二錢五加皮二錢

方歌 活絡流氣去風强青腿牙疳初服良除濕清胃通經絡加減臨時莫執方蒼术木瓜羌附子山查獨膝藥麻黃烏藥乾薑檳枳草引加黑豆與生薑

加味二妙湯

黃蘗生 蒼术米泔浸炒
牛膝各三錢 檳榔
澤瀉 木瓜
烏藥各二錢 當歸尾一錢五分

黑豆四十九粒生薑三片水三鍾煎一鍾渣水二鍾半煎八分

方歌 加味二妙行步難青腿牙疳齦腫宜蘗蒼牛膝歸榔瀉木瓜烏藥豆薑煎

砭刺出血法

此方用三稜扁鍼形如錐挺者向腿之青黑處勿論穴道隨黑之大小鍼一分深或十鍼二十鍼俱可務令黑血流出外以牛肉割片貼鍼眼並黑處次日再看如黑處微退仍鍼仍貼如無牛肉當頂刺破用罐拔法

搽牙牛黃青黛散

牛黃 青黛各五分
硼砂二錢 硃砂
人中白煅 龍骨煅各一錢
冰片三分

共研細末先以甘草湯將口漱淨再上此藥

方歌 牛黃青黛散硼砂冰片硃砂中白加龍骨共研為細末牙疳腫腐此藥搽

一方用煮馬肉湯燙洗

一方用羊肝割片貼黑處

一方用芥菜子搗麪燒酒調敷黑腫處

青腿牙疳不治證

一形氣衰敗飲食不思者不治

一牙齒俱落紫黑流血腐潰穢臭者不治

一腿大腫腐爛或細乾枯者不治

膝癰圖

膝部

膝癰 疵疽

膝癰焮腫色紅疼，疵疽如癰色不紅，宣軟為順堅硬逆，脾腎肝經邪所乘。

註 膝癰生於膝蓋，色紅焮腫疼痛，屬氣血實；疵疽亦生在膝蓋，腫大如癰，其色不變，寒熱往來，屬氣血虛。宣軟為順，堅硬如石者為逆。經云：肉之小會為谿，谿者二肘二膝四腕也。凡脾病在谿，腎有邪其氣留於兩膝，凡筋病皆屬於節，筋乃肝之餘，故又屬肝。是以谿會有病，皆從脾腎肝三經邪氣乘之也。始終內外治法，俱按癰疽腫瘍潰瘍門。惟兩膝俱生屬敗證，不可治也。

膝眼風圖



膝眼風

膝眼風在鬼眼生疼痛如錐腫形下虛風濕寒侵襲屈伸不遂溫散靈

註 此證生於膝眼穴又名鬼眼穴在膝蓋之下左右兩骨空陷中由下焦素虛外邪易於侵襲先從膝眼隱隱作疼如風勝其痛則走注不定寒勝則痛如錐刺濕勝則外見腫屈不能伸其病在筋伸不能屈其病在骨動移不遂沉寒痼冷之候也惟在臨證宜詳辨之

初服萬靈丹溫散之其痛即止次服獨活寄生湯宜緩之效遲者兼用火鍼鍼膝眼穴此勢重難輕之法也單膝生者輕雙膝生者重若左膝方愈復病右膝右膝方愈復病左膝者名過膝風屬險治法同前

獨活寄生湯

獨活　桑寄生 如無真者以續斷代之

人參　茯苓

川芎 酒洗　防風

桂心　杜仲 薑汁炒去絲

牛膝　秦艽

細辛 各一錢五分　當歸 酒洗

白芍 酒炒　熟地

甘草 各一錢

生薑五片水二鍾煎七分食前服

方歌 獨活寄生肝腎虛寒濕注膝腫痛居參苓四物防風桂杜膝秦艽甘細宜

萬靈丹 見腫瘍門

鶴膝風圖

鶴膝風

鶴膝風腫生於膝上下枯細二陰虛風寒濕邪乘虛入痛寒攣風筋緩濕

注此證一名遊膝風一名鼓搥風痢後得者為痢風單生者輕雙生者最重因循日久膝腫粗大上下股胻枯細由足三陰經虛風寒濕邪乘虛而入為是病也膝內隱痛寒勝也筋急而攣風勝也筋緩無力濕勝也初腫如綿皮色不變亦無焮熱疼痛日增無論單雙俱

宜服五積散汗之次服萬靈丹溫散之外敷回陽玉龍膏常服換骨丹或蛜蝌丸以驅其邪若日久不消勢欲潰者宜服獨活寄生湯或大防風湯補而溫之痛甚加乳香潰後膿出白漿浮皮雖腐腫痛仍前不可用蝕藥只宜芙蓉葉菊花葉各五錢研末大麥米飯拌均貼之亦可止疼或用豆腐渣蒸熱捏作餅貼之亦可此證係外證中之敗證也收功甚難

換骨丹

蒼朮四兩　枸杞二兩五錢
茄根洗二兩　當歸
牛膝　敗龜板
防風　秦艽
獨活　萆薢
羌活　蠶沙
松節　虎骨酥炙各一兩

共用酒浸曬乾研為細末酒糊為丸如梧桐

子大每服三錢食前白滾水送下

方歌 換骨丹歸膝枸蒼龜板風艽獨萆羌蠶沙松節茄根虎鶴膝風生服最良

蛜蝌丸

蛜蝌即全蝎一箇生者　白芷
桂心　安息香
阿魏以上各用童便酒炒熱　威靈仙
白附子童便酒炒　當歸
羌活　桃仁童便酒炒

牛膝　北漏蘆

地骨皮　白芍各一兩酒炒

乳香　沒藥各七錢五分二味用童便酒炒

共研末煉蜜為丸桐子大每服三錢空心溫酒送下

方歌　蜘蛛丸治鶴膝風芷桂安息魏威靈白附歸羌桃乳沒膝蒲骨皮芍蜜成

五積散見內癰部腎癰

大防風湯見股部附骨疽

萬靈丹

回陽玉龍膏俱見腫瘍門

獨活寄生湯見本部膝眼風

下石疽

下石疽

下石疽在膝上生堅硬如石牽筋疼皮色如常難潰斂證出血滯外寒凝

註此證生於膝間無論膝蓋及左右俱可以生堅硬如石牽筋疼痛腫如鷄卵皮色不變並無焮熱難消難潰既潰難斂最屬疲頑由身虛寒邪深襲致令血瘀凝結而成腫潰內外治法俱與中石疽參考但此證腫潰俱涼若涼化為熱見諸善證者始吉仍見惡證者難

疰

緩疽圖

緩疽

緩疽血滯外寒凝　腫硬如饅膝上生
紫黯潰遲多焮熱　腫久漸腐爛皮疼

註 此證由外寒深襲血瘀凝滯而成生於兩膝上或生於膝兩旁腫硬如饅木痛日增其色紫黯積日不潰證之情形與下石疽相似惟多焮熱腫久則腐爛肌肉皮膚初服當歸拈痛湯以宣通濕熱次按中石疽治法內宜溫補外宜灸法虛甚者十全大補湯相兼治之

當歸拈痛湯 見股部腿遊風

十全大補湯 見潰瘍門

委中毒圖

委中毒

委中毒在膕紋生屈伸木硬微腫紅膕熱流入膀胱過速宜活血刺委中

註此證生委中穴穴在膝後膕中央約紋動脈陷中即是約紋者摺紋也又名血郄穴屬膀胱經俗名腿凹經曰膕中由膽經積熱流入膀胱壅遏不行而成木硬腫痛微紅屈伸艱難治宜速用活血散瘀湯逐下惡血為效緩則筋縮而成廢疾諸書皆云兼刺委中穴出

血自消然刺穴必兼有腰痛不能轉移者方可刺之即出血亦不可過多多則令人身撲面見脫色其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門亦有焮痛色赤潰速者由濕熱凝結所致治法亦按腫瘍潰瘍門

活血散瘀湯

當歸尾　赤芍

桃仁去皮尖　大黃酒炒各二錢

川芎　蘇木各一錢五分

丹皮　枳殼麩炒

栝蔞仁各一錢　檳榔六分

水二鍾煎八分空心服渣再煎服

方歌活血散瘀委中毒皆因積熱壅其處歸芍丹皮桃枳榔栝蔞大黃芎蘇木

上水魚圖

上水魚

上水魚生委中旁，摺紋兩稍疼埂昂，長若魚形焮熱結，外施砭血敷二黃。

註 此證生委中摺紋兩稍，腫如高埂，長若魚形，色紫作痛。由血熱遇外寒，稽留則血瘀凝結而成。外用砭法，向腫埂上砭出惡血，兼用二黃散香油調敷甚效。

二黃散（即頭部佛顯俗散，見鼻部肺風粉刺）

人面瘡圖

人面瘡

膝肘瘡生如人面，自古傳來係孽因，流氣苦參敷貝母，從善改惡自然心。

註 此證自古傳來，乃奇病也。多生兩膝，或生兩肘，腫類人形，眉目口鼻皆具。本事方云：瘡口能飲食，施治諸藥絕無所苦，惟敷貝母，其瘡皺眉閉口。自此日用貝母末和水敷灌，數日瘡消結痂而愈。又諸書皆以爲素積冤譴，須自清心懺悔，初宜服流氣飲，日久宜用大苦

參丸今據所用之藥俱係辛熱疎散之品其
證或因風寒濕三氣凝合之所化亦未必盡
由宛遺所致也依古施治庶可奏效

大苦參丸

苦參二兩　蔓荆子

赤茯苓　山藥

白芷　荆芥

防風　白附子

川芎　山梔生

何首烏　白蒺藜

皂角　川烏炮

黃耆　赤芍

獨活　羌活各五錢

草烏炮一錢五分

右爲細末麵糊和丸如梧桐子大每服五七

十丸空心黃酒送下不飲酒者以茶代之

方歌大苦參丸人面瘡蔓苓山藥芷荆防白附芎

梔何蒺皂川草烏耆芍獨羌

流氣飲方見背部疾注發

御纂醫宗金鑑卷七十一

編輯外科心法要訣目錄

脛部

三里發

腓腨發

黄鰍癰

青蛇毒

接骨發

附陰疽

內踝疽

外踝疽

穿踝疽

濕毒流注附瓜藤纏

腎氣遊風

臁瘡

鱔漏

四彎風

風疽

足部

足發背

湧泉疽

脫疽

敦疽

甲疽

足跟疽

厲癰

四淫

臭田螺

牛程蹇

土栗

冷疔

脚氣瘡

田螺皰

肉刺

編輯外科心法要訣

三里發圖

三里發生膝眼下三寸初起如牛眼其色青黑左右皆同

脛部

三里發

三里發腫牛眼形膝眼之下冷痛凝勞力傷筋兼胃熱腫色青黑紫血膿

註　此證生膝眼下三寸外側前廉兩筋間初腫形如牛眼拘急冷疼由勞力傷筋胃熱凝結而成漸增腫痛其色青黑潰出紫血次出稀膿內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

腓腨發圖



腓腨發生腿肚正中左右皆同

腓腨發

腓腨發在小腿肚憎寒煩躁積熱成焮腫痛潰膿血吉漫腫平塌清水凶

註　此證發於腓腨即小腿肚也由腎水不足膀胱積熱凝結而成古方云不治若焮赤高腫疼痛潰出正膿而兼血者吉爲順或漫腫平塌紫暗痠痛潰出清水者凶爲逆初服仙方活命飲潰服八珍湯氣血虛者服十全大補湯下虛者以桂附地黃丸補之外治法同癰

疽潰瘍門

仙方活命飲 見腫瘍門

八珍湯

十全大補湯 俱見潰瘍門

桂附地黃丸 見面部頰瘍

黃鰍癰圖

黃鰍癰

黃鰍癰生腿肚旁疼痛硬腫若鰍長肝脾濕熱發紅色順出稠膿逆敗漿

註 此證生於小腿肚裏側疼痛硬腫長有數寸形如泥鰍其色微紅由肝脾二經濕熱凝結而成應期潰破出稠膿者爲順若出污水敗漿者屬逆初服五香流氣飲其次內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

五香流氣飲

金銀花二兩 小茴香

殭蠶炒 羌活

獨活 連翹去心

栝蔞仁各三錢 藿香五錢

丁香一錢 木香

沉香 甘草各一錢

分爲十劑水煎隨病上下服

方歌 五香流氣治黃鰍流注結核也能瘳丁木茴沉殭藿草銀花羌獨翹栝蔞

青蛇毒圖

青蛇毒

青蛇毒生腿肚下形長三寸紫塊硬腎與膀胱濕熱結急鍼蛇頭血出良

【註】此證又名青蛇便生於小腿肚之下形長二三寸結腫紫塊堅硬憎寒壯熱大痛不食由腎經素虛膀胱濕熱下注而成蛇頭向下者毒輕而淺急刺蛇頭一半寸出紫黑血隨鍼孔搽拔疔散外敷離宮錠內服仙方活命飲加黃蘗牛膝木瓜亦有蛇頭向上者毒深而

惡急刺蛇頭一二寸出紫黑血鍼孔用白降丹細條插入五六分外貼巴膏餘腫敷太乙紫金錠內服麥靈丹俟毒消退亦服仙方活命飲調和之若毒入腹嘔吐腹脹神昏脈躁俱爲逆證

拔疔散（見齒部牙疔）

離宮錠

仙方活命飲

麥靈丹（俱見腫瘍門）

白降丹

巴膏（俱見潰瘍門）

太乙紫金錠（見胸部脾發疽）

接　骨　發　圖

接骨發生腿肚之下足後跟接骨相對處硬腫如物打磕之狀兩足皆同

接骨發

接骨發如核桃形腿肚之下硬脹疼色紅漫腫宜
速潰遲損筋蝕跌蹶行

注　此證生於腿肚之下接骨之上脛骨與足後
跟骨相接處故名接骨發屬膀胱經濕熱凝
結而成初如核桃其硬如物打磕磞之狀急
脹微疼色紅漫腫膿宜速潰遲則膿毒損筋
筋蝕既傷腿跌蹶行蹶行者不能全足踐地
惟恃足指着力而行也始終內外治法俱按

癰疽潰瘍門

附　陰　疽　圖

附陰疽生內踝之上三寸紅腫如雞卵左右皆同

附陰疽

附陰疽發內踝上初如紅粟日增疼堅硬赤腫漸
如卵三陰交會濕熱凝

註 此證生於內踝骨之上三寸初如紅粟疼痛日增堅硬赤腫漸如鷄卵係三陰交會濕熱積聚而成始終內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門但三陰交係純陰之穴收斂遲緩調養不可不愼

內踝疽外踝疽圖

內踝疽　外踝疽

內外踝疽濕寒成血澁氣滯阻於經三陽外側三
陰裏初用宣通蒜灸靈

註 此二證生兩足踝近腕之處在內踝者名走緩又名鞋帶疽在外踝者名脚拐毒蓋內踝骨屬三陰經脈絡也外踝骨屬三陽經脈絡也俱由濕寒下注血澁氣阻而成其堅硬漫腫皮色不變時時隱痛難於行立者初服瘡科流氣飲加牛膝木瓜防己以宣通之外用蒜片灸法以消之發三陰經者服內托黃耆湯發三陽經者服內托羌活湯若虛弱將欲作膿跳痛無時者俱服十全大補湯外敷烏龍膏其腫潰治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

瘡科流氣飲（見股部咬骨疽）

內托黃耆湯（見股部附骨疽）

內托羌活湯（見臀部上馬癰）

十全大補湯（見潰瘍門）

烏龍膏（見腫瘍門）

穿踝疽圖

穿踝疽

穿踝疽由脾濕寒裏發串外踝骨間有頭屬陽陰悶腫潰出清水廢疾纏

【註】此證由脾經濕寒下注血澀氣阻而成先從裏踝骨發起串及外踝致令裏外通腫以有頭為陽易破若惟悶腫無頭為陰難潰其證初起寒熱往來有紅暈兼有熱也宜服荊防敗毒散皮色不變者服萬靈丹其餘腫潰治法俱同內外二踝疽若潰出清水或投方不應經絡日久者必成廢疾難治

荊防敗毒散（見項部腦疽）

萬靈丹（見腫瘍門）

濕毒流注圖

濕毒流注 附瓜藤纏

濕毒流注腿脛生，頂如牛眼漫腫形，紫輕黑重膿水漬，寒濕暑熱在腠凝。

注此證生於腿脛，流行不定，或發一二處，瘡頂形似牛眼，根脚漫腫，輕則色紫，重則色黑，潰破膿水浸漬好肉，破爛日久不斂。由暴風疾雨、寒濕暑火侵在腠理，而肌肉爲病也。初覺急服防風通聖散加木瓜、牛膝、防已、蒼朮消之。若腿脛至晚發熱者，宜服當歸拈痛湯加牛膝。外治初搽三妙散，腫痛全消，換搽輕粉散斂之即効。若遶脛而發，即名瓜藤纏，結核數枚，日久腫痛，腐爛不已，亦屬濕熱下注而成，治法同前。

輕粉散

輕粉一錢五分　黄丹
黄蘗　密陀僧
高末茶　乳香各三錢
麝香五分

共研末，先用葱熬湯洗患處，再搽此藥。

方歌　輕粉黄丹蘗陀僧，末茶乳麝共研成，濕毒流注臁瘡證，化腐除濕又止疼。

防風通聖散 見頭部禿瘡

當歸拈痛湯 見股部腿遊風

三妙散 見腹部臍癰

腎氣遊風圖



腎氣遊風

腎氣遊風腿肚生，紅腫如雲火烘疼，證由腎火蘊於內，膀胱氣滯外受風。

注：此證多生於腎虛之人，腿肚紅腫，形如雲片，遊走不定，痛如火烘。由腎火內蘊，外受風邪，膀胱氣滯而成也。初服紫蘇流氣飲，次服檳榔丸，外用豆腐研調黃蘗末貼敷之，甚效。

紫蘇流氣飲

紫蘇　黃蘗
木瓜　檳榔
香附　陳皮
川芎　厚朴 薑炒
白芷　蒼朮 米泔水浸炒
烏藥　荊芥
防風　甘草
獨活　枳殼 麩炒

等分，薑三片，棗一枚，水煎服。

方歌：紫蘇流氣蘗瓜榔，香附陳芎厚芷蒼，烏藥荊防甘獨枳，腎氣遊風服最良。

檳榔丸

檳榔　枳殼 麩炒，各二兩
木瓜 一兩五錢　木香 一兩
大黃 四兩

共研細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心白滾湯送下，黃酒送下亦可。

方歌：檳榔枳殼木瓜研，木香大黃煉蜜丸，腎氣遊風紅腫痛，空心水送自然痊。

膝瘡圖

膝瘡生兩腿膝之裏外廉骨

臁瘡

臁瘡當分內外廉外廉易治內難痊外屬三陽濕熱結內屬三陰虛熱纏法宜搜風除濕熱外貼三香夾紙餞

註此證生在兩脛內外廉骨外廉屬足三陽經濕熱結聚早治易於見效內廉屬三陰有濕兼血分虛熱而成更兼臁骨皮肉淺薄難得見效極其綿纏初發先癢後痛紅腫成片破津紫水新起宜貼三香膏色紫貼夾紙膏日

久潰色紫黑貼解毒紫金膏又年久頑臁瘡皮烏黑下陷臭穢不堪者用蜈蚣餞法去風毒化瘀腐蓋貼黃蠟膏漸效初服黃耆丸日久者服四生丸下元虛冷者宜虎潛丸常服甚效但腿脛在至陰之下生瘡者當戒勞動發物其證可愈否則難痊

三香膏

輕粉　乳香

松香各等分

共為末香油調稠用夾紙一面以鍼密刺細孔將藥夾搽紙內先以葱湯洗淨患處將藥紙有鍼孔一面對瘡貼之三日一換

方歌三香輕粉乳松香研末油調紙內藏葱湯洗患方貼藥初起臁瘡用此良

夾紙膏

黃丹炒　輕粉

兒茶　没藥

雄黃　血竭

五倍子炒　銀朱

枯礬各等分

共為末量瘡大小剪油紙二張夾藥於內紙周圍用麵糊粘住紙上用鍼刺孔先將瘡口用葱椒煎湯洗淨拭乾然後貼上以帛縛之三日一洗再換新藥貼之

方歌夾紙膏貼臁瘡破黃丹輕粉兒茶没雄黃竭倍銀朱礬油紙夾貼腐可脫

解毒紫金膏

明淨松香　皂礬各一斤煅赤

共研極細末香油調稠先用葱艾甘草煎湯洗淨患處再搽此藥油紙蓋住以軟布紮緊三日一換此藥又治楊梅結毒腐爛作臭膿水淋漓用之甚效

方歌　解毒紫金臁瘡爛明淨松香皂礬煅二味研末香油調葱艾草湯先洗患

蜈蚣餞

蜈蚣　甘草

獨活　白芷各一錢

桐油二兩將藥煎滾先以米泔水洗淨臁瘡水和白麪作圈圍在瘡之四邊勿令洩氣將腿放平以茶匙挑油漸漸乘熱加滿待油溫取下已後風毒自散腐肉漸脫其功甚速

方歌　蜈蚣餞治久臁瘡皮黑下陷臭難當桐油煎草獨活芷白麪圈瘡油熨强

黃蠟膏

血竭　赤石脂煅

龍骨煅各二錢

共爲細末香油一兩入血餘栗子大一團煠枯去渣再入黃蠟一兩白膠香三錢溶化盡離火下血竭等末攪勻候冷磁罐盛之用時捏作薄片貼瘡上絹帛縛定三日後翻過貼之

方歌　黃蠟血餘竭白膠石脂龍骨入油同蜈蚣餞後此膏蓋肌肉能生痛自消

黃耆丸

黃耆　川烏頭炮去皮臍

赤小豆　蒺藜炒去刺

地龍去土炒　川楝子鹽水炒去核

茴香炒　防風各一兩

烏藥五錢

右爲細末酒煮麪糊爲丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒送下鹽湯亦可婦人用醋煎滾候溫送下

方歌　黃耆丸治臁瘡起川烏赤豆共蒺藜地龍川

楝茴香炒防風烏藥酒糊丸

四生丸

地龍去土炒　白附子

殭蠶炒　草烏去皮尖泡

五靈脂各等分

右爲細末米糊爲丸如梧桐子大每服三四十丸食前茶酒任下

方歌 四生臁瘡久纏綿骨節多疼舉動難地龍白附殭蠶炒草烏靈脂米糊丸

虎潛丸

敗龜板四兩酥炙　知母

黃蘗二味鹽酒炒　熟地各三兩

牛膝　白芍酒炒

陳皮鹽水潤各二兩　瑣陽酒潤

當歸酒洗各一兩五錢　虎脛骨酥炙一兩

共研末羯羊肉酒煮爛搗膏和入藥末內爲丸如梧桐子大每服三錢空心淡鹽湯送下

冬月加乾薑一兩

方歌 虎潛丸療筋骨痿下元虛冷精血虧龜板瑣陽膝虎脛知蘗芍陳熟地歸

鱔漏圖

鱔漏

鱔漏生在腿肚間孔如鑽眼津水綿綿頗類濕瘡濕熱發艾湯薰洗覺癢疼

注此證由濕熱而成初起頗類濕瘡生於腿肚癢痛相兼破津黃水綿綿不已其孔深如鑽眼復受寒氣侵入瘡孔以致口寒肌冷法宜艾葉老葱熬湯每日先薰後洗瘡口發熱覺癢時即貼黃蠟膏收斂而愈

黃蠟膏見臁瘡

四彎風圖

四彎風

四彎風生腿腳彎每月一發最纏綿形如風癬風邪襲搔破成瘡癢難堪

注此證生在兩腿彎腳彎每月一發形如風癬屬風邪襲入腠理而成其癢無度搔破津水形如濕癬法宜大麥一升熬湯先薰後洗次搽三妙散滲濕殺蟲其癢即止緩緩取效

三妙散見臍部臍癰

風疽圖

風疽

風疽生脛曲凹中癢搔皮損津汁濃風邪留於血脈內煩熱昏冒肌腫痛

註 此證生脛骨及曲凹之處癢搔皮損津黃汁極其黏濃由風邪留於血脈相搏而成因其根深故有疽名甚則身體煩熱昏冒而肌肉透紅更增腫疼宜服防風湯外抹青竹大豆油卽效

防風湯

防風　附子製

麻黃蜜炙　白芷

木通　柴胡

當歸酒　桔梗

甘草炙　羌活各五分

共爲粗末水一鍾半煎八分澄去滓食後服臨睡再用一服如欲出汗俟空心頭煎落滓併一服之後食稀粥生薑食畢被覆臥取汗避風

方歌 防風湯療風熱搏留於血脈津汁破附子麻黃芷木通柴胡歸桔甘羌活

青竹大豆油

青竹筒截三尺長徑一寸半筒內裝黑豆一升以穀糠馬糞二物燒火當竹筒中炙之以磁盤兩頭接取油汁先以清米泔水和鹽熱洗患處拭乾卽塗豆油不過三度極效

方歌 青竹筒截三尺長徑要寸半黑豆裝穀糠馬糞燒炙筒風疽搔癢油塗良

足發背圖

足部

足發背

足發背屬膽胃經七情六淫下注成詳别善惡分順逆細辨疽癰定死生

註此證一名足跗發凡足背雖行三陽而偏在膽胃二經居多證由七情內鬱或兼六淫外傷而成經云三背不宜生瘡惟足背多筋多骨肉少皮薄又在至陰之下發瘡疽者升發遲慢所以謂為險候也宜别五善七惡而分順逆發背者大瘡之通名也須當細辨或疽或癰順逆既分則生死定焉初宜服仙方活命飲及隔蒜灸之令瘡速潰餘與腫瘍潰瘍門治同

仙方活命飲見腫瘍門

隔蒜灸法見首卷灸法

湧泉疽圖

湧泉疽

湧泉疽發在足心腎虛濕滯多屬陰速破潰淺癰可治黑陷為疽命難存

註 此證生在足心湧泉穴一名足心發又名穿窩天蛇俗名病穿板屬足少陰腎經虛損兼濕熱下注而成若十四日內即潰膿淺為癰猶可調治初服仙方活命飲外用神燈照法虛甚膿生遲者十全大補湯潰後兼用桂附地黃丸服之餘治按癰疽腫瘍潰瘍門若黑陷不疼二十一日之內不潰膿者為疽屬

陰敗之證難救

仙方活命飲 見腫瘍門

神燈照法 見首卷

十全大補湯 見潰瘍門

桂附地黃丸 見面部頰瘍

脫疽圖

脫疽

脫疽多生足指間黃皰如粟黑爛延腎竭血枯五敗證割切仿黑定湧泉

註 此證多生足指之間手指生者間或有之蓋手足十指乃藏府枝幹未發疽之先煩躁發熱頗類消渴日久始發此患初生如粟黃皰一點皮色紫暗猶如煮熟紅棗黑氣侵漫腐爛延開五指相傳甚則攻於腳面痛如湯潑火燃其臭氣雖異香難解由膏粱藥酒及房

術丹石熱藥以致陽精煽惑淫火猖狂蘊蓄於臟府消爍陰液而成斯時血死心敗皮死肺敗筋死肝敗肉死脾敗骨死腎敗此五敗證難遇靈丹亦難獲效初起宜服解毒濟生湯外用大麥米煮飯拌芙蓉葉菊花葉各五錢貼之止痛消之不應者必施割法須患者情愿將死生付於度外遵古法毒在肉則割毒在骨則切然割切之法須宜早施乘其未及延散時用頭髮十餘根緊纏患指本節盡

處逺紮十餘轉毋令毒氣攻延好肉隨用蟾酥餅放於初起黃皰頂上加艾灸之至肉枯瘡死為度次日病指盡黑方用利刀尋至本節縫中將患指徐順取下血流不止者用如聖金刀散止之餘腫以離宮錠塗之次日倘有黑氣未盡單用蟾酥餅研末撒之用陀僧膏蓋貼黑氣自退患上生膿兼貼生肌玉紅膏及生肌等藥肌生護骨斂口此為吉兆內宜滋腎水養氣血健脾安神之劑如陰陽二氣丹清神散金液戊土丹俱可服之若內外始終無變證十中可保三四若割切之後復生黑氣過節侵漫好肉疼痛尤甚者屬逆此證初起不痛者宜雌雄霹靂火灸之其餘滋補燙洗等法俱按癰疽腫瘍潰瘍門按諸書論脫疽單生於足大指而別指生者俱名敦疽此非確論然脫疽偏生於屬陰經之指者居多屢經如此後之學者宜詳審焉可也

解毒濟生湯

當歸　遠志去心
川芎　花粉
柴胡　黃芩
犀角鎊　麥冬去心
知母　黃蘗
茯神　金銀花各一錢
紅花　牛膝
甘草生各五分

水二鍾煎八分入童便一杯食前服

如生手指斷去牛膝加升麻
方歌 解毒濟生歸遠芎花粉柴芩犀麥冬知蘗茯
銀紅膝草脫疽初起煩熱攻
如聖金刀散
松香七兩 生白礬
枯白礬各一兩五錢
共研極細末磁罐收貯臨用時撒於患處
方歌 如聖金刀散刀傷血流不止撒之良白礬枯
礬松香等共研為末罐收藏

陰陽二氣丹
天門冬去心 麥門冬去心
元參湯泡去粗皮以上三味各搗膏
五味子炒 人中白生
黃蘗各一兩 甘草生
澤瀉 枯白礬
青黛各三錢 冰片一錢
各研細末同天門冬等膏加煉蜜少許再搗
千餘下頓硬得中丸如梧桐子大硃砂為衣
每服六十丸童便人乳各一酒鍾空心送下
安睡一時
方歌 陰陽二氣丹脫疽腎水枯乾燥熱欺天麥元
參甘瀉味中白冰礬蘗黛宜
清神散
綠豆粉一兩 牛黃三分
甘草節五錢 冰片五分
硃砂三錢
右共為極細末每服一錢淡竹葉燈心煎湯
調服
方歌 清神散治脫疽發悶亂心煩調服住豆粉牛
黃甘草節研加冰片共硃砂

金液戊土丹
茯神 胡黃連
烏梅肉 人中黃
五味子各一兩 硃砂
雄黃 消石
遠志去心 石菖蒲各三錢

牛黃　冰片各一錢

各研細末共和一處再研千轉於端午七夕或春秋二分冬夏二至吉辰在淨室中先將烏梅肉搗膏和入藥末內加煉蜜少許搗千餘下頓硬得中為丸每丸重一錢金箔為衣每服一丸人乳童便各一酒鍾隨病上下化服修和之時服藥之際忌婦人僧尼孝服雞犬等見之此藥用蠟封固收藏不洩藥味愈久愈效

方歌　金液戊土茯牛黃硃雄消遠片石菖胡連梅肉中黃味嵩治脫疽發背瘡

雌雄霹靂火

雌黃　雄黃

丁香各二錢　麝香一分

右為細末用蘄艾茸二錢將藥末搓入艾內作豌豆大丸安患上灸之毋論痛癢以肉焦為度如毒已經走散就紅暈盡處排炷灸之痛則至癢癢則至痛以瘀紅活為妙

方歌　霹靂火治陰疽方脫疽不疼灸更強雌黃丁麝雄黃末蘄艾茸搓藥末良

蟾酥餅　即蟾酥丸作餅見疔瘡門

離宮錠　見腫瘍門

陀僧膏

生肌玉紅膏　俱見潰瘍門

敦疽圖

敦疽生足指色紅十指同

敦疽

敦疽多生足指疼腫色紅活出血膿血燥精竭無敗色膏粱房勞脾腎經

註此證多生於足指而手指亦間有生者由膏粱太過則損脾房勞太過則傷腎脾既損則血生少腎旣傷則精必竭更兼濕熱壅盛而成初起黃粟小皰痛如湯潑火燃其色紅活腫無黑暈潰破有膿腐無敗色此屬血疏未死之候然此證雖無敗色亦由臟腑發出未

可視爲小毒也法宜急服滋陰救燥補血理脾之藥初服解毒濟生湯六味地黃湯潰服人參養榮湯桂附地黃湯外初宜蝌蚪拔毒散塗之將潰貼蟾酥餅兼貼巴膏潰腐之後換搽生肌玉紅膏生肌斂口初終禁用灸法患者宜淸心寡慾調理庶免變證

解毒濟生湯 見脫疽

六味地黃湯 見面部雀斑

桂附地黃湯 見面部頰瘍

人參養榮湯

巴膏

生肌玉紅膏 俱見潰瘍門

蝌蚪拔毒散 見腫瘍門

蟾酥餅 即蟾酥丸作餅見疔瘡門

甲疽圖

甲疽生足指甲旁努肉高突色紅十指同

甲疽

甲疽多因剔甲傷甲長侵肉破成瘡努肉高突痛
難忍消淤化努效非常

注此證因割嵌指甲傷肉或剔甲傷肉或甲長侵肉穿窄小靴鞋以致甲旁焮腫破爛時津黃水努肉高突疼痛難忍不能著衣原係好肉受傷宜用鹽湯浸洗外敷華陀累效散白膏藥蓋貼努肉消盡即愈

華陀累效散

乳香 硇砂各一錢
輕粉五分 橄欖核三枚燒存性
黃丹三分

共研細末香油調敷

方歌 華陀累效敷嵌甲黃丹輕粉乳硇砂橄欖核燒同碾細香油調濃患處搽

白膏藥見潰瘍門

足跟疽圖

足跟疽

足跟疽生腳挛根狀如兔咬紫紅焮陽蹺積熱潰
難斂初宜隔蒜艾灸勤

注此證生足跟俗名腳挛根由臟腑積熱汗出涉水遠行傷筋而成初腫紅紫疼痛潰破膿水淋瀝狀如兔咬經云兔齧狀如赤豆至骨急治遲則害人蓋謂毒之深惡也屬足太陽膀胱經穴名申脈即陽蹺脈發源之所又係腎經所過之路瘡口久潰不合陽蹺脈氣不

能冲發腎氣由此漏洩以致患者益虛初起
宜隔蒜片灸之服仙方活命飲加肉桂牛膝
潰後宜補中益氣湯人參養榮湯桂附地黃
丸隨證補治之餘按癰疽潰瘍門海藏云
兇豁久不收斂用鹽湯洗之白朮研末撒之
兩日一易謹戒一切勞碌即效

隔蒜灸法 見首卷灸法

仙方活命飲 見腫瘍門

補中益氣湯

人參養榮湯 俱見潰瘍門

桂附地黃丸 見面部頰瘍

腨癰圖

腨癰生足肘兩旁，如[illegible]栗在右[illegible]

四淫圖

四淫生足肘之前上下其大如癰左右同

厲癰 四淫

厲癰勢小足旁生四淫在足上下發三陰虧損爲疽重三陽濕熱發癰輕

註靈樞云發於足上下名曰四淫其狀大癰急治之百日死發於足旁名曰厲癰其狀不大急治之去其黑者不消輒益不治百日死此二證俱由足三陰經虧損爲疽者重若兼足三陽經濕熱下注而成癰者輕若紅腫疼痛潰破有膿腐脫無黑氣浸漫屬濕熱偏盛順證易治若微紅微腫潰出膿水屬陰氣凝結不能化膿險證難治若黑暗漫腫痛不消膿煩熱作渴小水淋瀝爲陰敗惡證屬逆四淫無邊沿厲癰類敦疽初俱宜仙方活命飲外宜隔蒜灸以宣壅毒將潰宜服人參養榮湯兼六味地黃丸以滋補之若色黯不痛即用桑柴烘法以行壅滯助陽氣更宜十全大補湯兼桂附地黃丸壯脾滋水治之或可成功若妄用苦寒尅伐之藥多致不救外治法同敦疽

仙方活命飲見腫瘍門

隔蒜灸法見首卷灸法

人參養榮湯

十全大補湯俱見潰瘍門

六味地黃丸見面部雀斑

桑柴烘法見首卷

桂附地黃丸見面部頰瘍

臭田螺圖

臭田螺

臭田螺瘡最纏綿脚丫搔癢起白斑搓破皮爛腥水臭治宜清熱滲濕痊

註 此證由胃經濕熱下注而生脚丫破爛其患甚小其癢搓之不能解必搓至皮爛津腥臭水覺疼時其癢方止次日仍癢經年不愈極其纏綿法宜甘草薏苡仁煎湯洗之嚼細茶葉塗之乾則黃連膏潤之破爛甚者宜用鵞掌皮煅存性研末香油調敷甚效

黃連膏 見鼻部鼻瘡

牛程蹇圖

牛程蹇生脚底皮起硬埂色黃不能着地左右

牛程蹇

牛程蹇因奔走急脚熱着水寒風襲氣滯血凝起硬埂法宜鴿糞滾湯漬

註 此證生於足跟及足掌皮內頑硬腫起高埂色黃疼痛不能行履由脚熱着冷水或遇寒風襲於血脈令氣滯血凝而成法宜用盆一筒內安新磚磚上安鴿糞糞上合鼻篩以脚踏篩上次以滾水從旁冲入蒸之浸漬之冷則易之或用新磚燒紅韭菜汁潑之將病

足踏於其上發之早治或有消者久則破裂膿水津流每日米泔水淨洗搽牛角散四圍須皮浮起剪之換搽生肌玉紅膏月白珍珠散生肌斂口自愈

牛角散

松香　輕粉

水龍骨即舊船底油石灰　牛角尖燒灰

共爲末牛骨髓調搽

方歌 牛角散治牛程蹇久破膿水流不痊松香輕粉水龍骨牛角燒灰須用尖

生肌玉紅膏

月白珍珠散 俱見潰瘍門

土栗圖

土栗

土栗生在足跟旁腫若琉璃亮色黄行路崎嶇傷筋骨急服仙方合五香

註 此證又名琉璃疽生在足跟之旁形如棗栗亮而色黄腫若琉璃由行崎嶇之路勞傷筋骨血脈而成急服五香湯及仙方活命飲宣通壅滯膿熟鍼之膿少而多水者以陀僧膏貼之餘按潰瘍治法

五香湯

乳香　藿香

丁香　沉香

青木香各二錢半

水二鍾煎八分服之

方歌　五香湯善治士栗行路勞傷血瘀積乳藿丁沉青木香煎服舒壅功效極

仙方活命飲見腫瘍門

陀僧膏見潰瘍門

冷疔圖

冷疔

冷疔濕寒足跟生疼痛徹骨紫皰形黑爛深孔流血水氣穢神燈照法靈

註　此證生在足跟由濕寒凝結而成形如棗栗起紫白皰疼痛徹骨漸生黑氣腐爛孔深時流血水氣穢經久不歛者宜神燈照法照之鐵粉散敷之初服內補十宣散次按潰瘍治同

鐵粉散

生鐵粉用鐵砂一兩用黑鉛四兩鐵杓化開傾水中令冷定取出再化再傾以鉛化盡為度去水取末三錢

黃丹飛　輕粉

松香各一錢　麝香一分

各研細末共和一處再研勻將患處以葱湯洗去血水腐臭香油調摻於患上油紙蓋之紥之

方歌　鐵粉散醫足冷疔能蝕黑腐興肉生黃丹輕粉松香麝香油調摻紙蓋靈

神燈照法見首卷

內補十宣散見胸部瘭疽

腳氣瘡圖

腳氣瘡生膝之下足之上腿脛腫出黃水結黃痂左右同

腳氣瘡

腳氣瘡在足膝生　濕熱相搏風氣乘　壯熱腫痛津黃水　心神煩躁犀角靈

註　此證生於足膝，由濕熱內搏，滯於膚腠，外爲風乘，不得宣通，故令腳膝生瘡，癢痛作腫，破津黃水，形類黃水瘡，惟身體壯熱，心神煩躁，經久難瘥，宜服犀角散，外以漏蘆湯洗之，兼敷龍骨散甚效。

犀角散

犀角屑　天麻　黃耆　枳殼麩炒　白鮮皮　黃芩　防風　羌活　白朮土炒以上各七錢五分　檳榔一兩　烏梢蛇酒浸二兩　甘草炙五錢

右研粗末，每服八錢，水一鍾半，生薑五片，煎一鍾，去渣，不拘時溫服。

方歌　犀角散醫腳氣瘡　天麻耆枳白鮮榔　烏蛇芩

草風羌活蒺藜粗末引加蔥

漏蘆湯

漏蘆　甘草生

槐白皮　五加皮

白斂各一兩五錢　白蒺藜四兩

共為粗末每用五兩水八盌煎五盌去渣淋洗

方歌　漏蘆湯甘槐白皮五加白斂白蒺藜腳氣瘡疼癢津水熬湯洗患散濕急

龍骨散

白龍骨研　輕粉各二錢五分

檳榔研一錢

豬糞尾上者瓷瓶存入火中燒存性取出研末五錢

共研勻先以口含齏水或溫鹽湯洗令瘡淨見肉卻用香油調藥隨瘡大小敷之未愈再敷

方歌　龍骨散能去濕腐腳氣瘡敷自然無輕榔豬糞香油入久遠患瘡用亦除

田螺皰圖

田螺皰生足掌起如豆粒黃皰左右同

田螺皰

田螺皰在足掌生裏濕外寒蒸鬱成豆粒黃皰悶脹硬破津臭水腫爛疼

註　此證多生足掌而手掌罕見由脾經濕熱下注外寒閉塞或因熱體涉水濕冷之氣蒸鬱而成初生形如豆粒黃皰悶脹硬疼不能着地連生數皰皮厚難於自破傳度三五成片濕爛甚則足趾俱腫寒熱往來法宜苦參菖蒲野艾熬湯熱洗次用線鍼將皰挑破放出

臭水加味太乙膏貼之又將𤛇皮剪去宜用
石膏輕粉等分研末撒之仍以加味太乙膏
葢貼內服解毒瀉脾湯更有經年不愈者係
下部濕寒以金匱腎氣丸常服甚效

解毒瀉脾湯

石膏煅　牛蒡子炒研

防風　黃芩

蒼朮炒　甘草生

木通　山梔生研各一錢

水二鍾燈心二十根煎八分服之

方歌　解毒瀉脾芩蒡子風膏蒼朮草通梔田螺𤛇起宜煎服清熱疎風又去濕

加味太乙膏見潰瘍門

金匱腎氣丸即桂附地黃丸加車前子牛膝各一兩見面部頰瘍

肉刺

肉刺證由纏腳生或着窄鞋遠路行步履艱難疼痛甚玉簪根搗貼塗靈

註　此證生在腳指形如雞眼故俗名雞眼根陷肉裏頂起硬凸疼痛步履不得或因纏腳或着窄鞋遠行皆可生之法宜貼加味太乙膏滋潤之或用紫玉簪花根搗爛貼塗以油紙葢之又地骨皮紅花等分研細香油調敷俱效

加味太乙膏見潰瘍門

御纂醫宗金鑑卷七十二

編輯外科心法要訣目錄

發無定處上

疔瘡
流注
癭瘤
多骨疽
結核
痼發
瘭疽
烏白癩

御纂醫宗金鑑卷七十二

編輯外科心法要訣

疔瘡圖

發無定處

疔瘡

五藏皆可發疔瘡現於形體細考詳若論陰陽分
上下欲知經藏辨何方
疔名火焰發心經往往生於脣指中心作煩時神
恍惚痛兼麻癢皰黃紅
毒發肝經名紫燕此患多於筋骨見破流血水爛
串筋指靑舌强神昏亂
黃鼓由於脾發毒多生口角與顴骨皰黃光潤紅

色纓麻癢硬殭兼嘔吐
毒發肺經名白刃白皰頂硬根突破易腐易陷多
損腮咳吐痰涎氣急甚
從來黑靨發腎經黑斑紫皰硬如釘爲毒極甚疼
牽骨驚悸沉昏目露睛
以上五疔應五藏又有紅絲疔一樣初如小瘡漸
發紅最忌紅絲攻心上
凡治疔證貴乎早三陰三陽更宜曉在下宜灸上
宜鍼速醫即愈緩難保

註 此數證俱名曰疔蓋疔者如丁釘之狀其形小其根深隨處可生由恣食厚味或中蛇蠱之毒或中疫死牛馬豬羊之毒或受四時不正疫氣致生是證夫疔瘡者乃火證也迅速之病有朝發夕死隨發隨死三五日不死一月半月亦必死此係藏府之乖逆性情之激變節候之寒溫肅殺且毒中有淺深也若一時失治立判存亡有名爲火焰疔者多生於脣口及手掌指節間初生一點紅黃小皰痛癢麻木甚則寒熱交作煩躁舌強言語疎忽此屬心經毒火而成也有名爲紫燕疔者多生於手足腰脇筋骨之間初生便作紫皰次日破流血水三日後串筋爛骨甚則目紅甲青邪視神昏睡語驚惕此屬肝經毒火而成也有名爲黃鼓疔者初生黃皰光亮明潤四畔紅色纏繞多生口角腮顴眼胞上下及太陽正面之處發時便作麻癢重則惡心嘔吐肢體木痛寒熱交作煩渴乾噦此屬脾經毒

火而成也有名爲白刃疔者初生白皰頂硬根突破流脂水癢痛兼作多生鼻孔兩手易腐易陷重則腮損咽焦欬吐痰涎鼻掀氣急此屬肺經毒火而成也有名爲黑靨疔者多生耳竅牙縫胸腹腰腎偏僻之處初生黑斑紫皰毒串皮膚漸攻肌肉頑硬如丁痛徹骨髓重則手足青紫驚悸沉困軟陷孔深目睛透露此屬腎經毒火而成也以上五疔本於五藏而生又有紅絲疔發於手掌及骨節間

初起形似小瘡漸發紅絲上攻手膊令人寒熱往來甚則惡心嘔吐治遲者紅絲攻心常能壞人又有暗疔未發而腋下先堅腫無頭次腫陰囊睾丸突兀如筋頭令人寒熱拘急焮熱疼痛又有內疔先發寒熱腹痛數日間忽然腫起一塊如積者是也又有羊毛疔身發寒熱狀類傷寒但前心後心有紅點又如疹形視其斑點色紫黑者爲老色淡紅者爲嫩以上諸證初起俱宜服蟾酥丸汗之毒勢

不盡憎寒壯熱仍作者宜服五味消毒飲汗之如發熱口渴便閉脈沉實者邪在裏也宜服黃連解毒湯加生大黃一錢五分葱頭五個清之凡證輕者宜服化疔內消散若疔毒將欲走黃急服疔毒復生湯已走黃者令人心煩昏憒急用七星劍湯以救之若手足冷六脈暴絕者係毒氣閉塞元氣不能宣通先宜蟾酥丸隨服木香流氣飲行氣其脈自見若疔毒誤灸煩躁譫語者乃逼毒內攻也宜服解毒大青湯若潰後餘毒未盡五心煩熱者宜服人參清神湯鍼後出膿之時氣虛驚悸者宜服內托安神散若攻利太過以致發渴六脈虛大者宜服補中益氣湯若發汗之後汗不止熱不退瘡不疼便不利者此屬裏虛宜服八珍湯加黃耆麥冬治之凡疔潰後不宜補早雖見真虛只可平補忌用溫補之藥外治用藥鍼灸亦當循其次第書云疔瘡先刺血內毒宜汗瀉禁灸不禁鍼怕綿不怕鐵初覺貴乎早治十證十全稍遲者十全五

六失治者十壞八九初發項以上者三陽受毒必用鈹鍼刺入瘡心四五分挑斷疔根令出惡血隨用立馬回疔丹或蟾酥條插入孔內外以巴膏蓋之如項以下生者三陰受毒即當艾灸以殺其勢灸之不痛亦須鍼刺出血插蟾酥條旁腫以離宮錠塗之如旁腫頑硬推之不動用鍼亂刺頑硬之處令多出惡血否則必致走黃挑法先用鍼幹將毒頂焦

皮刮開鍼入疔根堅硬如鍼者爲順若鍼刺入絲軟如瓜穰而不知痛者爲逆百無一生凡挑疔根先出紫黑血再挑刺至鮮血出以知痛爲止隨塡拔疔散令滿以萬應膏蓋之過三四時撥去舊藥易以新藥若藥乾無水不痛者此挑法未斷疔根也再深挑之必以上藥知痛藥入水流爲率三四日後瘡頂乾燥以琥珀膏貼之令疔根托出換九一丹撒之黃連膏抹之外蓋白膏藥生肌斂口若初

起失治或房勞夢遺損氣以致毒氣內攻走黃不住者其瘡必塌陷急當隨走黃處按經找尋有一芒刺直豎即是疔苗急當用鐵鍼刺出惡血即在刺處用艾壯灸三壯以宣餘毒若身面漫腫神昏悶亂乾嘔心煩作渴遍身起疱抽搐者俱爲逆證惟紅絲疔於初起時急用磁鍼於紅絲盡處砭斷出血尋至初起瘡上挑破即用蟾酥條插入萬應膏蓋之隨服黃連解毒湯再暗內二疔不用挑法先

以蟾酥丸含化令盡以冷水漱去毒涎再用三丸嚼葱白三寸裹藥黃酒送下蓋臥出汗少時無汗再飲熱酒催之仍無汗係毒熱滯結急用霹靂火法令汗出毒熱隨之而解次用雙解貴金丸下之自效若暗內二疔初起牙關緊急者用蟾酥丸三五粒葱頭煎湯研化灌之俟稍甦治法如前至羊毛疔先將紫黑斑點用衣鍼挑出如羊毛狀前後心共挑數處用黑豆蕎麥研粉塗之即時汗出而愈

一法用明雄黃末二錢青布包紮蘸熱燒酒於前心擦之自外圈入內其毛即奔至後心再於後心擦之其羊毛俱拔出於布上埋之忌茶水一日再諸疔部位形色亦有急緩生於頭項胸背者最急生於手足骨節之間者稍緩一疔之外別生一小瘡名曰應候四圍赤腫而不散漫者名曰護場四旁多生小瘡者名曰滿天星有此者緩無此者急疔證初起毛四五日間由白色而至青紫色疔頭潰

膿形似蜂窩內無七惡等證者為順若初起似疔非疔灰色頂陷如魚臍如蠶斑青紫黑皰軟陷無膿內見七惡等證者逆凡疔毒俱由火毒而生忌服辛熱之藥恐反助其邪也忌敷寒涼之藥恐逼毒攻裏也再膏藥不宜早貼恐在將潰已潰時貼之呼膿長肉以避風寒初潰時忌用生肌藥恐毒未除反增潰爛生項以上者屬三陽經不宜灸若火日生疔亦禁灸犯之或為倒陷或至走黃俱忌椒

酒雞魚海味鵝肉豬首辛辣生冷等物氣怒房勞諸香並孝服經婦僧道雞犬等項犯之必致反覆慎之

蟾酥丸

蟾酥 酒化二錢　輕粉
銅綠　枯礬
寒水石 煅　膽礬
乳香　沒藥
麝香 各一錢　硃砂 三錢
雄黃 二錢　蝸牛 二十一個

以上各為末稱準於端午日午時在淨室中先將蝸牛研爛同蟾酥和研稠黏方入各藥共搗極勻丸如綠豆大每服三丸用葱白五寸令患者嚼爛吐於手心內男用左手女用右手將藥丸裹入葱泥內用無灰熱酒一茶鍾送下被蓋約人行五六里路病者出汗為度甚者再用一服如外用之法搓條作餅隨證用之修合時忌婦人雞犬等見之

方歌 蟾酥丸治諸疔毒初起惡瘡皆可逐外用化腐又消堅內服驅毒發汗速硃砂輕粉麝雄黃銅綠枯礬寒水入膽礬乳沒共蝸牛丸如綠豆葱酒服

五味消毒飲

金銀花 三錢　野菊花
蒲公英　紫花地丁
紫背天葵子 各一錢二分

水二鍾煎八分加無灰酒半鍾再滾二三沸

時熱服渣如法再煎服被蓋出汗爲度

方歌 五味消毒療諸疔銀花野菊蒲公英紫花地丁天葵子煎加酒服發汗靈

化疔內消散

知母　貝母去心研

穿山甲炙研　蚤休

白及　乳香

天花粉　皂刺

金銀花　當歸

赤芍　甘草生各一錢

酒水各一鍾煎一鍾去渣量病上下服之

方歌 化疔內消知貝甲蚤休及乳草天花皂刺銀花歸芍酒疔證毒輕服更嘉

疔毒復生湯

金銀花　梔子生研

地骨皮　牛蒡子炒研

連翹去心　木通

牡蠣煅　生軍

皂刺　天花粉

沒藥　乳香各八分

酒水各一鍾煎一鍾食遠服不能飲者只用水煎臨服入酒一盃和服亦效

脈實便秘者加朴消

方歌 疔毒復生欲走黃頭面腫浮毒內傷銀梔骨蒡翹通蠣軍刺天花沒乳香

七星劍

蒼耳頭　野菊花

豨薟草　地丁香

半枝連各三錢　蚤休二錢

麻黃一錢

用好酒一觔煎至一盞澄去渣熱服被蓋出汗爲度

方歌 七星劍嘔熱兼寒疔毒走黃昏憒添麻黃蒼耳菊豨薟地丁香蚤半枝連

木香流氣飲

當歸　白芍酒炒

川芎　紫蘇
桔梗　枳實麸炒
烏藥　陳皮
半夏製　白茯苓
黄耆　防風
青皮各一錢　大腹皮
檳榔　枳殼麸炒
澤瀉　甘草節
木香末各五分

生薑三片紅棗肉二枚水煎服
下部加牛膝
方歌 木香流氣宣氣滯歸芎蘇桔枳實烏藥二
陳青大腹風榔青枳瀉煎之

解毒大青湯
大青葉　木通
麥門冬去心　人中黄
梔子生研　桔梗
元參　知母

升麻　淡竹葉
石膏煅各一錢
水二鍾燈心二十根煎八分食遠服
大便秘加大黄
悶亂加燒人糞
方歌 解毒大青通麥門中黄梔子桔元參知升竹
葉石膏煅疔瘡誤灸毒內侵

人參清神湯
人參　陳皮

白茯苓　地骨皮
麥門冬去心　當歸
白朮土炒　黄耆
遠志去心各一錢　柴胡
黄連　甘草炙各五分
水二鍾粳米一撮煎八分食遠服
方歌 人參清神疔毒潰陳苓地骨麥冬歸朮耆柴
遠黄連草益氣除煩熱可推

內托安神散

人參　麥門冬去心
茯神　黃耆
白朮土炒　元參
陳皮各一錢　石菖蒲
甘草炙　酸棗仁炒研
遠志去心　五味子研各五分
水二鍾煎八分臨服入硃砂末三分和勻食遠服

方歌　內托安神多驚悸疔毒針後元氣虛參麥茯菖耆朮草元參棗遠味陳皮

立馬回疔丹

輕粉　蟾酥酒化
白丁香　硇砂各一錢
乳香六分　雄黃
硃砂　麝香各三分
蜈蚣炙一條　金頂砒五分
共爲細末麵糊搓如麥子大凡遇疔瘡以針挑破用一粒插入孔內外以膏蓋追出膿血疔根爲效

方歌　立馬回疔輕蟾酥白丁香乳麝雄硃硇蜈金頂砒研末疔瘡用此根自除

九一丹

石膏煅九錢　黃靈藥一錢
共研極細撒於患處

方歌　九一丹醫疔破後根除用此把膿搜煅石膏對黃靈藥清熱生肌患自瘳

霹靂火

鵝卵石燒紅安鐵杓內杓安桶內以醋淬石令患者將患處覆桶上厚衣密蓋勿令洩氣熱氣微再添紅石加醋淬之瘡頭及腫處使熱氣熏蒸至汗出其毒減半

黃連解毒湯見耳部黑疔
補中益氣湯
八珍湯
巴膏
萬應膏

白膏藥
黃靈藥俱見潰瘍門
離宮錠
雙解貴金丸俱見癰瘍門
拔疔散見疔瘡門
琥珀膏見頭部髮際瘡
黃連膏見鼻部鼻瘡

流注圖

流注

流注原有證數般濕痰瘀風汗後寒發無定處連腫漫潰近骨節治難痊此證本由脾胃弱留結肌肉骨筋間

【注】此證名雖無殊其原各異蓋人之血氣每日週身流行自無停息或因濕痰或因瘀血或因風濕或因傷寒汗後餘毒或因欲後受寒稽留於肌肉之中致令氣血不行故名流注諸家書云流者流行注者住也發無定處隨在可生初發漫腫無頭皮色不變凝結日久微熱漸痛透紅一點方是膿熟即宜用鍼開破若濕痰化成者膿色粘白瘀血化成者膿色金黃粘水風濕化成者膿色稀白如豆汁汗後餘邪化成者膿色或黃或黑稀膿臭穢以上四證發在肉厚處可愈發在骨節及骨空處難痊濕慾受寒化成者膿色稀白而腥其水中有豬脂水油之狀此爲敗漿膿也諸書雖有治法終成敗證初起濕痰所中者木

香流氣飲導之產後瘀血所中者通經導滯湯通活之跌撲傷損瘀血所中者宜散瘀葛根湯逐之風濕所中者萬靈丹五積散加附子温散之汗後餘邪發腫者人參敗毒散散之房慾後外寒侵襲者初宜服五積散加附子次服附子八物湯温之又有室女孀婦鬱怒傷肝思慮傷脾而成者宜服歸脾湯加香附青皮散之此皆流注初起將成之法一服至三四服皆可外俱用烏龍膏或冲和膏敷

貼皮肉不熱者當火神鍼鍼之輕者即消重者其勢必潰將潰時俱宜服托裏透膿湯已潰俱服人參養榮湯久潰膿水清稀飲食減少不能生肌收斂者俱宜服調中大成湯久潰膿水清稀精神怯少漸成漏證者俱宜服先天大造丸潰後其餘治法俱按癰疽潰瘍門參考

通經導滯湯

當歸　熟地

赤芍　川芎

枳殼麸炒　紫蘇

香附　陳皮

丹皮　紅花

牛膝各一錢　獨活

甘草節各五分

水二鍾煎八分入酒一杯食前服

方歌　通經導滯產後疾敗血流瘀腫痛積四物枳蘇香附陳丹皮獨草紅花膝

散瘀葛根湯

葛根　川芎

半夏製　桔梗

防風　羌活

升麻各八分　細辛

甘草生　香附

紅花　蘇葉

白芷各六分

水一鍾葱三根薑三片煎八分不拘時服

方歌 散瘀葛根瘀血凝皆因跌撲流注成芎芋桔
風羌細草香附紅花蘇芷升

附子八物湯

附子製 人參

白朮土炒 白茯苓

當歸 熟地

川芎 白芍酒炒各一錢

木香 肉桂

甘草炙各五分

水一鍾薑三片紅棗肉一枚煎八分食遠服

方歌 附子八物醫流注房慾傷陰外寒入木香肉
桂八珍湯薑棗水煎食遠服

調中大成湯

人參一錢 白朮土炒

白茯苓 黃耆

山藥炒 丹皮

當歸身 白芍酒炒

陳皮各一錢 肉桂

附子製各八分 遠志去心

藿香 縮砂仁

甘草炙各五分

水二鍾煨薑三片紅棗肉二枚煎八分食遠
服

方歌 調中大成四君耆山藥丹皮歸芍宜遠藿縮
砂陳桂附能醫流注潰膿稀

木香流氣飲見疔瘡門

萬靈丹

烏龍膏

冲和膏俱見腫瘍門

五積散見內癰部腎癰

人參敗毒散即荊防敗毒散去荊防見項部脑疽

歸脾湯見乳部乳中結核

雷火神鍼見股部附骨疽

托裏透膿湯見頭部侵腦疽

人參養榮湯見潰瘍門

先天大造丸見膝部鶴膝風

癭瘤圖

癭瘤

五癭屬陽六瘤陰癭別血氣肉石筋瘤氣血肉脂筋骨惟脂開潰不傷身癭蔕細小紅不緊瘤根漫大亮白新證由內外嵐水氣療治須當戒怒嗔

注 癭瘤二證發於皮膚血肉筋骨之處癭者如纓絡之狀瘤者隨氣留住故有是名也多外因六邪榮衛氣血凝鬱內因七情憂恚怒氣濕痰瘀滯山嵐水氣而成皆不痛癢癭證屬陽色紅而高突皮寬不急蔕小而下垂瘤證屬陰色白而漫腫皮嫩而光亮頂小而根大癭有五種肉色不變者爲肉癭其筋脈現露者名筋癭若赤脈交絡者名血癭隨喜怒消長者名氣癭堅硬推之不移者名石癭五癭皆不可破破則膿血崩潰多致傷生瘤有六種堅硬紫色纍纍青筋盤曲若蚯蚓狀者名筋瘤又名石瘤微紫微紅軟硬間雜皮膚中隱隱若紅絲糾纏時時牽痛誤有觸破而血流不止者名血瘤或軟如綿或硬如饅皮色如常不緊不寬始終只似覆肝名肉瘤軟而不堅皮色如常隨喜怒消長無寒無熱者名氣瘤日久化膿流出又名膿瘤也形色紫黑堅硬如石疙瘩疊起推之不移昂昂堅貼於骨者名骨瘤軟而不硬皮色淡紅者名脂瘤即粉瘤也六瘤之形色如此凡癭多生於肩項兩頤瘤則隨處有之夫肝統筋怒氣動肝則火盛血燥致生筋癭筋瘤宜清肝解鬱養血舒筋清肝蘆薈丸主之心主血暴戾太甚

則火旺逼血沸騰復被外邪所搏致生血瘤血瘤宜養血凉血抑火滋陰安歛心神調和血脉芩連二母丸主之脾主肌肉鬱結傷脾肌肉消薄土氣不行逆於肉裏致生肉癭肉瘤宜理脾寬中疏通戊土開鬱行痰調理飲食加味歸脾丸主之肺主氣勞傷元氣腠裏不密外寒搏之致生氣癭氣瘤宜清肺氣調經脉理勞傷和榮衛通氣散堅丸主之腎主骨恣慾傷腎腎火鬱遏骨無榮養致生石癭

骨瘤石癭海藻玉壺湯主之骨瘤尤宜補腎散堅行瘀利竅調元腎氣丸主之癭瘤諸證用藥緩緩消磨自然縮小若久而膿血崩潰滲漏不已者皆爲逆證不可輕用刀鍼決破以致出血不止立見危殆惟粉瘤可破其色粉紅多生耳項前後亦有生於下體者全係痰凝氣結而成治宜鈹鍼破去脂粉以白降丹撚子插入數次將內膜化淨用生肌玉紅膏貼之自愈又有一種黑砂瘤多生臀腿肌突大小不一以手攝起內有黑色即是亦用鍼刺出黑砂有聲軟硬不一又有髮瘤多生耳後髮下寸許軟小高突按之不痛亦用鍼刺之粉髮齊出又有虱瘤發後其癢徹骨開破出虱無數內有極大一虱出其虱方盡黑砂髮虱三瘤外治皆同粉瘤之法其口方收又有蟲瘤每生脇下治法當按癰疽腫瘍潰瘍門但本憂思化成每難獲效諸證形狀各異皆五臟濕熱邪火濁痰各有所感而成總

非正氣之所化也

清肝蘆薈丸

當歸　生地酒浸搗膏

白芍酒炒　川芎各二兩

黃連　青皮

海粉　牙皂

甘草節　昆布酒洗

蘆薈各五錢

右爲細末神麴糊丸如梧桐子大每服八十

丸白滾水量病上下食前後服之

方歌 清肝蘆薈怒傷肝筋結瘻瘤血燥原四物黃連靑海粉牙皂甘昆麴糊丸

芩連二母丸

黃芩　　黃連

知母　　貝母去心

當歸　　白芍酒炒

羚羊角鎊　　生地

熟地　　蒲黃

地骨皮　　川芎各一兩

甘草生五錢

右爲末側栢葉煎湯打寒食麪糊爲丸如梧桐子大每服七十丸燈心煎湯送下

方歌 芩連二母血瘤瘻血沸寒凝微紫紅歸芍羚羊生熟地蒲黃地骨草川芎

加味歸脾丸

香附　　人參

酸棗仁炒　　遠志去心

當歸　　黃耆

烏藥　　陳皮

茯神　　白朮土炒

貝母去心各一兩　　木香

甘草炙各二錢

右爲細末合歡樹根皮四兩煎湯煮老米糊爲丸如梧桐子大每服六十丸食遠白滾水送下

方歌 加味歸脾香附參棗遠歸耆烏藥陳茯神朮草木香貝消瘻除瘤脾鬱伸

通氣散堅丸

人參　　桔梗

川芎　　當歸

花粉　　黃芩酒炒

枳實麩炒　　陳皮

半夏製　　白茯苓

膽星　　貝母去心

海藻洗　　香附

石菖蒲　　甘草生各一兩

右爲細末荷葉煎湯爲丸如豌豆大每服一錢食遠燈心生薑煎湯送下

方歌　通氣散堅氣癭瘤參桔芎歸花粉投芩枳二陳星貝藻香附石菖思漸瘳

海藻玉壺湯

海藻洗　陳皮

貝母去心　連翹去心

昆布　半夏製

青皮　獨活

川芎　當歸

甘草節各一錢　海帶洗五分

水二鍾煎八分量病上下食前後服之

方歌　海藻玉壺湯石癭陳貝連翹昆半青獨活芎歸甘海帶化硬消堅最有靈

調元腎氣丸

生地酒煮搗膏四兩　山萸肉

山藥炒　丹皮

白茯苓各二兩　澤瀉

麥冬去心搗膏　人參

當歸身　龍骨煅

地骨皮各一兩　知母童便炒

黃蘗鹽水炒各五錢　縮砂仁炒

木香各三錢

共研細末鹿角膠四兩老酒化稠加蜂蜜四兩同煎滴水成珠和藥爲丸如梧桐子大每服八十丸空心溫酒送下忌蘿蔔火酒房事

方歌　調元腎氣縮砂仁六味地黃知麥參歸蘗木香龍地骨骨瘤服此又滋陰

白降丹

生肌玉龍膏俱見潰瘍門

多骨疽圖



多骨疽

多骨疽由腎虛源，瘡久潰後受寒落草患，此胎元結名為骨脹，治一般。

註 此證一名剩骨，一名朽骨，無論老少皆有生者，多在腮腭牙床眼胞頦下手足腿膊等處。有因腎虛之人生瘡久潰，腫硬不退，口不收斂，外被寒邪襲入，與膿毒凝結，借人之氣血化成多骨者；又有初生落草，身肉之中按之有如脆骨，由胎元受之精血交錯而致，迨其人長大後，必於脆骨所生之處突然發腫生疽，及潰破後多骨脫出，其口方收。有多骨出之不休者，名曰骨脹，難愈。以上二因治法皆同，俱宜隔附子餅艾灸，以宣寒凝，令骨速脫。蓋骨屬腎，遇寒則凝，故從熱治也。若朽骨內含，或出臭膿，或出涎泡，宜撒黃靈藥，陀僧膏蓋貼，令朽骨出盡，其口始易斂也。腎虛微寒者，服六味地黃丸；虛而寒甚者，桂附地黃丸常服可愈。由胎元結成者，稟賦身虛，不可強取，多骨俟自破則取之。

附子餅灸法 見首卷灸法

黃靈藥

陀僧膏 俱見潰瘍門

六味地黃丸 見面部雀斑

桂附地黃丸 見面部頰瘍

結核圖



結核生在皮裏膜外形如果核

結核

結核即同果核形皮裏膜外結凝成或由風火氣
鬱致或因怒火濕痰生

註 此證生於皮裏膜外結如果核堅而不痛由風火氣鬱結聚而生初發令人寒熱往來有表證者荊防敗毒散解之表既解即服連翹消毒飲若濕痰氣鬱凝結者宜行氣化痰以五香流氣飲千金指迷丸辛涼之藥治之其核自消若誤投苦寒之劑必至潰破或服之而反甚者其勢將潰不可強消以耗其氣宜用透膿散潰而不愈者屬氣虛宜用補中益氣湯平補之外治按癰疽腫瘍潰瘍門

千金指迷丸

半夏製四兩　白茯苓

枳殼麩炒各三兩　風化消二錢

共研爲末河水煮糊爲丸如梧桐子大每服二錢白滾水送下

方歌 千金指迷丸半夏茯苓枳殼消同研河水煮
糊作成丸消堅去核結痰化

荊防敗毒散見項部腦疽

連翹消毒飲見背部[illegible]發

五香流氣飲見脇部[illegible]

透膿散見腫瘍門

補中益氣湯見潰瘍門

瘑發圖

瘑發

瘑發皆由外感生，伸縮動處每成形，漫腫無頭寒熱作，四肢沉重渴煩增。

註 此證體虛之人感受天地不正之厲氣而生，非由內作也。多生於手足掌心或腰腿臂下伸縮動處，疼如痛風而兼漫腫無頭，其色淡紅，增寒發熱，四肢沉重煩渴。初起宜服萬靈丹發汗解表；腫仍不消，必欲作膿者，宜托裏消毒散兼琥珀蠟礬丸間服；已潰者按癰疽潰瘍門治法。

萬靈丹
托裏消毒散
琥珀蠟礬丸 俱見腫瘍門

瘭疽圖



瘭疽

瘭疽本由烟瘴起，小如粟豆大梅李，初發紅點次變黑，腐爛筋骨疼無已。

註 此證一名蛇瘴，川廣烟瘴地面有之。初起紅點，次變黑色，其形小者如粟豆，大者如梅李，隨處可生，疼痛應心不止，腐爛筋骨，潰破膿如豆汁，今日拭淨，次日膿汁復滿，愈而復發。初起宜貼蟾酥餅；寒熱交作，宜服黍米寸金丹或奪命丹亦可；紅腫遊走不定者，離宮錠塗之，兼神燈照熏照之；破後脾虛食少作嘔者，補中益氣湯加黃連、麥冬；補而不應，或出稀水穢汁者逆。

蟾酥餅 見疔瘡

黍米寸金丹

離宮錠 俱見腫瘍門

奪命丹 見背部陰陽二氣疽

補中益氣湯 見潰瘍門

神燈照法 見首卷

烏白癩圖



烏白癩

烏白癩由中惡風，犯觸忌害亦能成，麻癢徹骨刺不痛，除風養血即收功。

註 此二證俱由惡風侵襲皮膚血分之間，火鬱耗血及犯觸忌害而成，有烏白二種。烏者初覺皮毛變黑，發若癬疹，癢若蟲行，手足頑麻，鍼刺不痛，目視物若垂絲，心常驚而妄語，凡飲食言語之時，開口出氣而鳴，宜服蝟皮丸，外擦大黑神膏。白癩皮色漸變白斑，語聲嘶

嗄目眩不明四肢頑疼身體大熱心常煩惱手腳緩縱背脊拘急肉如鍼刺鼻生息肉瘤生白沫宜服白花蛇散外擦螌蝥膏二證俱常飲苦參消白癩便秘者先宜服醉仙散次服通天再造散利下惡物即效

蝟皮丸

蝟皮燒存性　蚺蛇頭燒存性
魁蛤各一枚　紅娘子去頭足翅
蜥蜴焙乾　虻蟲去頭足翅

水蛭糯米炒熟　蜘蛛焙
盤蝥各一個去頭足翅　桂心
大黃　黃連
龍骨煅研　麝香研
汞即水銀　川椒炒各五錢
芒消　石膏煅各一兩
穿山甲炙二片　枯白礬
滑石研水飛
甘遂各二錢五分與胡麻同炒以胡麻熟為度去麻用甘遂
蜈蚣炙一條半　附子一枚炮去皮臍
巴豆去皮膜心油　雷丸各五十粒

右為細末煉蜜為丸如小豆大每服一丸滾白水送下空心臨臥各一服如未覺每服加一丸如腹中有蟲下細觀形狀皆死矣痛多減一丸痛少服二丸以瘥為度此藥乃攻毒取蟲之峻劑非灼知藏府有蟲毒及精神可勝攻下者不可輕服

方歌　蝟皮癘黑成鳥癩心驚視物若垂簾似蟲

行手足痒紅娘魁蛤汞礬蜴蚺桂消黃虻蛭甲黃連龍骨麝蜘膏川椒滑附蜈巴豆雷丸甘遂共盤蝥

大黑神膏

頭髮雞子大一團　川芎
黃連　黃蘗
防己去皮　川烏
升麻　藜蘆各五錢
巴豆　杏仁各十四粒

用豬脂油二觔將藥煠至頭髮化盡爲度撈去渣再用雄黃雌黃白礬鉛粉各五錢松脂一塊如雞子大同研末入油內攪勻先以葱鹽湯洗淨患處次擦藥日三次勿令入口

方歌 大黑神膏烏頭塗髮芎連藜巴川烏雌雄巴豆礬松脂鉛粉升麻杏藜蘆

白花蛇散

白花蛇酒浸炙 槐子

天麻 枳殼麩炒

蔓荊子 防風

羌活 威靈仙

白鮮皮 晚蠶蛾各一兩 去頭足翅

甘草炙五錢

共研細末每服二錢溫酒調下不拘時日用二服

方歌 白花蛇散體多熱刺痛聲嘶白癩痾槐子天麻鮮枳蔓風羌威草晚蠶蛾

螌蝥膏

螌蝥十四枚 大蝮蛇一條頭尾全者酒乾

黃酒七盌同藥入瓶內用糠火煨酒至一盌濾去渣收貯每用薄薄塗於患上

方歌 螌蝥膏搽白癩風蝮蛇黃酒入瓶中糠火煨酒取塗患以毒攻惡癩自平

苦參酒

苦參五觔 露蜂房五兩

刺蝟皮酥炙一具

共研粗末用水三斗煎湯至一斗去渣浸細麴五觔炊黍米三斗拌如常醞法酒熟壓去糟每於食前溫飲一小盞

方歌 苦參酒治烏白癩露蜂房與刺蝟皮煎湯浸麴炊黍米釀酒飲之惡疾離

醉仙散

通天再造散俱見大麻風

御纂醫宗金鑑卷七十三

編輯外科心法要訣目錄

發無定處中

大麻風

楊梅瘡

楊梅結毒

赤白遊風

紫白癜風

白駁風

癧瘍風

丹毒

粟瘡作癢

枯筋箭

御纂醫宗金鑑卷七十三

編輯外科心法要訣

大麻風圖

大麻風

麻風總屬毒癘成其因有三五損風五死證見真惡候初病能守或可生

註 此證古名癘風癘風者有毒之風也經云脈風成爲癘又云癘者有營氣熱腐其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰毒風客於脈而不去名曰癘風今人呼爲大麻風一因風土所生中國少有此證惟烟瘴地面多有之一因傳染或遇生麻風之人或父母夫妻

家人遞相傳染或在外不謹或糞坑房室床鋪衣被不潔一因自不調攝洗浴乘涼希圖快意或露臥當風睡眠濕地毒風襲入血脈其因名雖有三總屬天地癘氣感受不覺未經發泄積久而發徧身麻木次起白屑紅斑蔓延如癜形若蛇皮脫落成片始發之時自上而下者順自下而上者逆漸來可治頓發難醫風毒入裏化生為蟲蟲蝕五臟則形有五損肺受病先落眉毛肝受病面起紫皰腎

受病腳底先穿脾受病徧身如癬心受病先損其目此為險證又有五死證如麻木不仁者為皮死割切不痛者為肉死潰爛無膿者為血死手足脫落者為筋死鼻梁崩塌眼弦斷裂脣翻聲啞者為骨死若五死見一即為敗惡不治之候也此證初覺即服萬靈丹汗之次宜神應消風散追風散磨風丸次第服之牙齦出血用黃連貫衆等分煎湯漱之外搽類聚祛風散兼用地骨皮荊芥苦參細辛各二兩河水煎湯浸浴熏洗若遇損敗之證在上部則服醉仙散在下部則服通天再造散若鼻梁塌壞用換肌散服之患者稍露虛象即以補氣瀉榮湯服之兼用何首烏酒飲之若能清心寡慾戒口早治或有可生若口味不能清淡色慾不能斷絕即愈後仍不免再發終於不救

神應消風散

全蝎　白芷

人參各一兩

右研細末每用二錢勿食晚飯次日空心溫酒調服覺身微躁為效

方歌 神應消風散癘風身麻白屑起斑紅蝎芷人參各一兩空心酒服麻木平

追風散

錦紋大黃六兩　川鬱金炒一兩八錢

皂角刺一兩五錢

共研細末每用五錢加大風子油一錢五分

朴消一錢五更空心溫酒調服直待辰時又如前調藥加熱蜜少許服之以寬解口切不可臥良久痛瀉數次不妨以稀粥補之如第一日服消風散第二日卽服此藥第三日服磨風丸周而復始又如此服之瘦弱者十日內追風散只用一服老弱者勿服

方歌 追風散用川鬱金皂刺大黃研末勻初服消風次用此風油消酒調服神

磨風丸

豨薟草　牛蒡子炒

麻黃　蒼耳草

細辛　川芎

當歸　荊芥

蔓荊子　防風

車前子　威靈仙

天麻　何首烏

羌活　獨活各一兩

共為細末酒打麵糊為丸如梧桐子大每服六七十丸溫酒送下日用二服

方歌 磨風丸薟蒡麻黃蒼細芎歸荊蔓防車威天麻何羌獨追風服後用此方

頮聚祛風散

硫黃　寒水石

枯白礬　貫眾各二兩

蛇床子一兩　朴消五錢

共研細末臘月豬脂搗爛調敷

方歌 類聚祛風散硫黃寒水枯礬消蛇床貫眾細研豬脂搗擀徧體癘風瘡

醉仙散

牛蒡子炒　胡麻

枸杞子　蔓荊子各一兩

苦參　白蒺藜

防風　花粉各五錢

共研細末每服一錢加輕粉一分二釐研勻茶清調服晨午晚各一服五七日後先於牙縫內出臭黃涎渾身疼悶如醉然後利下膿

血惡物臭氣病根乃去矣

方歌 醉仙上部癘風重牛蒡胡麻枸蔓荊苦參蒺藜防花粉服加輕粉用茶清

通天再造散

大黃煨一兩　皂角刺一兩五錢

鬱金五錢　白牽牛六錢頭末半生半炒

共研細末每服二錢或三錢早晨面東醇酒調下當日利下惡物或膿或蟲為效

方歌 通天再造治癘風敗證先從下部攻鬱金大

黃牽牛刺晨服酒調面向東

換肌散

烏梢蛇　白花蛇

蚯蚓去土各一兩　細辛

木鱉子　白芷

天麻連莖者　赤芍

蔓荊子　當歸

威靈仙　荊芥穗

甘菊花　不灰木

紫參　苦參

沙參　何首烏

石菖蒲　大戟

天門冬去心　川芎

白蒺藜　甘草炙

胡麻仁　蒼朮米泔水浸炒

草烏湯泡去皮各三錢五分

共研細末每服五錢溫酒調下酒多更妙紫參不灰木雖無亦可

方歌 換肌散治大風癘毒攻眉脫壞鼻梁烏梢白花蛇蚓細鱉芷天麻芍蔓當威靈荊菊不灰木紫苦沙參何首菖木賊天冬芎蒺草胡麻蒼朮草烏強

補氣瀉榮湯

連翹去心　升麻各六分

桔梗五分　黃芩

生地各四分　黃連

蚯蚓酒炒去土　當歸

黃耆　蘇木
全蠍各三分　人參
白豆蔻各二分　甘草生一分
水二鍾酒一鍾煎至一鍾去滓又用胡桐淚
一分水蛭炒蝱蟲各三箇炒麝香五釐桃仁
三箇研泥共為細末入藥湯內煎至七分飯
後服之
方歌 補氣瀉榮癘處宜芩連參桔蚓歸耆蘇地升
蠍翹蔻草桐淚蛭蝱麝桃泥

何首烏酒
何首烏四兩　當歸身
當歸尾　穿山甲炙
生地黃　熟地黃
蝦蟆各一個　側柏葉
松鍼　五加皮
川烏湯泡去皮　草烏湯泡去皮各四錢
將藥入夏布袋內紮口用黃酒二十觔同藥
袋入罈內封固重湯煮三炷香埋土七日開
罈口取酒時時飲之令醺醺然作汗避風
方歌 何首烏酒大風疾歸甲松鍼生熟地側蟆五
加川草烏酒煮滋榮毒自息
萬靈丹見腫瘍門

楊梅瘡圖

楊梅瘡

楊梅瘡生有二般精化氣化是其源精化淫慾氣傳染氣宜發汗精下痊

註 此證一名廣瘡因其毒出自嶺南一名時瘡以時氣乖變邪氣湊襲之故一名棉花瘡因其纏綿不已也一名翻花楊梅因窠粒破爛肉反突於外如黃蠟色一名天泡瘡因其夾濕而生白疱也有形如赤豆嵌於肉內堅硬如鐵名楊梅痘有形如風疹作癢名楊梅疹

先起紅暈後發斑點者名楊梅斑色紅作癢其圈大小不一二三相套因食穢毒之物入大腸而發名楊梅圈其名形雖異總不出氣化精化二因但氣化傳染者輕精化慾染者重氣化者或遇生此瘡之人鼻聞其氣或悞食不潔之物或登圊受梅毒不潔之氣脾肺受毒故先從上部見之皮膚作癢筋骨微疼其形小而且乾也精化者由交媾不潔精泄時毒氣乘肝腎之虛而入於裏此為慾染先從下部見之筋骨多痛或小水澀淋瘡形大而且堅氣化者毒在表未經入裏稍有萌動宜急服透骨搜風散元氣實者楊梅一劑散汗之精化者毒在裏深伏骨髓未透肌膚宜服九龍丹通利大小二便以瀉骨中之毒甚者二服降下毒物以土深壓之行瀉之後體實者升麻解毒湯體虛者歸靈內托散服至筋骨不疼瘡色淡白內毒已解再用金蟾脫殼酒一料掃餘毒以絕其源如梅毒初發服

表藥時恐上攻頭面宜豫服護面散或瘡勢已發於面愈後斑痕不退宜翠雲散點之以滅痕跡若梅瘡潰爛時膿穢浸淫成片而痛者以鵝黃散撒之又翻花楊梅亦以本方加雄黃末香油調敷之外有護從丸於發瘡時令侍從人服之可免傳染梅瘡初起頭不痛筋骨不疼小水通利瘡形碎小色鮮頭面稀少口角無瘡胸背稀密穀道清楚者為順若先發下疳次生便毒魚口便覺筋骨疼痛而

梅瘡隨發色紫堅硬手足多生形如湯潑起皰者爲險總之始終調治得法輕者半年重者一載始得全愈若患者不遵正法醫治欲求速效强服輕粉水銀白粉霜劫藥等類妄用熏擦哈吸等法以致餘毒含藏骨髓復爲倒發結毒輕則累及妻子甚則腐爛損形不可不慎

透骨搜風散

透骨草白花者陰乾　生脂麻

羌活　獨活

小黑豆　紫葡萄

槐子　白糖

六安茶　核桃肉各一錢五分

生薑三片紅棗肉三枚水二鍾煎一鍾露一宿空心熱服被蓋出汗避風

方歌　透骨搜風散梅毒筋骨微疼癢皮腐脂麻羌獨豆葡萄槐子糖茶核桃肉

楊梅一劑散

麻黃一兩蜜炙　威靈仙八錢

大黃七錢　羌活

白芷　皂刺

金銀花　穿山甲炙研

蟬蛻各五錢　防風三錢

山羊肉一斤河水煮熟取淸湯二盌用黃酒一盌將藥煎至一盌令患者空心將羊肉淡食令飽隨後服藥蓋被出汗避風

方歌　楊梅一劑元氣壯上部生毒氣化瘡麻黃羌芷威靈刺銀花風甲蟬大黃

升麻解毒湯

升麻　皂刺各四錢

土茯苓一斤

水八盌煎四盌作四次一日服盡每次燉熱加香油三茶匙和勻量病上下食前後服之

如瘡生項上加白芷

咽內加桔梗

胸腹加白芍

肩背加羌活

下部加牛膝

方歌 升麻解毒筋骨疼梅毒纏綿壯服靈土苓皂刺香油服按部須加藥引經

歸靈內托散

人參 木瓜

白术土炒 金銀花

防已 天花粉

白鮮皮 薏苡仁各一錢

當歸 熟地

白芍酒炒 川芎各一錢

土茯苓二兩 威靈仙六分

甘草五分

水三鍾煎二鍾作二次隨病上下服之渣再煎服

下部加牛膝五分

元氣虛者倍加參歸

毒氣盛者倍金銀花加蒲公英

外以麥冬五錢去心薏苡仁五錢土茯苓一兩煎湯常服以代茶

方歌 歸苓內托參木瓜术銀四物已天花土苓鮮薏威靈草梅瘡體弱服堪誇

金蟬脫殼酒

醇酒五觔大蝦蟆一箇土茯苓五兩浸酒內瓶口封嚴重湯煮二炷香時取出待次日飲之以醉為度無論冬夏蓋煖出汗為效餘存之酒次日隨量飲之酒盡瘡愈又治結毒筋骨疼痛諸

藥不效者更妙服酒七日後禁見風為效忌口及房慾

護面散

女人頭髮煅存性 明雄黃各三分

共研細香油半酒鍾調勻滾黃酒沖服一日三服

方歌 護面散醫梅瘡現預服毒不攻頭面香油調蘂黃酒沖只用雄黃頭髮煅

翠雲散

輕粉一兩　石膏一兩煅

膽礬　銅綠各五錢

共研極細末濕瘡乾撒乾瘡以公猪膽汁調濃點之每日三次斑痕自退

方歌　翠雲散去瘡後斑輕粉石膏共膽礬銅綠共研濕乾撒猪膽汁調能潤乾

鵝黃散

輕粉　石膏煅

黃蘗炒各等分

共爲末乾撒患處即可生痂再爛再撒毒盡即愈

方歌　鵝黃散治梅瘡爛膿穢多疼浸成片輕粉石膏黃蘗研乾撒止疼解毒驗

護從丸

雄黃　川椒各五錢

杏仁一百粒炒去皮尖

共研末燒酒打飛羅麵糊爲丸如梧桐子大每服十五丸白滾水送下

方歌　護從丸避梅瘡患雄黃川椒各五錢杏仁百粒酒糊入從人服之毒不傳

九龍丹見下部懸癰

楊梅結毒圖



楊梅結毒

結毒楊梅毒結生原於誤服劫藥成因久逢虛始倒發腦鼻喉目任蝕攻

註 此證因生楊梅方熾誤服水銀升煉悍燥劫藥希圖速效瘡痂盡落一時僥倖而愈不知遺害久遠引毒潛藏骨髓關竅之中其毒積久因經虛外攻故名結毒倒發其始先從筋骨疼痛隨處結腫皮色如常將爛時色方紫紅腐臭不堪以致腦頂塌陷腮脣鼻梁損壞

穿喉蝕目手足拘攣等患終成痼疾初起結腫筋骨疼痛時宜服搜風解毒湯若徧身破爛臭穢而兼筋骨疼痛氣實毒盛者宜服化毒散氣衰者豬胰子湯主之若結毒腫塊經年難愈諸法罔效者宜西聖復煎丸主之若結毒攻於口鼻者宜五寶散主之年久臭爛鼻破損壞者宜服結毒紫金丹若入巔頂頭痛如破者內服天麻餅子鼻吸碧雲散若鼻塞不通宜吹通鼻散甚效毒攻咽喉腐爛臭蝕者宜服硫黃不二散兼吹結毒靈藥凡人中白若結毒筋骨疼痛朝輕夜重喜熱手按揉者係犯寒凉宜鉛回散主之結毒臭爛不斂宜貼解毒紫金膏兼摻結毒靈藥壯實者以解毒為主虛弱者以兼補為法以上之證各隨次第如法調治重者一年輕者半年自然可痊永無後患慎勿妄求速效以自貽誤也

搜風解毒湯

土茯苓一兩 白鮮皮
金銀花 薏苡仁
防風 木通
木瓜各五分 皂角子四分

水二鍾煎一鍾服之一日三服

氣虛加人參七分

血虛加當歸七分

忌清茶牛羊雞鵝魚肉燒酒房慾等件

方歌 搜風解毒湯倒發初腫拘急骨痛加土茯

鮮銀花薏皂角防風通木瓜

化毒散

生大黃一兩　穿山甲炙

當歸尾各五錢　白殭蠶炒二錢

蜈蚣一條炙黃

共研末每服二錢溫酒調下一日二服

方歌 化毒散醫結毒盛破穢氣實筋骨疼大黃山甲殭歸尾蜈蚣研末酒調成

豬胰子湯

豬胰子一兩切碎　黃耆鹽水炒

金銀花各三錢　當歸

白芍各一錢五分酒炒　天花粉

貝母去心研　穿山甲炙研

白鮮皮　青風藤

白芷　木瓜

皂刺　甘草節各一錢

黃栝蔞一箇連仁研爛　防已七分

黑虱胡麻二錢炒研

白色土茯苓四兩河水四大碗煎湯三碗去滓將群藥入湯內煎一大碗通口服胃弱者分為二服日三服

方歌 豬胰湯治結毒虛歸芍天花蔞貝耆胡麻銀甲鮮藤芷木瓜已刺草苓宜

西聖復煎丸

乳香　沒藥

孩兒茶　丁香各一兩

血竭　阿魏

白花蛇各四錢　飛羅麵炒焦黃色一觔

共研細煉蜜六兩煎滾香油四兩大棗肉二十枚搗膏共和為丸如彈子大每服一丸土茯苓二兩水二鍾煎至一鍾將藥丸入內再煎至半鍾澄去渣溫服

方歌 西聖復煎丸結毒腫塊經年服自無乳沒兒茶丁血竭阿魏白蛇麵炒胡

結毒紫金丹

龜板放炭火上炙焦用白酒漿塗之再炙以焦黃為度研末二兩

硃砂六錢　石決明六錢煅紅童便淬一次用九孔大者

各研極細末共和勻爛米飯爲丸麻子大每服一錢量病上下食前後服之筋骨疼痛酒下腐爛者土茯苓湯下

方歌　結毒紫金丹龜板石決硃砂米飯丸年久毒攻鼻損破土苓湯服臭爛痊

天麻餅子

天麻　薄荷

甘松　白附子去皮

白芷　蒼朮米泔水浸炒

川芎　川烏湯泡去皮

草烏湯泡去皮　防風

細辛　甘草生各一錢

雄黃　全蝎各三錢

右爲細末寒食麪打糊爲丸如豌豆大捻作餅子每服二三十餅葱白煎湯送下

方歌　天麻餅子薄甘松雄黃白附芷蒼芎川草烏蝎防細草結毒攻巔頭痛平

通鼻散

壺盧殼燒灰　石鍾乳

膽礬　冰片各等分

共爲末吹入鼻內出黃水日吹二三次三日即通

方歌　通鼻散吹結毒證毒塞鼻中息不通石鍾乳與胡盧殼膽礬冰片等分同

硫黃不二散

硫黃一錢　靛花一分

共研細用涼水一酒鍾調服

方歌　硫黃不二毒攻喉腐臭爛蝕痛不休涼水調服疼立止靛花少兌不須憂

結毒靈藥

水銀一兩　硃砂

硫黃　雄黃各三錢

共研細入陽城罐內泥固鐵盞梁兜固緊封口其火候俱按紅升丹之煉法火畢次日取出盞底靈藥約有一兩五六錢治結毒常腐爛

之證靈藥五錢輕粉五錢同研細小罐盛收以紗封之臨用時甘草湯洗淨患處將罐倒懸紗眼內篩藥患上油紙蓋之男婦咽喉爛者靈藥一錢加人中白二分研細吹之日用三次

方歌 結毒靈藥化腐方水銀硃砂硫雄黃共研入罐用泥固兜緊火昇三炷香

鉛回散

黑鉛 半斤銅杓化開傾入水中取起再化再傾以鉛化盡為度澄去水將鉛灰傾在三重紙上下用灰收乾水氣鉛灰日中曬乾

硫黃

各等分共研細每服一錢溫酒調服至重者不過三次即效

方歌 鉛回散療筋骨痛寒觸結毒夜間重鉛化成灰兌硫黃每服五錢酒調送

五寶散 方見下部疳瘡

碧雲散 方見頭部頭風傷目

結毒紫金膏 方見脛部臁瘡

赤白遊風圖

赤白遊風

赤白遊風如粟形浮腫焮熱癢兼疼表虛風襲怫鬱久血赤氣白熱化成

註 此證發於肌膚遊走無定起如雲片浮腫焮熱痛癢相兼高累如粟由脾肺燥熱而兼表虛腠理不密風邪襲入怫鬱日久與熱相搏則化熱益盛而成滯於血分者則發赤色滯在氣分者則發白色故名赤白遊風也初俱宜荊防敗毒散疎解之赤者次服四物消風

飲白者次服補中益氣湯加防風蟬蛻殭蠶
生何首烏治之初俱用牛肉片貼之豬羊俱
可遊走太速者砭之定停者以眞君妙貼散
雞子清調敷其看順逆之法與丹毒門參考
忌魚腥雞鵝動風燥血之物犯則難愈

四物消風飲

生地三錢　當歸二錢

荊芥　防風各一錢五分

赤芍　川芎

白鮮皮　蟬蛻

薄荷各一錢　獨活

柴胡各七分

紅棗肉二枚水二鍾煎八分去渣服

方歌　四物消風飲調榮血滋風減赤色平荊防鮮
蟬兼獨活柴薄紅棗水煎濃

荊防敗毒散見項部腦疽

補中益氣湯見潰瘍門

眞君妙貼散見腫瘍門

紫白癜風圖

紫白癜風

紫白癜風無癢痛白因氣滯紫血凝熱體風侵濕
相搏毛竅閉塞發斑形

註此證俗名汗斑有紫白二種紫因血滯白因
氣滯總由熱體風邪濕氣侵入毛孔與氣血
凝滯毛竅閉塞而成多生面項癍點遊走延
蔓成片初無痛癢久之微癢初起宜萬靈丹
汗之次以胡麻丸常服外用蜜陀僧散擦患
處令汗出風濕自解古今治法雖多取效甚

少得此證者當忌魚腥煎炒火酒動風發物

胡麻丸

大胡麻四兩　苦參

防風　石菖蒲

威靈仙各二兩　白附子

獨活各一兩　甘草生五錢

右爲細末白酒漿和丸如菉豆大每服二錢

形瘦者一錢五分食後臨臥白滾水送下

方歌　胡麻丸治紫白癜除去風濕不致延苦參白

附防風草菖蒲獨活威靈仙

密陀僧散

雄黃　硫黃

蛇床子各二錢　密陀僧

石黃各一錢　輕粉五分

共研末醋調搽患上

方歌　密陀僧散風濕患入膝成癜紫白斑雄硫輕

粉蛇床子石黃共末醋搽痊

萬靈丹見腫瘍門

白駁風圖



白駁風

白駁風生面頸間風邪相搏白點斑甚延徧身無

痛癢治宜消風塗脂痊

註　此證自面及頸項肉色忽然變白狀類斑點

並不痛癢由風邪相搏於皮膚致令氣血失

和施治宜早若因循日久甚者延及徧身初

服浮萍丸次服蒼耳膏外以穿山甲片先刮

患處至燥痛取鰻鱺魚脂日三塗之一方取

樹孔中水溫洗之洗後搗桂心牡蠣等分爲

末面油調塗日三夜一俱效

浮萍丸

紫背浮萍（取大者洗淨曬乾）

研細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸豆淋酒送下

豆淋酒法

黑豆半升炒烟起冲入醇酒三觔浸一日夜去豆用酒送藥

方歌 浮萍丸治白駁癜乾紫背大浮萍蜜丸彈狀豆酒服專能發表散邪風

蒼耳膏

蒼耳（鮮者連根帶葉取五七十觔洗淨）

切碎入大鍋內煮爛取汁絹濾過再熬成膏磁罐盛之用時以桑木匙挑一匙噙口內用黃酒送下服後有風處必出小瘡如豆粒大此風毒出也刺破出汁盡即愈忌豬肉

方歌 蒼耳風邪侵皮膚氣血失和白駁生連根帶葉鮮蒼耳洗淨熬膏酒服靈

癧瘍風圖

癧瘍風

癧瘍風從皮膚生頸項胸腋無癢疼紫白點點不開大皮膚風邪熱結成

註 此證發於皮膚多生頸項胸腋其色紫白點點相連亦無瘙痒較白駁形圓不延蔓開大由風邪鬱熱皮膚居久不散而成斯疾宜服烏蛇散外用羊蹄草根共硫黃蘸醋於銹鐵片上研濃汁日塗二三次效

烏蛇散

烏蛇酒浸二兩　羌活
防風　黃芩
苦參各二兩　人參
沙參　丹參
元參　梔子仁生
桂心　秦艽
木通　犀角屑
白蒺藜　升麻
枳殼麸炒　白鮮皮

川芎各一兩
共研細末每服二錢食遠溫酒調服忌雞猪
魚蒜麵食熱物之類

方歌　烏蛇瘙痒風熱濕羌活防風芎五參梔桂秦
艽通犀角蒺藜升枳白鮮芩

丹毒圖



丹毒

丹毒名多雲片形風火濕寒肉分凝胸腹四肢分
順逆清火消風砭敷靈

註　孫眞人云丹毒一名天火肉中忽有赤色如
丹塗之狀其大如掌甚者徧身有痒有痛而
無定處丹名雖多其理則一也形如鷄冠名
鷄冠丹若皮澀起如麻豆粒者名茱萸丹亦
有水丹徧身起疱遇水濕搏之透露黃色恍
如有水在皮中此雖小疾能令人死須當速

治不可忽也色赤者諸書謂之赤遊丹色白者爲水丹小兒多生之但有乾濕癢痛之殊有夾濕夾風夾寒之別諸丹總屬心火三焦風邪而成如色赤而乾發熱作癢形如雲片者卽名赤遊丹屬血分有火而受風也毒盛者服藍葉散毒輕者宜導赤湯加薄荷葉獨活服之如初起白癍漸透黃色光亮脹墜破流黃水濕爛多痛者名水丹又名風丹多生腿膝屬脾肺有熱而夾濕也宜防已散主之

亦有起白癍無熱無痛遊走不定者由火毒未發肌膚外受寒鬱名爲冷瘼宜服烏藥順氣散外用蔥擦凡丹形初見卽用牛羊精肉片貼之甚則用砭法令出紫血色重不散者以柏葉散敷之又方芸薹葉研末靛青調敷甚效諸丹本於火邪其勢暴速自胸腹走於四肢者順從四肢攻於胸腹者逆

藍葉散

藍葉 曬乾　川芎

赤芍　知母

生地　白芷

川升麻　柴胡

葛根　杏仁 炒去皮尖

甘草 生各一錢　石膏 煅

梔子仁 各五分

共搗粗末每用八錢新汲水二鍾煎八分去渣服

熱甚加黃芩元參

方歌 藍葉散卸赤遊丹皆因血熱風邪襲芎芍知膏生地芷升麻柴葛杏梔甘

防已散

防已 三兩　朴消 一兩

犀角 鎊　川芎

黃芩　黃耆

川升麻 各一錢

共搗粗末每用五錢加竹葉三十片新汲水二鍾煎八分服

方歌 防己丹毒始白瘢漸黃亮痛濕熱原朴消犀角芎苓共者與升麻竹葉煎

烏藥順氣散

烏藥　橘紅各二錢　枳殼麩炒　白芷　桔梗　防風　殭蠶炒　獨活　川芎各一錢　甘草生五分

水二鍾生薑三片煎八分服

方歌 烏藥順氣枳橘紅芷桔風殭獨草芎冷瘼遊行無熱痛因毒未發受寒風

導赤湯見口部口糜

柏葉散見脛部腎火丹

粟瘡圖



粟瘡生於偏身形如粟米作癢

粟瘡作癢

粟瘡痒證屬火生風邪乘皮起粟形風為火化能作癢通聖苦參及消風

註 凡諸瘡作癢皆屬心火火邪內鬱表虛之人感受風邪襲入皮膚風遇火化作癢致起瘡瘍形如粟粒其色紅搔之愈癢久而不瘥亦能消耗血液膚如蛇皮初服防風通聖散加枳殼蟬蛻血燥晚癢甚夜不寐者宜服消風散外敷二味拔毒散若年深日久膚如蛇

皮者宜常服皂角苦參丸外用豬脂油二兩
苦杏仁一兩搗泥抹之自效

皂角苦參丸

苦參一觔　荊芥十二兩
白芷　大風子肉
防風各六兩　大皂角
川芎　當歸
何首烏生　大胡麻
枸杞子　牛蒡子炒

威靈仙　全蠍
白附子　蒺藜炒去刺
獨活　川牛膝各五兩
草烏湯泡去皮　蒼朮米泔水浸炒
連翹去心　天麻
蔓荊子　羌活
青風藤　甘草
杜仲酥炙各三兩　白花蛇切片酥油炙黃
縮砂仁炒各二兩　人參一兩

共研細末醋打老米糊爲丸如梧桐子大每
服三四十丸溫酒食前後任下避風忌口爲
要

方歌　皂角苦參粟瘡瘙久似蛇皮膚雖當芎歸何
首胡芷大風枸杞草烏蒼翹蒡威靈蠍白
附蒺藜天麻獨蔓羌白蛇風藤甘杜仲人參
牛膝縮荊防

防風通聖散見頭部禿瘡

消風散見項部鈕扣風

二味拔毒散見腫瘍門

枯筋箭圖

枯筋箭

枯筋箭由肝失榮筋氣外發赤豆形破突筋頭如花蕊或繫或灸便成功

註 此證一名肬子由肝失血養以致筋氣外發初起如赤豆枯則微槁日久破裂鑽出筋頭蓬鬆枯槁如花之蕊多生於手足胸乳之間根蒂細小者宜用藥線齊根繫紧七日後其患自落以月白珍珠散摻之其疤收斂根大項小者用銅錢一文套肬子上以草紙穰代

艾連灸三壯其患枯落肬形若大用草紙蘸濕套在肬上灸之

藥線見臂部痔瘡

月白珍珠散見湯潑門

御纂醫宗金鑑卷七十四

編輯外科心法要訣目錄

發無定處下

疥瘡

癬

黃水瘡

暑令瘍毒小癤

痱痤

產後癰疽

翻花瘡無圖

血風瘡

痦㿔

浸淫瘡

火赤瘡

貓眼瘡

魚脊瘡

骨痿瘡

風疳無圖

血疳

白疕

漆瘡

血箭

血痣

股痛無圖

瘡口誤入毒水無圖

諸瘡生蠅蛆無圖

御纂醫宗金鑑卷七十四

編輯外科心法要訣

疥瘡圖



疥瘡

疥瘡乾濕蟲砂膿各經蘊毒風化成治論上下分
肥瘦清風利濕兼殺蟲

【註】此證有乾濕蟲砂膿之分其形雖有五種總由各經蘊毒日久生火兼受風濕化生斯疾或傳染而生凡疥先從手丫生起遶徧週身瘙癢無度如肺經燥盛則生乾疥瘙癢皮枯而起白屑如脾經濕盛則生濕疥焮腫作痛破津黃水甚流黑汁如肝經風盛則生蟲疥瘙癢徹骨搔不知疼如心血凝滯則生砂疥形如細砂焮赤癢痛抓之有水如腎經濕熱則生膿窠疥形如豆粒便利作癢膿清淡白或脾經濕盛亦生膿窠疥但頂含稠膿癢疼相兼為異疥雖有餘之證而體虛之人亦生以便秘為實便利為虛亦有虛而便燥者如風秘則便燥血分枯燥則便澁又在瘡形色重色淡及脈息之有力無力辨之初起有餘之人俱宜防風通聖散服之虛者服荊防敗毒散透發之及形勢已定則無論虛實乾疥服消風散濕疥服蒼术膏蟲疥服蘆薈丸砂疥服犀角飲子膿窠疥服秦艽丸經久不愈血燥者服當歸飲子外治乾疥者擦繡毬丸濕者擦臭靈丹潤燥殺蟲俱效疥生上體多者偏風熱盛下體多者偏風濕盛肥人多風濕瘦人多血熱詳辨治之

蒼术膏

南蒼术十觔切片入砂鍋內水煮減半取汁再加水煮如前以术無味為度併汁一處

用小砂鍋再煎如乾一寸加汁一寸煎成膏加蜂蜜四兩和勻

每服二羹匙空心白滚水調服

方歌 蒼术膏醫濕疥瘡切片入鍋煮取湯熬膏加蜜空心服濕除熱散勝拏方

犀角飲子

犀角 鎊　赤芍

甘菊花　元參

木通　赤小豆 炒

石菖蒲 各一錢五分　甘草 生一錢

生薑三片水二鍾煎八分服

方歌 犀角飲子砂疥生癢疼色赤出心經芍菊元參通赤豆菖蒲甘草水煎成

秦艽丸

秦艽　苦參

大黃 酒蒸　黃耆 各二兩

防風　漏蘆

黃連 各一兩五錢　烏蛇肉 五錢 酒浸焙乾

共爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸食後溫酒送下

方歌 秦艽丸服膿疥愈濇熱癢除瘡自去苦參大黃風漏蘆烏蛇黃連耆蜜聚

當歸飲子

當歸　生地

白芍 酒炒　川芎

何首烏　荊芥

防風　白蒺藜 各一錢

黃耆　甘草 生 各五分

水二鍾煎八分食遠服

方歌 當歸飲子膿疥久癢滲血燥不能除四物黃耆何首草荊防蒺入風自疎

繡毬丸

川椒　輕粉

樟腦　雄黃

枯白礬　水銀 各二錢

大風子肉 一百枚 另研

共研細末同大風子肉再碾勻加柏油一兩

化開和藥攪勻作丸以二掌合搓如圓眼大

先以鼻聞次擦患處

方歌 繡毬丸用椒輕粉樟腦雄黃礬水銀大風子

研柏油兌乾疥搓擦效如神

臭靈丹

硫黃末 油核桃

生豬脂油各一兩 水銀一錢

搗膏用擦患處

方歌 臭靈丹擦膿濕疥硫黃末共油核桃生豬脂

油各一兩水銀一錢同搗膏

防風通聖散 見頭部禿瘡

荊防敗毒散 見項部腦疽

消風散 見項部鈕扣風

蘆薈丸 見牙齒部牙衄

癬瘡圖

癬

癬證情形有六般風熱濕蟲是根原乾濕風牛松刀癬春生桃花面上旋

註 此證總由風熱濕邪侵襲皮膚鬱久風盛則化爲蟲是以搔癢之無休也其名有六一曰乾癬搔癢則起白屑索然彫枯二曰濕癬搔癢則出黏汁侵淫如蟲行三曰風癬即年久不愈之頑癬也搔則痺頑不知痛癢四曰牛皮癬狀如牛領之皮厚而且堅五曰松皮癬

狀如蒼松之皮紅白斑點相連時時作癢六曰刀癬輪郭全無縱橫不定總以殺蟲滲濕消毒之藥敷之輕者羊蹄根散久頑者必效散搽之亦有脾肺風濕過盛而腫痛者宜服散風苦參丸解散風濕其腫痛即消又有面上風癬初如瘖瘟或漸成細瘡時作痛癢發於春月又名吹花癬即俗所謂桃花癬也婦女多有之此由肺胃風熱隨陽氣上升而成宜服疏風清熱飲外用消風玉容散每日洗之自效

羊蹄根散

羊蹄根末八錢　枯白礬二錢

共研勻米醋調擦癬處

方歌　羊蹄根散敷諸癬羊蹄根共枯白礬二味研末加米醋搽患滲濕癢可痊

必效散

川槿皮四兩　海桐皮

大黃各二兩　百藥煎一兩四錢

巴豆去油一錢五分　斑蝥全用一箇

雄黃　輕粉各四錢

共研極細末用陰陽水調藥將癬抓損薄敷藥乾必待自落

方歌　必效大黃百藥煎川槿海桐巴豆斑雄黃輕粉陰陽水調搽諸癬久年頑

散風苦參丸

苦參四兩　大黃炒香

獨活　防風

枳殼麩炒　元參

黃連各二兩　黃芩

梔子生　菊花各一兩

共研細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後白滾水送下日用三服茶酒任下

方歌　散風苦參風濕盛癬瘡多癢腫痛兼大黃芩獨防風枳元參梔子菊黃連

疏風清熱飲

苦參二錢酒浸蒸曬九次炒黃　全蠍土炒

皂刺　猪牙皂角
防風　荊芥穗
金銀花　蟬蛻炒各一錢
酒水各一鍾加葱白三寸煎一鍾去渣熱服
忌發物
方歌 疎風清熱風癬患時作痛癢極纏綿苦參蠍
刺豬牙皂防風荊芥銀花蟬

消風玉容散

綠豆麪三兩　白菊花

白附子　白芷各一兩
熬白食鹽五錢
共研細末加冰片五分再研勻收貯每日洗
面以代肥皂
方歌 消風玉容綠豆麪菊花白附芷食鹽研加冰
片代肥皂風除癬去最爲先

黃水瘡圖

黃水瘡
黃水瘡如粟米形起時作癢破時疼外因風邪內
濕熱黃水浸淫更復生
註 此證初如粟米而癢兼痛破流黃水浸淫成
片隨處可生由脾胃濕熱外受風邪相搏而
成宜服升麻消毒飲熱甚外用青蛤散敷之
濕盛碧玉散敷之即效痂厚用香油潤之忌
見水洗

升麻消毒飲

當歸尾　赤芍
金銀花　連翹去心
牛蒡子炒　梔子生
羌活　白芷
紅花　防風
甘草生　升麻
桔梗
每味用二錢爲大劑一錢五分爲中劑一錢
爲小劑水二鍾煎八分食遠熱服

方歌　升麻消毒却風濕歸芍銀花翹蒡梔羌芷紅
花防草桔黃水浸淫服漸失
加瘡生頭面減去歸尾紅花

青蛤散見鼻部鼻䘌瘡
碧玉散見面部燕窩瘡

暑令瘍毒小癤圖

暑令瘍毒小癤

暑令瘍癤焮腫疼頭暈口苦背肌紅較之癰疽發
熱異不分日夜似火攻

註　此證係暑令所生瘍毒小癤初發背心肌膚
紅暈次生膿瘡發熱無時日夜不止兼頭目
暈眩口苦舌乾心煩背熱肢體倦怠初宜荊
防敗毒散加藿香黃連石膏服之外治按癰
疽腫瘍潰瘍門

荊防敗毒散見項部腦疽

瘴疽圖

瘴疽生在筋骨先黑後青色如拳打之狀

瘴疽

瘴疽因受山瘴毒　伏藏久痛附筋骨
初黑次青如拳打　急砭惡血後膿熟

註 此證因受山嵐瘴氣，伏藏筋骨之間，年月久遠，令人痛附筋骨，始發黑色，頑痺如木石，其毒附着於筋骨，重按方知微痛，五七日後，毒勢湧出浮腫，次變青色，如拳打之狀，寒戰似瘧，頭顫口偏，手足厥逆，黑睛緊小，始見黑色時，急用砭法，令出惡血，隨服不換金正氣散加羚羊角以洩邪毒，次按癰疽潰瘍治法。膿熟潰，黃白膿為順，出黑汁者險。

不換金正氣散

蒼朮米泔水浸炒　厚朴薑製　陳皮　藿香　半夏麴炒各二錢　甘草炙一錢

水二鍾，生薑五片，紅棗肉二枚，煎一鍾，去渣，稍熱服，忌生冷油膩。

方歌 正氣散因山瘴感，伏久生疽身戰寒，平胃散加半夏麴，藿香薑棗服平安。

產後癰疽圖

產後癰疽

產後癰疽最屬險七情之傷六淫感瘀血稽留成
癰疽勢潰托裹不宜緩

註 此證因產後氣血經絡俱虛或因七情所傷或因六淫所感與瘀血相稽而成最屬險候法宜大補扶助根本兼活瘀生新爲要其客病以末治之初服生化湯隨證加減以消之有表邪服清魂散有裏熱服回生丹勢欲潰膿時急宜托裏遲則恐毒內陷藥味宜和平純善最忌汗下峻劑其餘腫潰治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

生化湯

當歸八錢 川芎四錢
薑炭 甘草炙各四分
桃仁十粒去皮尖研泥

水一鍾半煎六分加無灰酒一小杯和服

方歌 生化湯宜產後疽通滯和榮又補虛歸芎薑炭炙甘草桃仁酒服善消瘀

清魂散

荊芥一錢 川芎五分
人參 甘草炙
澤蘭葉各三分

爲末黃酒調服

方歌 清魂產後風邪侵荊芥川芎與人參炙甘澤蘭同作劑能疎表證效通神

回生丹

黑豆三升煮熟取汁三盌去豆

紅花二兩炒黃色入醇酒大壺同煮三五滾去紅花用汁
生大黃一觔研末　蘇木二兩剉用河水五盌煎汁三盌去渣
先將大黃末以好米醋三四盌攪勻文武火熬成膏如此二遍次下紅花酒蘇木湯黑豆汁共熬成膏離火再入後藥

當歸　熟地
川芎　白茯苓
延胡索　烏藥
香附　蒲黃

牛膝　桃仁另研
蒼朮各二兩米泔水浸炒　白芍酒炒
甘草炙　羌活
山萸肉酒浸　三稜
陳皮　地榆
木香　五靈脂各五錢
人參　白朮土炒
青皮　木瓜各三錢
良薑四錢　乳香

沒藥各一錢

共研細末用大黃膏爲丸如彈子大每服一丸黃酒燉化通口服

方歌　回生產後存惡露致發癥瘕服可逐除熱活瘀榮衛和紅花大黃豆蘇木八珍羌萸稜延胡烏藥青陳榆香附乳沒蒲黃良膝瓜木香靈脂桃蒼朮

翻花瘡無圖

翻花瘡因潰後生頭大蒂小努菌形雖無痛癢觸流血血燥肝虛怒氣成

註　此證因生瘡潰後努肉自瘡口突出其狀如菌頭大蒂小愈努愈翻雖不大痛大癢誤有觸損流血不住久則虧虛總由肝虛怒氣血燥而成宜服逍遙散外用烏梅煆灰輕粉各等分研末撒之或馬齒莧煆灰豬脂調敷俱效

逍遙散見背部上搭手

血風瘡圖



血風瘡發在遍身起如粟米下現是紅堆

血風瘡

血風瘡證生遍身粟形搔癢脂水淫肝肺脾經風濕熱久鬱燥癢抓血津

註 此證由肝脾二經濕熱外受風邪襲於皮膚鬱於肺經致遍身生瘡形如粟米搔癢無度抓破時津脂水浸淫成片令人煩躁口渴搔癢日輕夜甚宜服消風散外敷雄黃解毒散若日久風邪鬱在肌膚則耗血生火搔癢倍增夜不得寐撓破津血心煩大便燥秘咽乾

不渴此屬火燥血短宜服地黃飲外擦黃連膏潤肌膏合而用之悉效兼忌椒酒雞鵝動風等物

雄黃解毒散

雄黃　寒水石煅各一兩

白礬生四兩

共研細末滚水調敷

方歌 雄黃解毒寒水石白礬四兩共研之血風瘡生粟米癢滚水調敷滲毒濕

地黃飲

生地　熟地

何首烏生各三錢　當歸二錢

丹皮　黑參

白蒺藜炒去刺　殭蠶炒各一錢五分

紅花　甘草生各五分

水煎早晚服

方歌　地黃飲治血風瘡，癢盛不眠血燥傷，首烏丹皮生熟地，黑參歸蒺草紅殭。

消風散見項部鈕扣風

黃連膏見鼻部鼻瘡

潤肌膏見頭部白屑風

痦癗圖



痦癗

痦癗汗出中邪風，狀類豆瓣扁瘩形，日癢秦艽湯宜服，夜重當歸飲服寧。

註　此證俗名鬼飯疙瘩，由汗出受風，或露臥乘涼，風邪多中表虛之人。初起皮膚作癢，次發扁疙瘩，形如豆瓣，堆纍成片。日癢甚者，宜服秦艽牛蒡湯；夜癢重者，宜當歸飲子服之。外用燒酒浸百部，以藍布蘸酒擦之，謹避風涼自效。

秦艽牛蒡湯

秦艽一錢五分　牛蒡子炒研

枳殼麸炒　麻黄蜜炙

犀角鎊　黄芩

防風　甘草生

黑參　升麻各一錢

水二鍾煎八分服

方歌　秦艽牛蒡風留膚瘖瘟生如麻豆形枳殼麻黄犀角鎊黄芩風草黑參升

當歸飲子見疥瘡

浸淫瘡圖



浸淫瘡

浸淫瘡發火濕風黄水浸淫似疥形蔓延成片痒不止治宜清熱並消風

註　此證初生如疥搔癢無時蔓延不止抓津黄水浸淫成片由心火脾濕受風而成經云歲火太過甚則身熱肌膚浸淫仲景云從口流向四肢者順四肢流入口者逆初服升麻消毒飲加蒼朮川黄連抓破津血者宜服消風散外搽青蛤散即愈若蝕遲不食黄水不止

此屬脾敗不治之證也

升麻消毒飲 見黃水瘡

消風散 見項部鈕扣風

青蛤散 見鼻部鼻䘌瘡

火赤瘡圖

火赤瘡

火赤瘡由時氣生燎漿水疱徧身成治分上下風濕熱瀉心清脾自可寧

註 此證由心火妄動或感酷暑時臨火邪入肺伏結而成初起小如芡實大如棋子燎漿水疱色赤者為火赤瘡若頂白根赤名天疱瘡俱延及徧身焮熱疼痛未破不堅疱破毒水津爛不臭上體多生者屬風熱盛宜服解毒瀉心湯下體多生者屬濕熱盛宜服清脾除

濕飲未破者俱宜蝌蚪拔毒散敷之已破者俱宜石珍散撒之清其濕熱破爛自乾甚效

解毒瀉心湯

黃芩 黃連

牛蒡子炒研 知母

石膏煅 梔子生

防風 元參

荊芥 滑石各一錢

木通 甘草生各五分

水二鍾燈心二十根煎八分食遠服

方歌 解毒瀉心湯火赤芩連牛蒡木通知石膏梔子防風草元參荊芥與滑石

清脾除濕飲

赤茯苓 白朮土炒

蒼朮米泔水浸炒 黄芩

生地黄 麥冬去心

梔子生研 澤瀉

甘草生 連翹去心

茵蔯蒿 枳殼麸炒

元明粉各一錢

水二鍾竹葉二十片燈心二十根煎八分食前服

方歌 清脾除濕天皰疾赤苓二朮芩生地麥冬梔瀉草連翹茵蔯元明同作劑

石珍散

輕粉 石膏煅各一兩

黄蘗末 青黛各三錢

共研勻先以甘草湯洗淨瘡處再用此藥撒之

方歌 石珍散去火邪害天皰破撒自康泰一兩輕粉煅石膏三錢黄蘗加青黛

蝌蚪拔毒散見腫瘍門

貓眼瘡圖

貓眼瘡

貓眼瘡名取象形痛癢不常無血膿光芒閃爍如
貓眼脾經濕熱外寒凝

註此證一名寒瘡每生於面及徧身由脾經久鬱濕熱復被外寒凝結而成初起形如貓眼光彩閃爍無膿無血但痛癢不常久則近脛宜服清肌滲濕湯外敷真君妙貼散兼多食雞魚蒜韭忌食鮎魚蟹鰕而愈

清肌滲濕湯

蒼朮米泔水浸炒　厚朴薑汁炒
陳皮　甘草生
柴胡　木通
澤瀉　白芷
升麻　白朮土炒
梔子生　黃連各一錢

水二鍾生薑三片燈心二十根煎至八分溫
服

方歌 清肌滲濕瘡貓眼脾濕熱鬱外寒纏平胃柴
胡通瀉芷升麻白朮梔黃連

真君妙貼散見腫瘍門

魚脊瘡圖

魚脊瘡

魚脊瘡由虛人成感受濕熱皮間凝虛寒發緩皰津水灸變稠膿陽氣生

註 此證形如魚脊由陽氣虛寒之人復感濕熱結滯而成多生筋骨之間以陽氣虛寒故發長緩慢只在皮膚堅凝脊痛初起白皰漸長狀如魚脊破津黃水正膿生遲初治無論已破未破宜蒜片艾灸以通陽氣外用貞君妙貼散香油調敷宜服內補十宣散得稠膿色鮮者為順若灸之不應色暗腐爛出臭水者逆其次內外治法俱按癰疽潰瘍門

貞君妙貼散見腫瘍門

內補十宣散見胸部[illegible]

骨痿瘡圖

骨痿瘡

骨痿瘡形粟豆紅漸如梅李火毒成膿血不出痛不止治同疔法即成功

註 此證初生形如粟豆色紅漸大如梅如李由火毒而成血不出膿不生痛亦不止久則延及徧身內外治法與疔門參考

風疳 無圖

風疳證如風癬形破流黃水癢微疼由於風濕客谷道如聖膏搽功即成

註 此證由風濕客於谷道而成形如風癬作癢破流黃水浸淫遍體微疼宜用如聖膏搽之即愈

如聖膏

當歸五錢 巴豆三錢去殼

香油八兩將二藥煠枯去渣入黃蠟三兩化盡離火絹濾淨將凝入輕粉二錢攪勻搽之

方歌 如聖膏用歸巴豆二味一同入香油煠枯加蠟添輕粉凝搽風疳功即收

血疳圖

血疳

血疳形如紫疥瘡痛癢時作血多傷證因風熱閉腠理消風散服功最強

註 此證由風熱閉塞腠理而成形如紫疥痛癢時作血燥多熱宜服消風散

消風散 見項部鈕扣風

白疕瘡圖



白疕

白疕之形如疹疥色白而癢多不快固由風邪客皮膚亦由血燥難榮外

註 此證俗名蛇虱生於皮膚形如疹疥色白而癢搔起白皮由風邪客於皮膚血燥不能榮養所致初服防風通聖散次服搜風順氣丸以豬脂苦杏仁等分共搗絹包擦之俱效

搜風順氣丸

大黃五兩酒浸蒸曬九次　車前子酒炒

山萸肉　山藥炒

牛膝酒浸　菟絲子酒煮

獨活　火麻仁微火焙去殼

檳榔　枳殼麩炒

郁李仁各二兩滾水浸去皮　羌活一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子每服三十丸茶酒任下早晚各一服

方歌 搜風順氣車前子萸藥大黃膝菟絲羌獨火麻榔枳郁服去風邪血燥滋

防風通聖散見頭部禿瘡

漆瘡圖



漆瘡

漆瘡感受漆毒生，腠理不密腫焮紅，初發覺癢後如疹，皮破流水更兼疼。

註 此證由人之腠理不密，感漆辛熱之毒而生。初發面癢而腫，抓之漸似癮疹，色紅，徧傳肢體，焮痛，皮破爛斑，流水，甚者寒熱交作。宜韭菜汁調三白散塗之，內服化斑解毒湯。忌浴熱水，戒油膩厚味發物。或用神麯研為末，生蟹黃調塗患處，亦效。

三白散

鉛粉一兩 輕粉五錢 石膏煅，三錢

共研勻，韭菜汁調敷，紙蓋。如無韭菜汁，涼水調亦可。

方歌 三白散敷漆瘡消，輕粉鉛粉煅石膏，去熱解毒功效速，研勻須用韭汁調。

化斑解毒湯 見砭部內發丹毒

血箭圖

血箭

血箭毛孔射出血心火熾迫血亂行桃花散用涼水敷再塗金墨即能停

註 此證一名肌衄由心肺火盛逼血從毛孔中射出如箭宜服涼血地黃湯外用桃花散以涼水調敷或用金墨研末醋調涼塗其血即止

涼血地黃湯

生地三錢　黃連

當歸各一錢五分　甘草

梔子生研　元參各一錢

黃芩一錢

水二鍾煎八分量病上下服之

方歌 涼血地黃心火盛毛孔血溢不歸經黃連歸草芩梔子元參煎服效通靈

桃花散

白石灰半升用水潑成末與大黃片一兩五錢同炒以灰變紅色為度去大黃將石灰篩細用涼水調敷

方歌 桃花止血最為良一兩五錢生大黃半升石灰相併炒去軍研篩水調强

血痣圖

血痣

血痣初起似痣形漸大如豆其色紅揩破外皮流鮮血肝經怒火鬱血成

註此證由肝經怒火鬱血而成初起如痣色紅漸大如豆觸破時流鮮血用花蘂石散撒之血已止宜冰蛳散枯去本痣以月白珍珠散摻太乙膏蓋貼生皮即愈血出甚者服涼血地黃湯兼戒厚味發物

花蘂石散

花蘂石五錢火煅入童便淬之七次

草烏　南星

白芷　厚朴

紫蘇　羌活

没藥　輕粉

龍骨煅　細辛

檀香　蘇木

乳香　蛇含石火煅童便淬三次

當歸　降眞香各二錢

麝香三分

共爲細末罐收臨用時撒於患處

方歌　花蘂石散止血强草烏星芷厚蘇羌没輕龍骨細檀麝蘇木乳歸含降香

冰蛳散即冰螺捻研末見乳部乳岩

月白珍珠散見潰瘍門

涼血地黃湯見血箭

太乙膏見潰瘍門

腠痛無圖

腠痛本於寒氣侵鬱在肌腠痛連心衣觸手捺無皮狀法宜椒酒綿溻溫

註此證係暴寒侵襲肌腠之中寒鬱不行偶犯衣觸或以手捺疼痛連心似乎如無皮之狀法宜胡椒四錢燒酒四兩共入磁盌内重湯燉煮以軟綿蘸酒溫溻熨痛處即效

瘡口誤入毒水 無圖

瘡潰誤入汚水毒或傷諸刺痛至骨金蟬散煅敷瘡內毒水流盡刺亦出

註 瘡潰誤入皂角驢馬尿糞一切汚穢毒水入瘡或木刺傷着於瘡內焮腫疼痛至骨者先以溫水洗瘡拭乾再用金蟬散煅煉妥協撒於瘡內外以加味太乙膏蓋之良久毒水流盡有刺亦自出矣

金蟬散

大乾蝦蟆 一箇 胡椒 十五粒

皂角子 七粒

右用乾鍋入藥在內瓦蓋鍋口慢火煅至烟盡取出存性研爲細末取用

方歌 金蟬潰瘡受毒水腫痛或因木刺傷蝦蟆胡椒皂角子火煅烟盡研撒良

加味太乙膏 見潰瘍門

諸瘡生蛆 無圖

夏月諸瘡臭腐爛蠅衆生蛆治勿慢蟬花散服可除之蛆化爲水蠅畏散

註 夏月諸瘡潰爛腐臭或孤單及懶惰之人失於洗浴積膿汚穢蒼蠅聞穢叢聚以致生蛆宜急服蟬花散蛆盡化水而出蠅亦不敢近瘡嬰兒痘爛生疽者亦服前藥外用寒水石細末摻之又治瘡膿忽臭有冬月潰瘡生蛆者係陰濕之所化也宜海參爲末撒之或皂

礬飛過爲末撒之其蛆亦化爲水

蟬花散

蛇蛻 火燒存性研末 一兩 蟬蛻

青黛 各五錢 細辛 二錢五分

右爲末每服用三錢黃酒調服日用二服

方歌 蟬花散療諸瘡穢夏月生蛆蠅近圍蛇蛻細辛蟬蛻黛酒調蛆化蠅畏飛

御纂醫宗金鑑卷七十五

編輯外科心法要訣目錄

雜證部

跌撲

金瘡

箭頭入肉

鐵鍼入肉

鐵鍼誤入咽喉

誤吞銅錢

骨鯁咽喉

杖瘡

夾傷

竹木刺入肉

破傷風

發痙

湯火傷

凍瘡

人齩傷

熊虎狼傷人

馬齩傷

瘋犬齩傷

馬汗驢涎入瘡

蛇齩傷

蜈蚣齩傷

蠍螫

蠶齩

射工傷

蚯蚓傷

天蛇瘡

蠷螋傷

百蟲入耳

編輯外科心法要訣

雜證部

跌撲

跌撲之證屬尋常復元活血湯最良已破亡血八珍服未破血瘀大成湯

註此證有已破未破之分亡血瘀血之別如尋常跌撲微傷皮肉疼痛未破者以復元活血湯散瘀活血若損傷筋骨血流過多不止者

即爲亡血急用花蕊石散乾撒止血內服八珍湯加酒炙骨碎補續斷紅花若從高跌墜未曾損破皮肉者必有瘀血流注臟腑人必昏沉不醒二便秘結當以大成湯通利二便其人自醒若便利不醒者灌獨參湯救之

大成湯

大黃 三錢　朴消
枳殼 各二錢 麩炒　厚朴 薑炒
當歸　紅花
木通　蘇木
陳皮　甘草 生 各一錢

水二鍾煎八分不拘時服服後二時不行渣再煎加蜜三匙冲服

方歌 大成活瘀便立通消黃枳殼厚歸紅木通蘇木陳皮草煎服不行加蜜冲

復元活血湯

當歸尾 二錢　柴胡 一錢五分
穿山甲 炙研　紅花

栝蔞仁 各七分　甘草 五分
桃仁 十七個　大黃 二錢

水二鍾酒二鍾煎一鍾食遠服以利爲度

方歌 復元活血跌撲證惡血流瘀積滯疼山甲柴紅栝蔞草桃仁歸尾大黃行

花蕊石散 見發無定處血痣
八珍湯
獨參湯 俱見潰瘍門

金瘡

金瘡須宜驗傷痕輕傷皮肉重傷筋外撒如聖桃花散血多八珍湯獨參

註 此證有金刃傷箭鏃傷磁鋒傷須看傷痕深淺輕者皮肉破損血流不住以桃花散撒之重者筋斷血飛係大脈已傷用如聖金刀散撒上以絹帛紮住止而復流再撒若藥痂過厚拘痛者以生肌玉紅膏塗傷處外貼陀僧膏長筋止痛生肌治之無論輕重傷破出血

初服三黃寶蠟丸傷破微出血者服黎洞丸若出血過多其人面黃眼黑不可專攻瘀血宜用八珍湯甚者獨參湯先固根本二方俱加蘇木紅花兼調瘀血此證雖係好肉暴傷然驗脈法形證亦可以定生死如傷血過多脈見虛細沉小和緩者生若脈見浮洪數大實虛促者死被傷入肺者二七死左脇下傷內者腸全斷者少腹下傷內者傷處繁多者老人左股壓碎者傷破陰子者有內耳後傷透於內者死凡傷天窗穴與眉角腦後臂裏跳脈髀內陰股兩乳上下心下鳩尾及五臟六腑之輸者皆死腦後出髓而不能語目睛直視喉中沸聲口急唾出兩手妄舉者亦死又有腹皮損破腸出者看腸若僅傷一半者可治先以大麥煮粥取濃汁溫洗其腸以桑皮尖茸為線蘸花蕊石散縫腸傷口急於縫處塗活雞冠血隨以清油塗腸令潤將腸輕輕納入腹內外用生人長髮密縫腹傷口之

裏肉留外皮撒月白珍珠散以待生肌斂口若傷口大者不能外縫以陀僧膏護貼候自潰膿即按潰瘍門治法縫後勿驚笑以米飲少少飲之漸增待二十日後再喫濃粥調理而愈

三黃寶蠟丸

藤黃四兩製法見黎洞丸內 天竹黃無真者九轉南星代之
紅芽大戟 劉寄奴
血竭各三兩 孩兒茶

雄黃各三兩　朴消一兩

當歸尾一兩五錢　鉛粉

汞卽水銀　乳香

麝香各三錢　琥珀二錢

各研極細末稱準和一處將水銀同鉛粉在鐵鍋內火上熬研成末入前藥內共研勻用煉淨黃蠟二十四兩放磁器內坐滾水中化開將藥入內攪勻病重者每丸一錢病輕者每丸五分熱黃酒調服倘受傷至重連服數

次服藥後飲酒出汗更妙又治一切惡瘡以香油化開敷之甚效

方歌　三黃寶蠟琥天竹大戟兒茶消寄奴雄竭藤黃鉛粉汞乳歸麝殭去其粗蠟丸黃酒熱調服外治惡瘡油化敷能療金瘡傷損證續筋瘀散痛全無

黎洞丸

三七　生大黃

阿魏　孩兒茶

天竹黃　血竭

乳香　沒藥各二兩

雄黃一兩　山羊血五錢無眞者以小子羊鮮心血代之

冰片　麝香

牛黃各二錢五分以上各研細末

藤黃以秋荷葉露泡之隔湯煮十餘次去浮沉取中將山羊血拌入曬乾

取秋露水化藤黃拌藥搗千餘下如乾加煉蜜少許爲丸重一錢黃蠟封固每用一丸黃

酒化服外敷亦用黃酒磨塗此藥如在夏天修和取天落水拌之爲丸

方歌　黎洞金瘡跌撲傷發背癰疽諸惡瘡瘰癧刑傷瘋犬饞蜂蛇蠍毒咬敷服三七大黃冰麝魏兒茶天竹竭藤黃羊血牛雄黃乳沒秋露和丸酒化強

桃花散見發無定處血箭

如聖金刀散見足部腳疽

生肌玉紅膏

陀僧膏
八珍湯
獨參湯
月白珍珠散俱見潰瘍門
花蕊石散見發無定處血痣

箭頭入肉附毒箭

箭頭入肉鉗不出解骨丸納羊脂敷燋銅毒箭金汁解射菵中人藍汁塗

註 箭頭嵌入肉內鉗不出者宜解骨丸納傷口內外用羊腎脂細嚼貼之覺癢忍之極癢箭頭漸冐撼動拔出即以人尿洗之貼陀僧膏日換傷口自斂又有毒箭二種交廣蠻夷用燋銅作箭鏃甚毒人若中之纔傷皮肉便悶膿沸爛而死急飲金汁外亦用金汁抹之若

金汁一時不得即灌人糞汁並外敷之非此不能解毒也又一種以毒藥喂箭名為射菵人若中之甚毒急用葛氏方用藍靛汁一盌灌之外亦用塗抹傷處一法用大豆豬羊血內服外敷解毒亦效又箭鏃不出者搗鼠肝塗之或鼠腦搗塗即出

解骨丸

蜣螂研 雄黃研
象牙末各等分

共和匀煉蜜爲丸如黍米大納傷口處

方歌 解骨丸能拔箭鏃蜣螂雄黄功效速象牙末
加蜜煉丸大如黍米納傷處

陀僧膏見潰瘍門

鐵鍼入肉

鐵鍼入肉隨氣遊走向心胸險可愁烏鴉翎灰酒
調服膏貼鍼出始免憂

註 凡鐵鍼誤入肉中無眼者不動有眼者隨氣
遊走若走向心窩胸膛者險急用烏鴉翎數
根炙焦黄色研細末酒調服一錢或二錢倶
可外用神聖膏貼三五次其鍼自出前法用
在一二日間效

神聖膏

用車脂葷油不拘多少研如膏調慈石末攤紙
上如錢許貼之每日二換

鐵鍼誤入咽喉

誤吞鐵鍼入咽喉急飲蝦蟆血數頭鍼不即吐箸籬散或食飴糖出不留

註 鐵鍼誤入咽喉無藥可施宜用癩蝦蟆數個將頭剁去倒垂流血以盌接之得一盃許灌入喉中移時連鍼吐出鍼自轉曲一方用舊箸籬煅存性研末每服三錢黃酒調服亦能化鍼或用飴糖一觔食盡便出

誤吞銅錢

誤吞銅錢雖無疼久留腹中病必成荸薺能化堅為軟多食無傷可化銅

註 誤吞銅錢多食荸薺即能化堅為軟若誤吞鐵骨等物腸中不能轉送覺墜者多食青菜豬脂自然送入大腸與糞同出甚效

骨哽咽喉

骨鯁咽喉最可憂吐嚥刺痛礙咽喉魚骨須用鴨涎灌獸骨狗涎灌卽瘳

註 此證由嚥物急迫骨鯁於咽喉妨礙飲食吐嚥刺痛宜急治之然有魚骨獸骨之分誤吞魚骨者用河中養蓄活鴨倒掛垂涎以磁盤接下令患人仰臥頻灌其骨盡化誤吞獸骨者用狗一隻倒掛接涎如前法頻灌其骨盡化俱效若失治咽喉腫痛潰膿宜用冰硼散吹之不可妄服涼藥若骨勢大者與飲食難下餓倒胃氣者俱屬難救

冰硼散 見口部口瘡

杖瘡

杖瘡須宜看其形已破未破要分明清涼拈痛膏破用敷之消腫並止疼未破瘀血須當砭湯劑急宜用大成玉紅膏貼瘀腐痛搽之新肉自然生

註 此瘡有已破未破之分已破者隨杖後用清涼拈痛膏敷之疼腫卽消未破瘀血內攻者急宜砭去瘀血內服大成湯便通自愈如傷處瘀腐作疼者生肌玉紅膏搽之自然腐化新生其效甚捷

清涼拈痛膏

如意金黃散一兩加樟腦末三錢和勻又用生白石灰塊三四觔許以水泡開水高石灰二三指露一宿將石灰面上浮起油水結如雲片者輕輕帶水起入盤內有水一鍾對香油一鍾竹筯攪百轉自成稠膏調前藥稀稠得所不用湯洗稍敷傷處紙蓋布紮夏月一日冬月二日方用葱湯淋洗乾淨仍再敷之以腫消痛止爲度

方歌 清涼拈痛金黃散加入樟腦末三錢杖瘡破

後多疼痛石灰水油調敷痊

大成湯 見跌撲

生肌玉紅膏 見潰瘍門

如意金黃散 見腫瘍門

夾傷

夾傷禁用藥貼敷硃砂燒酒可調塗瓊液散服隨飲醉腫勢必消痛自除復受重刑潰破者代杖湯藥速宜固氣血弱者當大補六真膏貼痛即無

註 夾傷即擠傷也禁用敷藥膏藥及泥塗等法恐後必作腫成膿受刑初宜服代杖丹以護心隨用銀硃或硃砂末燒酒調敷傷處再著一人以手十指尖輕啄患者腳心先覺癢次覺疼爲止次著一二人以筆管於患者腳面

上輕輕趕之助通血脈使傷處凹者突起四圍腫大爲度即服瓊液散隨飲至醉次日揩去所敷銀硃只用洗杖傷湯日燙二三次次日再服瓊液散其腫自消痛即止矣如復受重刑以致破潰者外貼瓊液膏內服代杖湯繼宜大補氣血易於收功生肌時換貼六真膏其效甚捷

代杖丹

丁香 蘇木

蚯蚓去土　無名異
丹皮　肉桂
木鱉子　乳香
沒藥　自然銅各一兩火煅醋淬七次
右為末煉蜜和丸二錢重用一丸黃酒化下
方歌 代杖護心血不攻丁香蘇木蚓無名丹皮肉
桂木鱉子乳香沒藥自然銅
瓊液散
鬧羊花搖去梗蒂葉洗去灰沙曬乾砂鍋微焙

為末每服五分壯者七分先飲醉酒至半酣
次用調藥服下再飲至大醉為度靜卧勿語
語則發麻至次日其麻方解消腫止疼其功
甚捷連服二五次弱者間一日再服
方歌 瓊液散消瘀血滯豫酌酒至半酣時鬧羊花
末調服下瓊漿復飲醉如癡
洗杖湯
陳皮　透骨草
南星　天門冬

地骨皮　天靈蓋各五錢
象皮一兩切碎
水煎浸洗日二三次
方歌 洗杖湯陳透骨星天冬地骨共天靈象皮木
煎日勤洗夾傷消腫又除疼
瓊液膏
當歸尾　鬧羊花
紅花　白芷
蒲黃各二兩

香油一觔浸藥七日煠枯去渣入白蠟黃蠟
各一兩溶化盡絹濾淨稍溫再入冰片六分
沒藥乳香末各六錢攪勻攤貼
方歌 瓊液膏貼夾傷破歸鬧紅花芷蒲黃油煠又
下白黃蠟再加冰片沒乳香
代杖湯
乳香　沒藥
蘇木各二錢　蒲黃
木通　枳殼麩炒

甘草生　當歸尾

丹皮　木耳

穿山甲各一錢炙研　土木鱉五個焙

酒水煎服

方歌 代杖湯醫夾傷驗乳沒蒲黃通枳甘歸尾丹皮鱉木耳酒煎蘇木炙穿山

六真膏

樟腦三兩　孩兒茶

滴乳香　血竭

沒藥　三七各三錢

共為末用豬脂油十二兩盌盛水煮化將藥入油內和勻攤貼

方歌 六真膏貼夾杖傷樟腦兒茶滴乳香竭沒三七脂油化和敷諸瘡也相當

竹木刺入肉

諸刺入肉係外傷螻蛄搗塗最為良如刺已出仍作痛再塗螻蛄即無妨

註 諸刺入肉外傷之證也頗淺者以鍼撥出硬深者搗螻蛄塗之少時即出如刺已出而仍作痛者再以螻蛄塗之即愈

破傷風

皮肉損破外傷風初覺牙關噤不鬆甚則角弓反張狀吐涎抽搐不時寧四因動靜驚潰審將縮神昏不語內在表宜汗裏宜下半表半裏以和平

註 此證由破傷皮肉風邪襲入經絡初起先發寒熱牙關噤急甚則身如角弓反張之狀口吐涎沫四肢抽搐無有寧時不省人事傷口銹澁然傷風有四因動受靜受驚受瘡潰後受皆可傷風動而受者怒則氣上其人跳躍

皮肉觸破雖被風傷風入在表因氣血鼓旺不致深入屬輕靜受者起作和平之時氣不充鼓偶被破傷風邪易於入裏屬重驚受者驚則氣陷偶被傷破風邪隨氣直陷入陰多致不救屬逆若風邪傳入陰經者則身涼自汗傷處反覺平塌陷縮甚則神昏不語噤口舌短其證貴乎早治當分風邪在表在裏或半表半裏以施汗下和三法如邪在表者寒熱拘急口噤咬牙宜服千里奔散或雄鼠散

汗之次以蜈蚣星風散頻服追盡臭汗如邪在裏者則驚而抽搐臟腑秘澁宜江鰾丸下之如邪在半表半裏無汗者宜羌麻湯主之若頭汗多出而身無汗者不可發汗宜榆丁散和之若自汗不止二便秘赤者宜大芎黃湯主之又有發表太過臟腑雖和自汗不止者宜防風當歸散服之發表之後表熱不止者宜小芎黃湯服之攻裏之後裏熱不止宜栝石湯服之若傷時血出過多不可再汗宜

當歸地黃湯主之至於生瘡潰後受風者因生瘡潰而未合失於調護風邪乘虛侵入瘡口先從瘡圍起粟作痒重則牙緊項輭下視不宜發汗誤汗令人成痓當以參歸養榮湯加蟬蠍主之先固根本風邪自定若手足戰掉不已者宜硃砂指甲散主之若痰盛抽搐身涼者宜黑花蛇散主之外治之法遇初破之時一二日間當用灸法令汗出其風邪方解若日數已多亦禁用灸法宜羊尾油煮微

熱綿包裹熱熨破處數換拔盡風邪未盡者次日再熨兼用漿口水洗之日敷玉真散至破口不銹生膿時換貼生肌玉紅膏緩緩收斂拔劉完素只論三陽汗下和三法而不論三陰者葢風邪傳入陰經其證已危如腹滿自利口燥咽乾舌捲囊縮等類皆無可生之證故置而不論也

千里奔散

用行遠路騾蹄心陰陽瓦煅存性研細每服三錢熱黃酒沖服

方歌 千里奔散破傷風口噤拘急寒熱攻騾蹄火煅存性研每服三錢黃酒沖

雄鼠散

活雄鼠一枚用鐵線縛繞陰陽瓦煅存性研爲細末作一服熱黃酒調下

方歌 雄鼠破傷風搐表活鼠一枚鐵線繞陰陽瓦煅存性研酒調盡服風邪了

蜈蚣星風散

蜈蚣二條 江鰾三錢
南星 防風各一錢五分

共研細末每用二錢黃酒調服一日二服

方歌 蜈蚣星風邪未散搜風發汗去風源南星江鰾防風末酒服經絡自通宣

江鰾丸

天麻 雄黃各一錢
蜈蚣二條 江鰾
殭蠶炒 野鴿糞炒各五分

共研細末作兩分一分飯丸如梧桐子硃砂爲衣一分加巴豆霜二分五釐飯丸如梧桐子大每用硃砂藥二十丸加巴豆藥一丸二服加二丸白滚水送下至便利爲度再服硃砂藥病愈即止

方歌 江鰾破傷風入裏驚兼抽搐下之宜天麻蜈蚣殭鴿糞雄黃巴霜丸硃衣

羌麻湯

羌活 麻黃

川芎　防風
枳殼麸炒　白茯苓
石膏煅　黄芩
細辛　甘菊花
蔓荊子　前胡
甘草生各七分　白芷
薄荷各五分

生薑三片水二鍾煎八分服

方歌　羌麻湯芎風枳殼苓芷石膏芩薄荷細辛菊蔓前甘草發汗破傷風即瘥

榆丁散

防風　地榆
紫花地丁　馬齒莧各五錢

共研細末每服三錢溫米湯調下

方歌　榆丁破傷風爲患頭汗身無不宜散此藥米湯服解和防榆地丁馬齒莧

大芎黄湯

黄芩　羌活
大黄各二錢　川芎一錢

水煎服以微利爲度

方歌　大芎黄治破傷風汗多便秘小水紅水煎黄芩與羌活大黄切片共川芎

防風當歸散

防風　當歸
川芎　生地各一錢五分

水煎服

方歌　防風當歸表太過臟腑雖調汗出多只將四味水煎服川芎生地共相和

小芎黄湯

川芎三錢　黄芩二錢
甘草生五分

水煎溫服

方歌　小芎黄湯發散後表熱猶存用此醫芎芩甘草煎溫服退熱除根神效奇

栝石湯

栝蔞仁九錢　滑石一錢五分

蒼朮米泔水浸炒　南星
赤芍　陳皮各一錢
白芷　黃蘗
黃芩　黃連各五分
甘草生二分
生薑三片水三鍾煎一鍾服之
方歌　括石芍芷蘗芩連蒼朮南星陳草煎醫治破傷風下後熱猶不解服之痊

當歸地黃湯

當歸　熟地
川芎　藁本
白芍酒炒　防風
白芷各一錢　細辛五分
水煎服
方歌　當歸地黃芎藁本白芍防風芷細辛破傷之時血出甚服此滋榮風不伎

參歸養榮湯

人參　當歸
川芎　白芍酒炒
熟地　白朮土炒
白茯苓　陳皮各一錢
甘草炙五分
生薑三片紅棗肉二枚水煎服
方歌　參歸養榮榮衛虛潰瘡失護風邪居生薑三片一枚棗八珍湯內入陳皮

硃砂指甲散

人手足指甲燒存性用六錢

硃砂　南星
獨活各二錢
共研細末每用四錢熱黃酒調下
方歌　硃砂指甲散神效破傷風伎手足搖每用四錢熱酒服南星獨活指甲燒

黑花蛇散

麻黃炙一兩　黑花蛇六錢即烏蛇酒浸
天麻　白附子
乾薑　川芎

附子製　草烏泡去皮各五錢

蠍稍二錢五分

共研細末每服一錢熱黃酒調下日二服

方歌 黑花蛇散蠍麻黃天麻白附子乾薑川芎附子草烏泡善却風痰斃破傷

玉真散

白芷　南星

白附子　天麻

羌活　防風各一兩

共研細末唾津調濃敷傷處如破傷風初起角弓反張牙關緊急每用三錢熱童便調服亦妙

方歌 玉真散芷共南星白附天麻羌活風破傷風襲傳經絡熱酒調服立奏功

生肌玉紅膏見潰瘍門

發痙

潰瘍發痙類破傷有汗爲柔無汗剛膿血出多成此證補正驅邪要審詳

註 此證勢類破傷風牙緊體強肢搐背反有汗曰柔痙無汗曰剛痙由潰瘍亡血過多所致治宜大補氣血以十全大補湯加鈎藤鈎梔子天麻服之不應者服獨參湯手足逆冷加桂附誤作風痙汗之則危

十全大補湯

獨參湯俱見潰瘍門

湯火傷

湯燙火燒皮爛疼皰起挑破使毒輕煩躁作嘔防毒陷便秘神昏氣喘凶

註 此證係好肉暴傷湯燙火燒皮膚疼痛外起燎皰即將皰挑破放出毒水使毒輕也其證雖屬外因然形勢必分輕重輕者施治應手而愈重者防火毒熱氣攻裏令人煩躁作嘔便秘甚則神昏悶絕初傷用冷燒酒一鍾於無意中望患者胸前一潑被吃一驚其氣必

一吸一呵則內之熱毒隨呵而出矣仍令煩悶者以新童便灌之外初用清涼膏塗之解毒止痛不致臭爛次以罌粟膏塗之痛止生膿時換黃連膏貼之收斂火毒攻裏者宜四順清涼飲服之務令二便通利則毒熱必解初終禁用冷水井泥浸溻傷處恐熱毒伏於內寒滯束於外致令皮肉臭爛神昏便秘端肩氣喘多致不救外花砲火藥烘燎者治法同前

罌粟膏

罌粟花十五朵無花以殼代之

香油四兩將罌粟炸枯濾淨入白蠟三錢溶化盡傾入罐內待將凝之時下輕粉二錢攪勻燉水中令冷取出臨用時抿腳挑膏于手中捺化搽於傷處綿紙蓋之日換二次其痛自止次日用軟帛挹淨腐皮再搽之

方歌 罌粟膏醫湯火燒香油罌粟共煎熬白蠟更兼真輕粉患上搽塗痛即消

清涼膏

水潑開石灰末一升加水四碗攪渾澄清取清汁一碗加香油一碗以筋順攪數百轉其稠黏如糊用鴨翎蘸掃傷處

黃連膏 見鼻部

四順清涼飲 見面部

凍瘡

凍瘡觸犯嚴寒傷氣血肌肉硬腫殭凉水揉溻覺熱散大忌烘火立成瘡

註此證由觸犯嚴寒之氣傷及皮肉着凍以致氣血凝結肌肉硬腫殭木不知痛癢即在着凍之處埊衣揉搓令氣血活動次用凉水頻洗覺熱殭木處通活如故則已若日久凍殭疙瘩不散用氷一塊絹包溻之以殭疙瘩化盡爲度此從治之法也若暴凍即着熱或進煖屋或用火烘湯泡必致肉死損形輕則潰爛重則骨脫筋連急剪去筋否則淩淫好肉初治宜人參養榮湯加醇酒服之潰爛者外按癰疽潰瘍治法亦有經年不愈者用獨勝膏敷之甚效

獨勝膏

於六月初六十六二十六日用獨頭蒜杵爛日中曬熱塗於凍發之處即於日中曬乾忌患處著水

人參養榮湯見潰瘍門

人齩傷

人齩係受牙毒傷腫痛臭爛異尋常始終惟宜童便洗蟾酥條餅功最良

註此傷由人牙齒食用炙煿之物漸漬有毒故一受其傷則腫痛臭爛異於尋常初齩時用熱童便浸傷處洗去牙黃汚血貼蟾酥餅以萬應膏蓋之出微膿即愈若失治則爛痛發腫仍用童便浸洗次用油紙撚點火於患處薰之良久挿蟾酥條如傷口大作餅罨上萬

應膏蓋之俟腫消時用葱白二兩甘草五錢水煎日洗一次換生肌玉紅膏蓋貼萬應膏收口一法隨於齩後即用童便洗之大糞塗之腫潰時人中黃熬湯時洗較諸治法尤覺神效

蟾酥餅

蟾酥條 俱見疔瘡門

萬應膏

生肌玉紅膏 俱見潰瘍門

熊虎狼傷人

熊虎狼傷致成瘡內外服洗葛根湯青布燃薰鐵湯洗獨窠栗子嚼塗傷

註熊虎狼牙爪傷人皮肉成瘡者初宜葛根濃煎內服一二鍾外洗日十度或煮生鐵有味者洗之又用青布急捲爲繩燃着納竹筒中注瘡口薰之出毒水次宜獨窠栗子生嚼塗傷口效

馬齧傷

馬齧傷時損肌肉栗子嚼爛敷患處若逢毒氣入
裏者馬齒莧湯速宜服

註 此傷用栗子嚼爛敷之毒氣入裏心煩嘔悶
者馬齒莧煎湯飲之即效外用馬鞭子脫手
及鞭穗煅灰存性研末豬脂搗合貼之俱效

瘋犬齧傷

瘋犬齧傷毒最深刺吮艾灸尿洗淋頂心紅髮當
拔去三年禁忌保終身

註 犬因五臟受毒而成瘋犬故經其齧必致傷
人九死一生之證也初被齧時急就齧處刺
令出毒血以口含漿水吮洗傷處或以拔法
拔之或以人尿淋洗拭乾即用核桃殼半邊
以人糞填滿罨在齧處上着艾灸之殼焦糞
乾再易灸至百壯以玉真散唾津調敷次日

再灸漸灸至三五百壯為度於初灸時即服
扶危散逐惡物血片從小水中出若毒物血
片堵塞莖中致小水澀滯若淋者即服琥珀
碧玉散以通利之被齧之人頂心有紅髮一
根速當拔去一法用豆豉研末香油調稠丸
如彈子大常揩拭所齧處掐開看豉丸內若
有狗毛茸茸然此係毒氣已出易丸再揩至
無茸毛方止長效始終禁忌必當慎重終身
忌食狗肉及蠶蛹赤豆百日內忌見麻物忌

飲酒三年內忌食一切毒物及房事可常食杏仁以防其毒若治遲犬毒入心煩亂腹脹口吐白沫者用虎頭骨虎牙虎脛骨爲末酒調二錢服之若發狂叫喚人聲似犬聲眼神露白者逆終始犯禁忌者不救

扶危散

斑蝥 按日數用之如犬咬已兌七日用七個十日用十個去翅足加糯米同炒去米

滑石 一兩水飛　雄黃 一錢

麝香 二分

共研細末每服一錢溫酒調下不飲酒者米湯調下

方歌 扶危散治瘋犬齩斑蝥糯米一同炒滑石雄黃與麝香研加酒服毒即掃

琥珀碧玉散

滑石 六兩　甘草 一兩

琥珀 五錢　青黛 八分

共研細末每服三錢燈心煎湯調下

方歌 琥珀碧玉用六一黛珀同加研極細燈心湯

調服三錢滑澁能醫小水利

瘋犬齩傷拔法

用砂燒酒壺兩個盛多半壺燒酒先以一壺上火令滾無聲傾去酒即按在破傷瘡口拔出污黑血水滿則自落再以次壺仍按瘡口輪流提拔以盡爲度其證立愈

玉眞散 見破傷風

馬汗驢涎入瘡

潰瘡誤犯馬汗傷焮痛紫腫延四旁急砭腫處出紫血烏梅嚼爛塗敷良患者煩熱毒攻腹強弱量服馬莧湯更有驢涎入瘡者冬瓜青皮末敷瘡

註 此證係潰瘡未合誤入馬汗之毒以致瘡口四旁忽復焮痛紫腫宜急砭腫處令出紫血烏梅嚼爛塗於瘡上若患者煩悶發熱恐毒入腹以致不救急用醇酒濃煎馬齒莧飲之盡醉爲效但馬齒莧其性寒滑凡瘡潰未合氣血未復而又受此汗毒必量人壯弱用一兩或五錢更有驢涎入瘡者形證與馬汗毒同宜用冬瓜片下青皮曬乾研末敷之熬湯洗之亦可毒甚者亦用馬齒莧酒飲之立效

蛇齩傷

蛇齩傷時即飲醋仍宜用繩紮患處再服五靈共雄黃腫消口合自如故

註 凡被蛇齩傷者即時飲好醋一二碗使氣不隨血走以繩紮傷處兩頭若昏困宜用五靈脂五錢雄黃二錢五分共爲末酒調二錢灌之少時齩處出黃水水盡則腫消以雄黃末摻之口合而愈

蜈蚣咬傷

蜈蚣咬傷用雄鷄倒控鷄涎手蘸之抹搽傷處痛立止甚飲鷄血最相宜

註此傷取雄鷄倒控少時以手蘸鷄口內涎抹搽傷處其痛立止甚者生鷄血乘熱飲之立效

蠍螫 蠆螫

蠍螫急取大蝸牛搗爛塗之痛立休蠆螫須將苧根搗取汁搽塗患即瘳

註凡蠍螫取大蝸牛一個搗爛塗之其痛立止一時不得蝸牛即將螫處擠去毒水急用膏藥烤熱貼之亦能止痛蠆螫者用苧根搗汁塗之即愈

射工傷

射工傷人必癢痛甚則骨肉爛成瘡豆豉搗敷白芷洗已爛海螵蛸末良

註射工即樹間雜毛蟲也又名犀夠蟲人觸着則能放毛射人初癢次痛勢如火燎久則外癢內痛骨肉皆爛諸藥罔效用豆豉清油搗敷痛癢之處少時則毛出可見去豆豉用白芷煎湯洗之如肉已爛用海螵蛸末摻之即愈

蚯蚓傷

蚯蚓皷傷受毒氣眉鬚脫落全無跡法用鹽湯頻頻洗久則其毒自然去

註蚯蚓皷傷即受蚯蚓之毒令人眉鬚皆落狀如大麻風但夜則蚓鳴於體中為異耳宜用鹽湯頻頻洗之其毒自去

天蛇瘡

天蛇瘡發肌膚中似癩非癩是其形證因草內蜘蛛毒復被露水侵始生

註此證生於肌膚似癩非癩是草中花蜘蛛螫傷復被露水所侵而致法宜秦艽一味煎湯徐徐飲之外敷二味拔毒散甚效

二味拔毒散見腫瘍門

蠼螋傷

蠼螋隱壁尿射人誤着皮膚水疱溜痛如火烙如豆大鹽湯二味拔毒侵

註此蟲一名多脚蟲藏於壁間以尿射人若誤中其毒令人皮膚起燎漿水疱痛如火烙初如飯糁次如豆大宜鹽湯綿湯搭上數換即消甚則毒延偏身搔癢不休宜二味拔毒散敷之甚效

二味拔毒散見腫瘍門

百蟲入耳

蟲偶入耳勿驚慌燒肉香氣近耳旁獨坐夜燈引蟲出麻油滴耳使蟲殃

注百蟲偶然誤入耳中如蠅蚊小蟲以麻油數點滴入耳竅蟲即死取出如蚰蜒等物入者以肉炙香置於耳旁蟲聞香自出夜間暗入者切勿驚慌响叫逼蟲內攻宜端坐點燈光向耳竅其蟲見光自出若對面有人其蟲不出人皆旁避方效

御纂醫宗金鑑卷七十六

編輯外科心法要訣目錄

嬰兒部

赤遊丹毒
胎瘤
紅絲瘤
胎癥瘡
痘癰
葡萄疫
胎驚丹毒
滯熱丹毒
嬰兒瘡瘍
垂癰
胎風
臍瘡
臍突
陰腫
脫肛

肛門作癢
遺毒
痘裏夾癭
痘疔
痘裏發丹
痘爛
痘風瘡
逐日人神所在不宜鍼灸歌
十二時人神歌
十二支日人神所在歌
十干日不宜用鍼犯之病多反覆
九宮尻神圖
九宮尻神歌
升打靈藥閉罐法
升打靈藥封罐口法
煉金頂砒法
製寒食麵法

御纂醫宗金鑑卷七十六

編輯外科心法要訣

嬰兒部

赤遊丹毒

胎毒初患赤遊丹腹肢先後內外分內服外貼兼砭血紅輕紫重黑難痊

註小兒赤遊丹之證皆由胎毒所致欲發之時先身熱啼叫驚搐不寧次生紅暈由小漸大其色如丹遊走無定起於背腹流散四肢者順起於四肢流入胸腹者逆或初生之後外用熱水洗浴兼以火烘衣物觸動內毒遂成此證治之者先宜砭出惡血看血色紅者輕紫者重黑者死次宜牛羊肉片徧貼紅暈處微乾再易俟肉片不乾換如意金黃散用藍靛清汁調敷內初服大連翹飲次服消毒犀角飲大便秘結加生大黃三五分若煩躁唇焦而赤者宜服五福化毒丹若失治毒氣入裏腹脹堅硬聲音雌啞吮乳不下嚥者宜服

紫雪散下之一二日間身輕腹軟熱退身凉砭處肉活乳哺如常者生反此者不治

大連翹飲

連翹去心　當歸

赤芍　防風

木通　滑石水飛

牛蒡子炒研　蟬蛻去足翅

瞿麥　石膏煅

荊芥　甘草生

柴胡　黃芩

梔子生研　車前子各五分

水二鍾燈心二十根煎八分子與乳母同服

方歌　大連翹飲赤遊丹歸芍防通滑蒡蟬瞿麥石膏荊芥草柴芩梔子共車前

消毒犀角飲

犀角鎊　防風各一錢

甘草生五分　黃連生三分

水二鍾燈心二十根煎四分徐徐服之

方歌　消毒犀角飲黃連防風甘草共和煎赤遊丹毒啼驚搐氣粗身熱服之安

五福化毒丹

黑參　赤茯苓

桔梗各二兩　牙消

青黛　黃連

龍膽草各一兩　甘草生五錢

人參　硃砂各三錢

冰片五分

共研細末煉蜜爲丸如芡實大金箔爲衣每服一丸薄荷燈心煎湯化服

方歌　五福化毒清熱速瘡瘤丹毒服即除參苓桔草消冰黛黃連膽草黑參硃

如意金黃散見腫瘍門

紫雪散見舌部重舌

胎瘤

嬰兒初產患胎瘤胎熱瘀血是根由色紫漸大熟透刺放出膿汁自可瘳

註此證由胎前孕母積熱以致胞熱更兼血瘀滯結而成多生頭上及胸乳間初如李核漸大如饅色紫微硬漫腫不甚疼痛嬰兒初生即有者俟過滿月熟透方可鍼之放出赤豆汁或膿水汁其腫即消初服五福化毒丹兼貼黃連膏潰貼生肌玉紅膏生肌斂口若滿月後生者必待膿鼓熟透鍼之若瘤皮含血絲者詳註於紅絲瘤

五福化毒丹見赤遊丹毒

黃連膏見鼻部鼻瘡

生肌玉紅膏見潰瘍門

紅絲瘤

嬰兒初生紅絲瘤皮含血絲先天由精中紅絲腎伏火相傳患此終難瘳

註此證一名胎瘤發無定處由小漸大嬰兒落草或一二歲之間患之瘤皮色紅中含血絲亦有自破者治法雖同胎瘤但此患由先天腎中伏火精有血絲以氣相傳生子故有此疾終變火證潰處亦難收斂

胎癥瘡

癥瘡始發頭眉間胎中血熱受風纏乾癢白屑濕淫水熱極紅暈類火丹

註此證生嬰兒頭頂或生眉端又名奶癬癢起白屑形如癬疥由胎中血熱落草受風纏綿此係乾癥有誤用燙洗皮膚起粟搔癢無度黃水浸淫延及遍身即成濕癥俱服消風導赤湯乾者抹潤肌膏濕者用嫩黃蘗頭末與滑石等分撒之靨痂過厚再以潤肌膏潤之

又有熱極皮膚火熱紅暈成片遊走狀如火丹治法不宜收斂只宜外發宜服五福化毒丹亦以潤肌膏抹之癢甚者俱用烏雲膏搽之乳母俱忌河海魚腥雞鵝辛辣動風發物緩緩自效

消風導赤湯

生地　赤茯苓各一錢

牛蒡炒研　白鮮皮

金銀花　南薄荷葉

木通各八分　黃連酒炒

甘草生各三分

燈心五十寸水煎徐徐服

方歌 消風導赤醫胎癥疎風清熱蒡黃連白鮮生地赤苓薄銀花燈草木通甘

烏雲膏

松香末二兩　硫黃末一兩

研勻香油拌如糊攤南青布上少半指厚捲成條線紮之再用香油泡一日取出刮去餘

油以火點著一頭下用粗碗接之布灰陸續剪去取所滴藥油浸冷水內一宿出火毒抹用

方歌 烏雲膏搽胎癥瘡油拌松香末硫黃布攤捲紮香油泡火燃去灰用油良

潤肌膏見頭部白屑風

五福化毒丹見赤遊丹毒

痘癰

痘癰毒留經絡中發無定處腫不紅留於肌肉為治易結於骨節難成功

註此證因出大痘漿灌不足以致毒漿不得透發留結經絡之中隨處可生小如李者為毒大如桃者為癰漫腫不紅亦無焮痛身熱多煩若生單個者毒在肌肉屬順易治連發數處者船小載重屬險若結於骨節之間或成對發出者其毒已盛潰破之後滲泄氣血不

能斂口屬逆初發不可強消俱宜服透膿散外敷烏龍膏膿熟鍼之加味太乙膏貼之若氣血虛弱者兼服保元湯潰後潮熱全退毒氣方淨否則他處又發忌生冷硬麵發物

保元湯

人參 白朮土炒

當歸 黃耆各一錢

甘草炙三分

生薑一片紅棗肉二枚水二鍾煎八分食遠服

方歌 保元湯補真元氣脾胃虛弱服更宜人參白朮炙甘草當歸薑棗共黃耆

透膿散

烏龍膏 俱見腫瘍門

加味太乙膏 見潰瘍門

葡萄疫

葡萄疫同葡萄狀感受癘疫鬱凝生徧身發點青紫色毒攻牙齒類疳形

註此證多因嬰兒感受癘疫之氣鬱於皮膚凝結而成大小青紫斑點色狀若葡萄發於徧身惟腿脛居多甚則邪毒攻胃以致牙齦腐爛臭味出血形類牙疳而青紫斑點其色反淡久則令人虛羸初起宜服羚羊角散久虛者宜服胃脾湯米泔水漱口以非疳散日擦四五次即效近見中年之人下虛者亦患此

證治法同前

羚羊角散

羚羊角鎊　麥冬去心

黃芩　知母

牛蒡子炒研　防風

元參各八分　甘草生二分

水二鍾淡竹葉十片煎六分食遠服

方歌羚羊角散麥冬芩知蒡防風草元參葡萄疫發初宜服煎加竹葉效如神

胃脾湯

白朮土炒　遠志去心

麥冬去心　沙參

茯神　陳皮各六分

五味子　甘草炙各五分

水二鍾煎六分食遠服

虛弱自汗者去沙參加人參黃耆各五分

方歌胃脾湯治葡萄疫日久虛羸弱宜朮遠麥

冬五味子沙參甘草茯陳皮

非疳散

冰片四分　人中白煆去臭氣存性

五倍子各二兩炒茶褐色存性

共研細末先用米泔水漱口後擦此藥

方歌非疳中白煆五倍二味同研冰片兌齊治諸疳患處擦清熱止疼去臭穢

胎驚丹毒

胎驚丹毒面初生形如水痘根微紅時出時隱延頸項總發丹毒赤遊同

註此證因孕母受驚傳襲于胎嬰兒初生之後週歲以上忽兩眼胞紅暈面色靑黯煩熱夜啼或面如燕脂此屬伏熱在內散發於面狀如水痘根脚微紅時出時隱延及頭項總發丹毒初用四聖散洗目其形色順逆治法皆同赤遊丹若此患延及胸乳痰喘抽搐此屬火毒攻裏防變驚風宜服百解散五和湯救之

四聖散

木賊　秦皮

紅棗子　燈心

黃連各五錢

共硏粗末每用二錢水一鍾煎七分去渣頻洗兩目

方歌　四聖散治熱毒侵木賊秦皮棗燈心再入黃連硏粗末煎湯去渣洗目頻

百解散

乾葛一兩五錢　升麻

赤芍各二兩　甘草生一兩五錢

黃芩一兩　麻黃炙七錢五分

肉桂二錢五分揀薄者刮去粗皮

共硏粗末每服二錢水一鍾薑二片葱一根煎七分不拘時溫服

方歌　百解驚丹毒內攻煎服不致變驚風乾葛麻黃芩桂草升麻赤芍共薑葱

五和湯

大黃　枳殼麸炒

甘草炙各七錢五分　赤茯苓

當歸酒洗各五錢

共硏粗末每服二錢水一鍾煎七分不拘時服

方歌　五和甘草並當歸赤苓枳殼大黃隨驚丹延乳添抽搐煎服火毒即刻推

滯熱丹毒

滯熱丹毒赤遊形傷乳多食滯熱生較之赤遊走緩慢先宜消食次宜清

註 此證初發形若赤遊丹較之赤遊丹遊走緩慢因嬰兒乳食過多不能化蘊熱於內達於肌表而生發熱面赤口酸舌有黃胎宜服保和丸先消食滯若脣焦便秘者宜一捻金服之丹毒仍作者宜犀角散服之其餘治法俱按赤遊丹

保和丸

白茯苓　半夏製

山查肉　神麯炒各一兩

陳皮　蘿蔔子炒

連翹去心各五錢

右研細末粥丸如梧桐子大每服三十丸白滾水化下

方歌 保和丸用茯苓夏陳皮蘿蔔子山查神麯連翹丸水服能消乳積效堪誇

一捻金

人參　大黃

黑丑　白丑

檳榔各等分

共爲細末每服一字蜜水調下

方歌 一捻金醫食火積脣焦便秘服通利大黃黑白丑人參檳榔爲末須加蜜

犀角散

犀角屑　升麻

防巳　山梔生

朴消　黃芩

黃耆各一錢　牛黃五分

右爲細末每服五分竹葉煎湯調下量兒加減用之

方歌 犀角散消丹毒赤升麻防巳共山梔消芩黃耆牛黃末竹葉湯調服無時

嬰兒瘡瘍

嬰兒瘡瘍乳火成因食厚味滯火凝更兼六淫氣
感受腫潰治法按癰疽

註 凡嬰兒生瘡瘍小癤多由乳母七情之火或過週歲能飲食者由過食乾焦厚味而生滯火更兼六淫之氣感受皆能成之但發表攻裏托裏消毒等法及腫潰外治俱按癰疽腫瘍潰瘍門嬰兒純陽火證居多非峻劑不能勝其病但肌體臟腑柔脆應效即止不可過劑

垂癰

嬰兒垂癰上腭生俠前結腫色紅疼積熱凝結宜
刺破服五福丹抹冰硼

註 此證生於喉前上腭下垂如珠紅腫脹痛不能吮乳三四日後宜用鍼刺一二分放出膿血其腫痛即減由積熱凝結而成宜服五福化毒丹兼用冰硼散抹於癰處日三抹之乳母當忌魚腥諸物

五福化毒丹 見赤遊丹毒

冰硼散 見口糜

胎風

胎風初起皮色紅狀如湯潑火燒同證由孕母多積熱清胃湯服即有功

註此證又名胎赤嬰兒初生身熱皮紅狀如湯潑火燒由孕母過食辛香熱物以致脾胃積熱乳母宜服清胃湯嬰兒亦飲少許外皮燬赤用煅石膏研細敷之如無燬赤乃孕母脾虛用粳米粉敷之若兒大能食米麪身熱皮紅者係脾熱內蒸濕氣外乘之故即名玉爛瘡宜如意金黃散蜜水調敷內服導赤湯即效

清胃湯見齒部牙衄

如意金黃散見腫瘍門

導赤湯見口部口糜

臍瘡

臍瘡兒臍被水傷草紙燒灰敷最良久而不愈風邪襲恐發風癇緊緊防

註此證由水濕傷臍所致若久不愈則發抽搐又因風邪外襲也恐變風癇宜大草紙燒灰敷之或加枯礬或再加龍骨燒灰等分入麝香少許撒之即效

臍突

臍突胎中積熱生　總由孕母失調停　兒臍突出腫赤大　宜清母子即臍平

註 此證兒臍突出赤腫虛大是也由孕母失於調停兒在胞胎受母積熱既生之後兒臍即腫宜清母子之熱兒臍不必敷治恐反為害如旬日外兒臍忽腫如吹不赤撚動微響或驚悸作啼者宜用白芍藥湯加薏苡仁令兒服之外以外消散敷之即愈

白芍藥湯

白芍酒炒一兩　澤瀉五錢

甘草生一錢二分　肉桂揀薄者刮去粗皮一錢

共研粗末每用二錢水一鍾煎四分空心頻服

臍下痛加鉤藤一錢生薑一片食鹽五釐

方歌 白芍藥湯澤瀉甘　再加肉桂共粗研　專醫臍突驚啼叫　空心煎服整二錢

外消散

大黃　牡蠣煅各五錢

朴硝二錢

共研細末用活田螺數十枚洗淨再以清水半盆養之過宿取田螺清水調藥敷於患處其螺仍放水中勿害方效

方歌 外消散敷臍突腫　大黃煅牡蠣朴硝活田螺用清水泡過宿　取水將藥調

陰腫

陰腫之證小兒生久坐陰濕寒氣凝或因怒叫氣結閉寒熱虛實擇可行

註 此證即古名脫囊由久坐陰濕之地爲寒氣所凝而成間或有因怒叫氣閉結聚於下而成者俱宜用桃仁丸主之若寒氣客於厥陰少陰者則陰囊腫痛腹痛冷汗引縮二子入腹痛止方出謂之內弔宜烏梅散勻氣散主之有陰莖全縮不見或不縮而陰囊腫大光

亮不燥不疼者肝腎氣虛也宜橘核煎湯調勻氣散服之囊腫及四肢俱腫二便不利者膀胱蘊熱風熱相乘也宜白牽牛散主之若女兒陰戶腫脹者心熱相傳也宜導赤湯服之或五苓散用薏苡車前子煎湯調服外治法俱敷立消散甚效

桃仁丸

桃仁 七錢五分 去皮尖炒微黃　白蒺藜 微炒去刺

桂心　丹皮 各五錢

黑牽牛 二錢五分 頭末

右爲細末煉蜜和丸如黍粒大每服十丸黃酒送下

方歌 桃仁丸逐陰腫疾怒氣閉結或濕襲蒺藜牽牛桂丹皮研末蜜丸如黍粒

烏梅散

烏梅肉　甘草 半生半炙

元胡索 各五錢　鈎藤鈎

乳香　沒藥 各二錢五分

共搗粗末每服二錢水一鍾煎七分服

方歌 烏梅散用乳香沒鈎藤甘草元胡索陰囊腫兼腹中疼煎服必先研粗末

勻氣散

桔梗 炒二兩　陳皮 去白一兩

茴香 炒　縮砂仁 炒各五錢

甘草 炙四錢　薑炭 二錢五分

共研細末每服五分或一錢白滾水調下

方歌 勻氣散因外寒侵陰囊腫痛汗淋淋桔梗陳

皮甘草炙茴香鹽炭縮砂仁

白牽牛散

白牽牛半生半熟　甘草炙

橘紅　白朮土炒

桑白皮　木通各一錢

水煎服

方歌　白牽牛散草橘紅白朮桑白皮木通陰囊相兼四肢腫能逐膀胱熱結壅

五苓散

白朮土炒　赤茯苓各一錢五分

豬苓　澤瀉各一錢

桂心五分

水煎服

方歌　五苓白朮桂心加赤茯苓除心火邪豬苓澤瀉能分利調和臟腑效堪誇

立消散

赤小豆　風化消

赤芍　枳殼

商陸各五錢 俱不宜見火曬乾共研為末

用側柏葉煎湯候冷調敷腫處

方歌　立消陰囊腫痛生因受風寒濕熱毒赤小豆與風化消芍枳同研加商陸

導赤湯見口部口糜

脫肛

小兒脫肛肺虛源補中益氣湯居先腫硬作痛除積熱臟毒翻肛臟連丸

註此證由小兒氣虛肛脫於外用補中益氣湯加羌活白芍煨薑主之如腫硬疼痛者有濕熱在內當用清熱除濕之劑以清之若生臟毒肛門翻出者以臟連丸爲主外治以五倍子老葱頭朴消煎湯洗之腫用坎宮錠子塗之俱效

補中益氣湯見潰瘍門

臟連丸見臀部痔瘡門

坎宮錠子見腫瘍門

肛門作痒

肛門作痒係蟲傷下唇必生小白瘡九味蘆薈丸與服外撒銅綠共雄黃

註此證係小兒肛門作痒由蟲蝕也視其下唇內必生小白瘡或耳之前後結小核如串珠者是也書曰下唇有瘡蟲蝕其肛宜用蘆薈丸服之外用雄黃銅綠等分爲末撒之即效

蘆薈丸見齒部牙疳

遺毒

遺毒稟受結胎先無皮身赤朱易㾦肌膚紅點次斑爛染受尚可稟毒難

註 此證係先天遺毒於胞胎有稟受染受之分稟受者由父母先患楊梅而後結胎元嬰兒生後則周身色赤無皮毒攻九竅以致爛斑患此難愈百無一生染受者乃先結胎元父母後患楊梅毒氣傳於胎中嬰兒既生則頭上坑凹肌膚先出紅點次發爛斑甚者毒攻

口角眼眶耳鼻及前陰穀道破爛初宜人中黃細末三五分土茯苓煎湯調稠日用二三服腫用太乙紫金錠水磨塗之破爛者用黃蘗蜜炙爲末撒之乾用香油調搽投藥應效者後服二黃散十中可保三四若毒延循身日夜多啼不喫乳食者屬毒甚氣微終難救

治

二黃散

胡黃連　山慈菇各一錢

甘草生一錢五分　牛黃七分

右爲細末每服三分蜜湯調服

方歌 二黃散治遺毒方胡連甘草共牛黃山慈菇研爲細末每服三分加蜜湯

太乙紫金錠見腹部脾發疽

痘裏夾癭

痘裏夾癭生頸項形如桃李瓜棗狀證兼身熱多
渴煩痰氣凝結致此恙

註 此證結於頸項或生耳後腋下形如桃李棗
瓜身熱煩渴由痰氣凝結所致痘初起即發
癭者治宜托裏消痰解毒如木通桔梗生地
甘草蟬蛻芍藥荊芥等藥缺一不可若苓連
等藥及耗爍之劑俱不可用若痘發在三四
日而作癭者則毒隨痘洩毒隨痘灌自可挽

全而無害宜服三消散倘斯時紅腫將膿一
潰則元氣洩而痘漿必不能充灌乘未潰時
急用黃耆衛元湯補之若痘至七八日灌漿
時而發癭者沖和飲子主之若痘瘡蒼蠟色
而作癭者宜消毒兼保元氣潰後宜生肌玉
紅膏貼之

三消散

當歸　赤芍
天花粉　甘草
牛蒡子炒研　白茯苓
生地黃　紅花
蟬蛻去足翅　木通
半夏製各八分

水二鍾燈心二十根煎六分服

方歌 三消痘發三四日痰凝結癭須當治歸芍天
花甘蒡苓生地紅蟬通夏製

黃耆衛元湯

黃耆　人參

當歸　桔梗
紅花　甘草炙
白芍酒炒　防風各一錢

水煎不拘時服

方歌 黃耆衛元癭腫起已潰未潰急補之人參歸
桔紅花草防風芍藥服無時

沖和飲子

麥門冬去心　人參
桔梗　當歸

黄耆　　柴胡

白芍酒炒　　白茯苓

天花粉　　荆芥

防風　　連翹去心

白朮土炒各七分

水煎服

方歌冲和飲予麥門冬參桔歸耆柴芍苓花粉荆

防翹白朮痘發七天疲氣凝

生肌玉紅膏見潰瘍門

痘疔

痘疔不與痘瘡同俗呼賊痘是其名色紫黯黑硬如石諸證蜂起難灌膿疔有多般須宜記再審何處發其形掩簾疔生舌根底大小不一最易明火珠疔生鼻孔內闘塞噴火面赤紅眼沿生疔名忘汲腫如封蛤熱煩增黎虎疔於耳內見腎毒攻耳致成形燕窩疔生兩腋下面赤譫語更腫疼注命疔生足心裏紫筋直透足股中透腸疔在肛內發痛如錐刺一般同驪龍疔生尿孔內身熱譫語便不通法按疔名施醫治自然諸證悉能平

註此證名多治不一法痘生五六日間或三五枚或六七枚雜於諸痘之間其色紫黯甚則黑硬如石有此以致諸證蜂起不能灌膿如掩簾疔生於舌根底小如黑豆大似葡萄令兒舌捲喉痛急用銀鈎鈎破儘淨惡血隨以苦茶漱口搽拔疔散再以冰片硼砂青黛黃連薄荷荆芥炒爝鹽共為細末吹用火珠疔生於鼻孔內閉塞噴火面赤眼紅亦用銀鈎

鈎破用黃連膏加氷片滴入鼻孔內服瀉金散忘汲疔生於眼沿腫如封蛤煩熱面紫宜挑破用燕脂嚼汁點之兼蒲公英菊花煎湯洗之黎虎疔生於耳內於膿成之時宜挑破搽拔疔散燕窩疔生於腋下腫硬面赤譫語如疔在左股潛注則右體之痘沉伏失色右亦如之亦挑破去其根用拔疔散搽之服消毒飲子注命疔生兩足心腫硬如錢如豆如椒有紫筋直透足股挑之去淨血用田螺水

點之次用慎火草蒜豆浸脹搗爛敷之透腸疔生肛門旁在六七朝腫硬如錐挑之銀花防風煎湯令洗之次用輕粉珍珠氷片白斂末塗之內服黃連解毒湯蠶龍疔生尿孔內於五六朝身熱譫語眼翻肢厥腹脹小水閉濇急用蜒蚰牛黃氷片麝香研末次用黃連細茶濃煎候冷取半匙調末以細軟稻心蘸之送入孔內服消毒飲子甚效

瀉金散

犀角鎊　牛蒡子炒研
紅花　生地
桔梗　赤芍
紫蘇　甘草生各一錢

水煎服

方歌 瀉金散治火毒疔面赤眼紅鼻內疼犀蒡紅花生地桔赤芍紫蘇甘草生

消毒飲子

白茯苓　生地

連翹去心　牛蒡子炒研
紅花　甘草生
犀角鎊　木通
赤芍各一錢

燈心二十根水煎服

方歌 消毒飲子苓生地翹蒡紅花甘草犀木通芍藥燈心共善却疔毒火證宜

拔疔散見牙齒部牙疔

黃連膏見鼻部鼻瘡

田螺水見臀部

黃連解毒湯見耳部黑疔

痘裏發丹

痘裏發丹因熱極宜施凉血散毒劑塗抹內服量寒凉外用化斑湯洗浴

〔註〕此證由內熱甚極而成內宜服生地牛蒡芍藥甘草木通荊穗等藥其毒自消腫痛者加柴胡羌活頭頂盛者毒湊上焦也宜用炒黃連柴胡甘草車前子梔子等藥外用化斑解毒湯洗浴量服寒凉藥及豬膽凉墨冰片塗抹丹之形色與赤遊丹毒參考

化斑解毒湯見肋部內發丹毒

痘爛

痘爛浸淫無完膚水淬茶葉帶濕鋪上隔草紙令兒臥一夜膿乾爛即除

註 此證係出痘破爛身無完膚膿水浸淫沾黏衣服宜用茶葉揉去梗入滾水一焯即撈起再揀去梗濕鋪牀上上隔草紙令兒臥之一夜膿乾甚效

痘風瘡

痘風瘡生先作癢次延成片水浸淫痘後遇風甚成癩麥餞散搽效可申

註 此證由痘後遇風所致先發細疙作癢次延成片脂水漸長浸淫宜滲濕救苦散搽之兼避風戒口甚者搔癢毒水浸淫肌無完膚即成痘癩急用十全大補湯大補氣血兼散風苦參丸以清熱解毒二方合而服之外塗麥餞散甚效

滲濕救苦散

蜜陀僧 滑石各二兩

白芷五錢

右研細末乾用白蜜調搽濕則乾撒

方歌 滲濕救苦散白芷蜜陀僧研入滑石痘風瘡起癢成片白蜜調搽可去之

麥餞散

小麥一合炒焦存性 硫黃四錢

白礬一錢

共研細又加烟膠末八錢枯礬末川椒末各三錢共和勻先以葱湯洗淨患處香油調塗油紙蓋紮三日一換

方歌 麥餞痘風成癩恙小麥炒加砒硫黃炙入烟膠枯礬末川椒香油調上良

十全大補湯 見潰瘍門

散風苦參丸 見發無定處癬

逐日人神所在不宜鍼灸歌

人神走注須當記足大指分屬初一外踝二日股內三四日在腰五日寄六手七日內踝存八腕九尻腰背十十有一日鼻柱間十二日分在髮際十三注於牙齒中十四常在胃脘聚徧身十五十六胸十有七日氣衝集十八股內足十九二十日在內踝脛二十一日手小指念二外踝神所寓肝及足兮二十三在手陽明念四日二十五日足陽明念六在胸念七膝二十八日伏於陰念九脚在膝脛室三十日分在足趺人神所在刺灸忌

十二時人神歌

子踝丑腰寅在目卯面辰頭巳手屬午胸未腹申在心酉背戌頭亥股續

十二支日人神所在歌

子不治頭君須記丑日腰耳寅胸應卯日鼻脣辰應腰巳手午心兼提徑未頭手足申頭背酉行膝背同其類戌日在陰頭面間亥日遊行頭頸位十二支神禁灸歌男除女破應該會

十干日不宜用鍼犯之病多反覆
甲不治頭乙耳喉丙肩丁背與心求戊巳腹脾庚
腰肺辛膝壬當脛收癸日不宜鍼手足十干不
犯則無憂

尻神圖

此神農所置一歲起坤二歲震逐年順飛九宮週而復始行年到處則所主敗切忌鍼灸慎勿犯之否則變生他病慎

九宮尻神歌

尻神所在有根由　坤內外踝聖人留
震宮牙口腨宜記　巽位還居乳口頭
中宮肩骨連尻骨　背面目從乾上遊
手膊兌宮難砭灸　艮宮腰項也須休
離膝肋脇鍼難下　坎肘還連肚腳求
爲醫精曉尻神訣　萬病無干禁忌憂

升打靈藥固罐法

宜用陽城罐將罐燒熱搗大蒜於罐外徧擦之再燒再擦如是三四次次以蒜醋入罐內盪之煮之以乾爲度次用黃土二分煤灰一分以馬毛以鹽水合之固罐一指厚陰乾裂縫再固必要完固聽用

升打靈藥封罐口法

入藥畢蓋鐵盞用鐵絲鈕緊用石膏無名異等分食鹽減半俱煅過爲極細末醋調成膏次加

炭火二三塊於盞內燒盞熱以鎚離藥周圍塗之隨乾隨塗以口平爲率　用石膏生白礬食鹽三味等分爲末水調塗之如前

煉金頂砒法

用鉛一觔小罐內炭火煨化投白砒二兩於化烊鉛上煉烟盡爲度取起冷定打開金頂砒結在鉛面上取下聽用

製寒食麪法

用白麪一觔外再以麪半觔水調稠厚捏成薄片二塊將前麪包合於內周圍捏緊於清明正日蒸熟掛透風處陰乾用麪包藏勿經女手愈久愈效

御纂醫宗金鑑卷七十七

編輯眼科心法要訣目錄

目睛原始歌

五輪圖

五輪所屬部位歌

五輪主五藏病歌

八廓圖

八廓部位歌

八廓所屬部位歌

八廓主六府命門包絡病歌

內因爲病歌

外因爲病歌

不內外因爲病歌

內障總名歌

內障初患久變五風歌

五風初患有餘歌　方附

五風初患不足歌　方附

黃風有餘歌　方附

黃風不足歌方附
綠風有餘歌方附
綠風不足歌方附
黑風有餘歌方附
黑風不足歌方附
烏風有餘歌方附
烏風不足歌方附
青風有餘歌方附
青風不足歌方附

圓翳歌方附
冰翳歌方附
滑翳歌方附
濇翳歌方附
浮翳歌方附
沉翳歌方附
横翳歌方附
散翳歌方附
偃月翳歌方附

白翳黃心歌方附
黑水凝翳歌方附
棗花翳歌方附
雷頭風歌方附
驚振內障歌方附
瞳人乾缺歌方附
雀目歌方附
高風內障歌方附
胎患內障歌方附

編輯眼科心法要訣

目睛原始歌

天有日月陰陽精人有二目藏府精衆精之窠爲之眼肉精上下兩胞名血精兩眥氣精白筋精爲黑骨精瞳約束裹擷系屬腦目睛原始要詳明

註天有日月猶人之有二目也天之日月乃天之陰陽之精而爲之也人之二目亦人之五藏六府之精上注於目而爲之也故衆精之窠爲之眼也肉之精爲上下胞也血之精爲兩眥也氣之精爲白眼也筋之精爲黑眼也骨之精爲瞳人也約束裹擷氣血筋骨之精其系上屬於腦不可不明此目睛之原始也

五輪之圖



肉輪屬脾主肉
血輪屬心主血
氣輪屬肺主氣
風輪屬肝主筋
水輪屬腎主骨

五輪所屬部位歌

五輪肉血氣風水肉輪兩胞血輪眥氣輪白睛風輪黑水輪瞳子自當知

註五輪者肉輪血輪氣輪風輪水輪也謂之輪者目睛運動如輪之意也上下兩胞爲肉輪內外兩眥爲血輪白睛爲氣輪黑睛爲風輪瞳人爲水輪此明五輪之部位分屬五藏也

五輪主五藏病歌

胞爲脾病眥主心肺白肝黑腎瞳人五輪爲病主

五藏寒熱虛實隨證分

註 胞為肉輪主脾病也內外二眥為血輪主心病也白睛為氣輪主肺病也黑睛為風輪主肝病也瞳人為水輪主腎病也五輪之病五藏主之其寒熱虛實當隨所現之證而分之也

八廓之圖

水廓屬膀胱又名津液廓
風廓屬膽又名養化廓
天廓屬大腸又名傳導廓
地廓屬胃又名水穀廓
火廓屬小腸又名抱陽廓
雷廓屬命門又名關泉廓
澤廓屬三焦又名清淨廓
山廓屬包絡又名會陰廓

八廓部位歌

瞳人水廓黑睛風天廓白睛部位同內眥火雷外山澤上下胞屬地廓宮

註 八廓者水廓風廓天廓火廓雷廓山廓澤廓地廓也謂之廓者猶城郭衛禦之義也瞳人屬坎水廓也黑睛屬巽風廓也白睛屬乾天廓也內眥大眥也屬離火震雷之廓也外眥小眥也屬艮山兌澤之廓也兩胞屬坤地廓也此明八廓以八卦立名示人六腑命門包絡之部位也

八廓所屬歌

津液水廓屬膀胱養化風廓是膽方傳導天廓大腸是水穀地廓胃家鄉關泉雷廓命門主抱陽內眥火小腸外眥三焦清淨澤會陰山廓包絡疆

註 內眥火小腸謂內眥火廓屬小腸也外眥三焦清淨澤謂外眥屬三焦清淨澤廓也津液廓即水廓水廓屬腎腎與膀胱為表裏膀胱為津液之府故又名也養化廓即風廓風廓

屬肝肝與膽爲表裏膽爲少陽主長養化育故又名爲傳導廓即天廓天廓屬肺肺與大腸爲表裏大腸爲傳導之官故又名爲水穀廓即地廓地廓屬脾脾與胃爲表裏胃納水穀故又名爲抱陽廓即火廓火廓屬心心與小腸爲表裏依附於腸故又名爲關泉廓即雷廓命門者龍雷之火故名關泉附於火廓也清淨廓即澤廓三焦者陽相火也蒸化水穀爲決瀆之官故名清淨附於火廓也會陰

廓即山廓包絡者陰相火也依附於心爲臣使之官故名會陰附於火廓也

八廓主六府命門包絡病歌

風廓膽腎水膀胱大腸天廓地胃鄉火廓小腸雷廓命山澤三焦包絡方

註 此明八廓所屬也風廓即風輪也風輪屬肝肝與膽爲表裏故輪主藏爲肝病廓主府爲膽病水廓即水輪也水輪屬腎腎與膀胱爲表裏故輪主藏爲腎病廓主府爲膀胱病天廓即氣輪也氣輪屬肺肺與大腸爲表裏故輪主藏爲肺病廓主府爲大腸病地廓即肉輪也肉輪屬脾脾與胃爲表裏故輪主藏爲脾病廓主府爲胃病火廓雷廓澤廓山廓即血輪之部位也血輪屬心心與小腸爲表裏故輪主藏爲心病廓主府爲小腸病其雷廓命門澤廓三焦山廓包絡皆附於血輪者以命門三焦包絡俱屬相火當稟命於君火故當附焉

按 眼科皆以五輪屬藏配五行八廓屬藏府配八卦遂使藏府混淆無所適從夫五輪既屬藏八廓自應屬府今改訂之俾學者按輪廓之部位覘之而病之在藏在府自能了然矣

內因爲病歌

內障皆因傷七情喜怒憂思悲恐驚藏府內損精不注初爲內障久成風

註 此明內障受病之因也障遮蔽也內障者從內而蔽也內障之病皆因七情過傷過喜傷

心過怒傷肝過憂傷肺過思傷脾過悲傷心過恐傷腎過驚傷膽藏府內損精氣不上注於目故初病內障久成五風烏風綠風黑風黃風青風之患其證不紅不腫瞳人色變而其光失明也

外因為病歌

外障皆因六氣生暑寒燥濕火與風內熱召邪乘隙入隨經循系上頭中

註此明外障受病之因也外障者從外而遮也

風寒暑濕燥火六氣也外障之病皆因六淫所感然必因其人內熱外蒸腠理不密相召外邪乘虛而入入項屬太陽入面屬陽明入頰屬少陽各隨其經之系上頭入腦中而為患於目焉其證赤痛腫澀眵淚翳膜遮睛也

不內外因為病歌

病由不內外因者飲食起居擊刺成邪無定體內外障細察其因無遁情

註此明不內外因受病之因也既非外感六氣又非內傷七情但因飲食不節傷飽失饑起居不慎勞役過度或遭擊振或被刺損以其邪無定體故或成內障或成外障之病當細察其所因則病無遁情矣

內障總名歌

內障初患變五風黃綠黑烏青圓冰滑澀浮沉橫散偃黃心黑水棗花形雷頭驚振及瞳缺雀目高風胎患名二十四證為內障須當一一辨分明

註內障初患尚未失明之證也久而變成五風

之證瞳變黃色者名曰黃風變綠白色者名曰綠風變黑色者名曰黑風變烏紅色者名曰烏風變青色者名曰青風圓者圓翳也冰者冰翳也滑者滑翳也澀者澀翳也浮者浮翳也沉者沉翳也又名深翳橫者橫翳也又名劍脊翳散者散翳也偃者偃月翳也黃心者白翳黃心翳也黑水者黑水凝翳亦名黑花翳棗花者棗花翳也雷頭者雷頭風變內障也驚振者因驚振而成內障也胎患者胎

患內障也此內障二十四證之總名也須當一一分辨明白以施治也

內障初患久變五風歌

內障初患如好眼生花視物霧烟中隱隱似翳瞳失彩久變黃綠黑烏青黃風雀目久金色綠風時見花白紅頭旋額鼻目牽痛黑風見黑綠風同烏風亦與綠不異但痛不旋乃烏風頭旋不痛青風證瞳黃黃風發脾經淺綠如白肺經發黑色黑風腎經名烏帶渾紅心經病青是青風屬肝經外因

頭風痛引目腦脂熱注忽失明內因精傷不上注左右相傳漸漸盲或兼外因皆赤痛內因不足補其精

註內障初患如同好眼但視物常見五色花飛昏而不明如在霧烟之中瞳中隱隱似翳漸無精彩射人其瞳色或變黃白綠青烏黑渾紅無定久則成五風內障之證也黃風者初病雀目日久瞳變黃色甚而如金難治之證也綠風者初病眼前時見白花紅花頭旋兩額侠鼻痛牽兩目日久瞳變淺綠如白之色黑風者初病與綠風相同但時見黑花日久瞳變昏黑之色烏風者初病亦與綠風之證不異但頭痛而不旋暈眼前常見烏花日久瞳變烏帶渾紅之色青風者初病亦與烏風相同頭雖旋暈而不痛眼前常見青花日久瞳變青色其五風發病之源黃風則發於脾經綠風則發於肺經黑風則發於腎經烏風則發於心經青風則發於肝經然風雖有五

其致病之由則有二一曰外因必因頭風其痛引目上攻於腦腦脂與熱合邪下注於目而致兩目忽然失明也一曰內因必因內傷藏府精氣不上注於目或先病左目後及於右目或先病右目後及於左目左右相傳兩目俱損也外因證屬有餘多兼赤痛當以除風散熱為主內因證屬不足多不赤痛當以補精益氣為主

五風初患有餘歌

五風初患有餘證除風湯內主羚羊黑苓蠍尾車前子黃芩白芍共消黃

除風湯方

羚羊角二錢　黑參二錢
茯苓二錢　蠍尾三分
車前子一錢　黃芩一錢
白芍藥一錢　芒消一錢
大黃一錢

右爲粗末令勻以水二盞煎至一盞食後去

滓溫服

五風初患不足歌

五風初患不足證通明補腎決明參生地桔車茺芍細引經竅散少加軍

通明補腎丸方

石決明一兩　人參二兩
生地黃二兩　桔梗二兩
車前子一兩　茺蔚子二兩
白芍藥一兩　細辛半兩
大黃三錢

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大空心茶清送下三錢

黃風有餘歌

已成黃風有餘證須用通脾瀉胃湯知母軍芩茺蔚子石膏梔子黑參防

通脾瀉胃湯方

知母一錢　大黃一錢
黃芩一錢五分　茺蔚子一錢

石膏一錢　梔子一錢
黑參一錢　防風一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去柤溫服

黃風不足歌

已成黃風不足證補益脾經山藥丸人參山藥茯苓地瀉防風同作丸

山藥丸方

人參　山藥

茯苓　生地黃
澤瀉　防風各一兩
右爲細末煉蜜爲丸如桐子大空心茶清送
下三錢

綠風有餘歌

已成綠風有餘證羚羊角飲黑參防茯苓知母黃
芩細桔梗羚羊車大黃

綠風羚羊飲

黑參二錢　防風二錢
茯苓二錢　知母二錢

黃芩一錢　細辛一錢
桔梗二錢　羚羊角一錢
車前子一錢　大黃一錢
右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去柤溫
服

綠風不足歌

已成綠風不足證還睛丸草朮參苓羌防芎地蒺
蓉薯牛膝葙蒙兎賊芎

綠風還睛丸方

甘草　白朮
人參　茯苓
羌活　防風
菊花　生地黃
蒺藜　肉蓯蓉
山藥　牛膝
青葙子　密蒙花
兎絲子　木賊
川芎各一兩

右爲細末煉蜜爲丸桐子大空心茶清送三
錢

黑風有餘歌

已成黑風有餘證羚羊角飲黑羚羌車前桔梗黃
芩共柴胡茺蔚細辛防

黑風羚羊飲

黑參一錢　羚羊角一錢
羌活一錢　車前子一錢半

桔梗一錢　黄芩一錢
柴胡一錢　茺蔚子一錢半
細辛五分　防風一錢
右為粗末以水二盞煎至一盞食後去粗溫服

黑風不足歌

巳成黑風不足證補腎丸中熟地黄澤瀉茺蔚五味子細辛山藥兎絲良

補腎丸方

熟地黄一兩　澤瀉一兩
茺蔚子一兩　五味子二錢
細辛二錢　山藥一兩
兎絲子一兩
右為細末煉蜜為丸桐子大每服二錢空心鹽湯下

烏風有餘歌

巳成烏風有餘證决明丸內决明辛桔梗防風茺蔚子車茯山藥共元參

烏風决明丸方

石决明二兩　細辛五錢
桔梗　防風
茺蔚子　車前子
茯苓　山藥
元參各一兩
右為細末煉蜜為丸如桐子大食前茶清送下三錢

烏風不足歌

巳成烏風不足證補肝散內用川芎熟地當歸蒺藜芍木賊夏枯草防風

烏風補肝散方

川芎　熟地黄
當歸　蒺藜
白芍藥　木賊
夏枯草　防風各一錢
右為粗末以水二盞煎至一盞食前去粗溫服

青風有餘歌

已成青風有餘證羚羊湯內用羚羊元參地骨車
前子川芎羌活細辛良

青風羚羊湯方

羚羊角 一錢　元參 一錢
地骨皮 一錢　車前子 一錢五分
川芎 一錢　羌活 一錢
細辛 五分

右為粗末以水二盞煎至一盞食遠溫服

青風不足歌

已成青風不足證還睛散內用苓參防風地骨車
前子羌活川芎共細辛

青風還睛散方

茯苓　人參
防風　地骨皮
車前子　羌活
川芎　細辛 各等分

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去粗溫
服

圓翳歌

圓翳青白一點圓宛如油點水中間肝風衝腦脂
下注明視翳小暗看寬虛熱羚羊飲車細參苓防
知一同煎實用防風芩桔梗消黃茺黑細知前

註 圓翳內障初起之時黑睛上一點青白宛如油點浮於水面暗處視之其翳青白而大明處看之其形差小緣肝風上衝腦脂下注所致宜審其虛實而調之虛者用羚羊角飲子清其虛熱實者宜防風散泄其熱邪也

圓翳羚羊飲

羚羊角 一錢　車前子 一錢
細辛 五分　人參 一錢
黃芩 一錢　防風 二錢
知母 一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞夜食後去粗
溫服

圓翳防風散方

防風二錢　黃芩一錢
桔梗二錢　芒消一錢
大黃一錢　茺蔚子一錢
黑參一錢　細辛五分
知母一錢　車前子一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去柤溫服

氷翳歌

氷翳瞳色亮如氷陰看陽看無二形睛中隱隱白

透外肺風肝熱合邪攻對證雖當鍼撥驗出血若多反傷睛還睛參味防知細芩桔車前元地茺

註 氷翳內障瞳色堅實白亮如氷之狀無論陰處及日中視之皆一般無二非若圓翳之明暗有別也其睛內有白色隱隱透出於外此證乃肝熱肺風合邪上攻入目爲患宜按穴刺之出血則愈但鍼撥不宜出血過多若出血過多恐加傷睛也內服之藥宜還睛丸清而補之中穴名上星在鼻直上入髮際一寸陷

氷翳還睛丸方

人參一兩　五味子半兩
防風二兩　知母二兩
細辛半兩　黃芩一兩
桔梗一兩　車前子二兩
黑參一兩　生地黃二兩
茺蔚子二兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大空心茶清送下三錢

滑翳歌

滑翳水銀珠子樣微含黃色遮瞳神肝風衝腦脂下注不癢不疼漸漸昏須用補肝芩桔蔚芩防芎母黑歸參有餘決明車味細軍芩知蔚黑防芩

註 滑翳內障瞳心內一點如水銀珠子之狀微含黃色不癢不疼無淚而遮蔽瞳神漸漸失明後則左右相牽俱損此乃肝風衝上腦脂流下所致宜用補肝湯清散虛熱若有餘用決明丸下行實熱也

滑翳補肝湯方

茯苓一錢　桔梗一錢

茺蔚子二錢　黄芩一錢

防風二錢　川芎一錢

知母一錢　黑參一錢

當歸身二錢　人參一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去柤溫服

滑翳決明丸方

石決明一兩　車前子一兩

五味子半兩　細辛半兩

大黄一兩　茯苓一兩

知母一兩　茺蔚子一兩

黑參一兩　防風一兩

黄芩一兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大食前茶清送下三錢

澀翳歌

澀翳微赤凝脂色瞳人端正漸失明時時隱澀疼無淚或聚或開無定形還睛散內車防桔元味知苓茶葉茺亦用七寶丸珠珀决腦茺參熊膽同

註 澀翳證瞳神內微赤如凝脂之色瞳神端正漸漸昏矇時復澀痛而無淚出其翳無定或聚或開宜先用還睛散後用七寶丸內消其翳也

還睛散方

車前子一錢半　防風一錢

桔梗一錢　元參一錢

五味子五分　知母二錢

黄芩一錢　細茶二錢半

茺蔚子一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去柤溫服

澀翳七寶丸方

珍珠五錢　琥珀一兩

石決明二兩　龍腦二分

茺蔚子一兩　人參一兩
熊膽一兩
右為細末煉蜜為丸如桐子大食前茶清送
下一錢

浮翳歌

浮翳色白瞳內映明看細小暗看寬不癢不疼無
血色腦風衝入腦脂惄決明石决人參茯車細防
軍茺桔添墜翳石决知辛味生地參防及兎肝

註 浮翳內障之證初患之時不癢不疼從瞳神

內映出白色暗處看則其翳寬大明處看其
翳略小全無血色相混緣腦風衝入於眼腦
脂流下致成內障宜服決明散墜翳丸

石決明散方

石決明一錢　人參一錢
茯苓一錢　車前子一錢
細辛五分　防風二錢
大黃一錢　茺蔚子一錢
桔梗一錢半

右為細末令勻食後米飲湯調下二錢

浮翳墜翳丸方

石決明一兩　知母一兩
細辛五錢　五味子半兩
生地黃二兩　人參二兩半
防風一兩　兎肝一具
右為細末煉蜜為丸如桐子大空心茶清送
下三錢

沉翳歌

沉翳白隱黑睛內肝勞腦熱下攻瞳向日細看方
見翳日輕夜重黑睛疼羚羊角飲車前子羚角軍
防芩黑茺皂莢丸用蛇蛻朮龍膽元精歸菊芎參
苓木賊連翹芍豬爪猬皮甲穀精

註 沉翳內障白藏在黑睛之內向日細看方見
其白疼痛則晝輕夜重緣肝經勞熱腦中熱
氣流下宜服羚羊角飲子及皂莢丸以治之

沉翳羚羊飲

車前子一錢　羚羊角二錢

大黃一錢　防風二錢
黃芩一錢　黑參一錢
茺蔚子二錢
右爲粗末水二盞煎至一盞食後去柤溫服
皂莢丸方
蛇蛻七條　蟬蛻
白朮　龍膽草
元精石　當歸
白菊花各兩半　川芎半兩

人參一兩　茯苓一兩半
木賊一兩半　連翹一兩半
赤芍藥一兩半　豶猪爪三十枚
刺猬皮　穿山甲
穀精草各一兩半
共爲細末一半入牙皂十二梃燒存性和勻煉白蜜丸桐子大每服一錢五分空心杏仁湯下一半入仙靈脾一兩每服三錢用豬肝三片批開夾藥煮熟臨臥細嚼用原汁送下

橫翳歌
橫翳橫格在瞳心形如劍脊白如銀內虛風熱攻衝腦胃熱肝邪致目昏還睛決明車前地芩防辛味黑人參七寶車前連炙草丹砂石決犀羚均
註 橫翳又名劍脊翳白睛人中狀出於外如劍脊中高邊薄橫格於瞳人中心色白如銀緣內虛肝邪胃熱上衝於腦腦脂下流入眼致成內障宜服還睛丸七寶散
橫翳還睛丸方

石決明一兩　車前子一兩
生地黃二兩　黃芩一兩
防風二兩　細辛五錢
五味子半兩　黑參一兩
人參一兩
右爲細末煉蜜爲丸如桐子大空心茶淸送下三錢
七寶散方
車前子　胡黃連

丹砂　石決明

甘草各五分　犀角一錢

羚羊角一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去滓溫服

散翳歌

散翳形散如鱗點乍青乍白映瞳中胞內粟生兼爛痛金鍼一撥日光通還睛散用人參味桔梗車前苓細風後用補肝歸木賊防風熟地芍川芎

註散翳翳從瞳人內透出散如鱗點之狀乍青乍白胞內起粟而爛瞳人痛楚宜用金鍼撥其內翳之後先服還睛散清補後用補肝散收功

散翳還睛散方

人參一錢　五味子五分

桔梗一錢　車前子二錢

茯苓一錢　細辛五分

防風一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞夜食後去柤溫服

散翳補肝散方

當歸二錢　木賊二錢

防風一錢　熟地黃二錢

白芍藥一錢　川芎五分

右爲粗末以水二盞煎至一盞空心去柤溫服

偃月翳歌

偃月障含偃月形一灣白氣向下生膽風積熱下注眼肝腎俱虧致損明通明散內防芩入人參白茯細辛羌墜翳丸用石決磨青鯉青羊牛膽熊

註偃月內障瞳神內上半邊有白氣一灣隱隱似新月之狀覆垂向下緣膽風積熱注入眼中致成內障爲肝腎俱勞之證宜服通明散墜翳丸

偃月通明散方

防風　黃芩

人參　茯苓各一錢
細辛五分　茺蔚子二錢
右爲粗末水二盞煎至一盞夜食後去柤溫
服
五膽偃月墜翳丸方
石决明一兩　麝香少許
青魚膽　鯉魚膽
青羊膽各七個　牛膽五錢
熊膽一分
右爲細末麪糊爲丸如桐子大空心茶清送

下五分
白翳黄心歌
白翳黄心內障證四圍白色內中黃大小皆中微
帶赤翳隱黑珠障內光肺肝風熱衝於目澁痛羞
明淚似湯墜翳决明茺蔚子人參甘菊共車防
註白翳黄心內障四邊皆白中心一點微黃色
隱在黑珠內映出珠外大小皆頭微帶赤色
乃肺肝風熱流入於眼頻頻下淚澁痛致成
此證宜服墜翳散
墜翳散方
石决明一錢　茺蔚子二錢
人參一錢　甘菊花三錢
車前子三錢　防風二錢
右爲細末令勻食後米飲湯調下一錢
黑水凝翳歌
黑水凝翳瞳微大內含青白障瞳人生花皆痛頻
頻淚膽熱爲邪損目神蘆薈丸中細辛草牛膽羚
羊梔子參通明防蔚參苓黑桔梗車前梔子仁

註黑水凝翳內障又名黑花翳瞳人微大瞳內
微現青白色大小皆頭澁痛眼中見花黃黑
不定頻頻下淚緣膽熱爲邪致成內障宜服
蘆薈丸通明散
蘆薈丸方
蘆薈一兩　細辛半兩
甘草五錢　牛膽半兩
羚羊角一兩　梔子仁一兩

人參半兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大空心茶清送下三錢

凝翳通明散方

防風一錢半　羌蔚子一錢

人參一錢　茯苓一錢

黑參一錢　桔梗一錢

車前子二錢　梔子仁二錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去粗溫

服

棗花翳歌

風輪傍邊白睛內白如鋸齒棗花同怒傷肝臟邪衝眼還睛散用車知羌人參防黑黃芩茯墜翳丸服可收功

註棗花內障者風輪傍邊白睛之內映出白翳如棗花鋸齒之狀緣怒傷肝膽介腦邪熱衝入目中致成此障久則變爲瞳神細小宜服還睛散再服墜翳丸

棗花翳還睛散方

車前子　知母

羌蔚子　人參

防風　黑參各一錢

黃芩一錢半　茯苓一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞去渣溫服

墜翳丸方

見偃月內障下

雷頭風歌

頭響如雷又似風雷頭風熱毒衝瞳腦汁下注瞳色變瞳人大小目昏朦瀉肝芩梗消黃黑羌活車歸知母龍虛者磁石丸薑附味黑丹皮磁石同

註雷頭風內障初患之時頭面多受冷熱毒氣衝入頭中致頭內響聲如風如雷頭旋發熱日久衝入眼內腦汁下注瞳人變色瞳或大小不定實者宜服瀉肝散虛者宜服磁石丸

瀉肝散方

黃芩　桔梗

芒消　大黃
黑參　羌活
車前子　當歸
知母各一錢　龍膽草五分
右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去滓溫
服
磁石丸方
乾薑一兩　附子炮五錢
五味子半兩　黑參一兩

牡丹皮一兩　磁石一兩燒紅醋淬三次
右爲細末煉蜜爲丸如桐子大食前茶清送
下一錢
驚振內障歌
驚振內障緣擊振腦脂惡血下傷睛睛變漸昏成
內障左右相傳鎮肝石決茺山藥車梔辛
防參茯苓還睛散用人參桔防細車前茺蔚芎
註驚振內障或因擊振誤著頭腦致腦中腦脂
惡血流入睛內日久變成內障左右相傳兩
目俱損宜服鎮肝丸還睛散
驚振鎮肝丸方
石決明一兩　茺蔚子一兩
山藥一兩　車前子一兩
梔子仁一兩　細辛五錢
防風一兩五錢　人參一兩
茯苓一兩
右爲細末煉蜜爲丸如桐子大食後茶清送
下三錢

驚振還睛散方
人參一錢　桔梗一錢
防風一錢半　細辛五分
車前子一錢　茺蔚子一錢
芎藭一錢
右爲粗末以水二盞煎至一盞食前去滓溫
服
瞳人乾缺歌
瞳人乾缺瞳形缺左右上下不成圓色白腦脂流

下患色黑肝膽熱虛徵色白瀉肝芩地骨麥知芍蔚黑參添色黑鎮肝山藥味參苓石决細車前

註 瞳人乾缺內障初患之時忽因疼痛難忍細看瞳人現出缺形或左或右或上或下缺而不圓瞳人之色黑白不定色白乃腦脂流下為患宜服瀉肝湯色黑則膽熱肝虛宜服鎮肝丸

瞳缺瀉肝湯方

黄芩一錢 地骨皮一錢

麥門冬一錢 知母一錢

赤芍藥一錢半 茺蔚子一錢半

黑參一錢

右為粗末以水一盞煎至一盞食後去滓溫服

瞳缺鎮肝丸方

乾山藥一兩 五味子五錢

人參 茯苓

石决明各一兩半 細辛五錢

車前子一兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大空心米湯送下二錢

雀目內障歌

雀目內障多癢澀暮暗朝明與雀同黃昏視下難見上肝風邪火障雙瞳洗肝散用車前子柴胡芩細黑參茺瀉肝湯裏消黃芍桔梗黃芩與防風

註 雀目內障患時暮暗朝明多癢多澀發作不常或明或暗夜中惟能視直下之物而不能

視上乃肝風邪火上衝於目致成內障宜服洗肝散先清虛熱後服瀉肝湯以瀉其實邪也

洗肝散方

車前子一錢 柴胡一錢五分

黄芩一錢 細辛五分

黑參一錢 茺蔚子一錢

右為粗末以水二盞黑豆三七粒煎至一盞去黑豆空心溫服

雀目瀉肝湯方
芒消　大黃
白芍藥　桔梗各一錢
黃芩　防風各二錢
右為粗末以水二盞煎至一盞食前去滓溫
服

高風內障歌
高風內障號雞盲天晚不明天曉光夜能上視難
見下損虧肝血腎精傷補肝羚細羌苓楮參黑車

斛枯草防還睛石決人參細茺蔚知芩芎木香
註高風內障之證兩眼至天晚不明天曉復明
緣肝有積熱腎經虛損乃陽微陰盛也天晚
陰長則天時之陰助人身之陰能視頂上之
物不能下視諸物至天曉陽長則天時之陽
助人身之陽而眼復明矣宜用補肝散還睛
丸

高風補肝散方
羚羊角　細辛
羌活　茯苓
楮實子　人參
元參　車前子
石斛　夏枯草
防風各一錢
右為粗末以水二盞煎至一盞去滓溫服

高風還睛丸方
石決明二兩　人參一兩
細辛五錢　茺蔚子二兩

知母一兩　茯苓一兩
芎藭一兩　木香五錢
右為細末煉蜜為丸如桐子大空心茶清送
下三錢

胎患內障歌
胎患小兒未出胎熱衝兒腦目生翳護睛木香芩
細射川大黃與黑參偕
註胎患內障兒在母腹之時緣食辛辣過多致
熱氣內衝兒腦及至生後眼成內障宜用護

睛丸

護睛丸方

木香五錢　黃芩五錢

細辛三錢　射干五錢

大黃五錢　黑參一兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大空心茶清服十丸

御纂醫宗金鑑卷七十八

編輯眼科心法要訣目錄

外障總名歌

暴赤生翳歌方附

血灌瞳人歌方附

瞼硬睛疼歌方附

赤膜下垂歌方附

黃膜上衝歌方附

蟹睛疼痛歌方附

旋螺尖起歌方附

努肉攀睛歌方附

鷄冠蜆肉歌方附

神祟疼痛歌方附

突起睛高歌方附

漏睛膿出歌方附

鶻眼凝睛歌方附

倒睫拳毛歌方附

胞肉膠凝歌方附

兩眥赤脈歌方附
花翳白陷歌方附
黑翳如珠歌方附
釘翳根深歌方附
風牽喎僻歌方附
冰瑕翳深歌方附
兩瞼粘睛歌方附
玉翳浮滿歌方附
逆順生翳歌方附

風牽瞼出歌方附
瞼生風粟椒瘡歌方附
混睛歌方附
被物撞破歌方附
撞刺生翳歌方附
痛如鍼刺歌方附
眼癢歌方附
衝風淚出歌方附
風赤瘡痍歌方附

暴風客熱歌方附
傷寒熱病後患目歌方附
肝虛積熱歌方附
因他患後生翳歌方附
睥生痰核歌方附
天行赤眼歌方附
小兒青盲歌方附
胎風赤爛歌方附
痘瘡入眼歌方附

轆轤轉關歌方附
小兒生贅歌方附
小兒疳眼歌方附
小兒通睛歌方附
眯目飛塵飛絲歌方附
補遺
能遠怯近歌方附
能近怯遠歌方附
瞳神散大歌方附

瞳神縮小歌方附
乾澀昏花歌方附
白眼痛歌方附
女子逆經歌方附
行經目痛歌方附
妊娠目病歌方附
產後病目歌方附
附外治方

御纂醫宗金鑑卷七十八

編輯眼科心法要訣

外障總名歌

外障暴赤血灌瞳鞕睛赤垂與黃衝蟹睛旋螺並努肉雞冠蜆肉祟疼同突睛漏睛連鶻眼拳毛倒睫胞凝逆皆赤花陷及黑釘喎僻冰瑕粘睛并玉翳水輪逆順障瞼出風粟又混睛撞破撞刺及鍼刺眼癢淚出瘡痍生客熱傷寒並肝熱因他疾核天水行毒盲赤爛瘢瘡病轉關生贅疳眼名小兒通睛恙雖小還有眯目證為輕此為外障四十八熟讀方知各證情

註外障者或因內熱或因外邪或內外合邪致生目赤腫痛翳膜等證也暴者暴赤生翳也血灌瞳者血灌瞳人也鞕睛者瞼鞕睛疼也赤垂者赤膜下垂也黃衝者黃膜上衝也蟹睛者形如蟹睛而疼痛也旋螺者形如旋螺尖起也努肉者努肉攀睛也祟疼者神祟疼痛也突睛者突起睛高也漏睛者漏睛膿出

也鵲眼者鵲眼凝睛也胞凝者胞肉膠凝也
眥赤者兩眥赤爛也花陷者花翳白陷也黑
者黑翳如珠也釘者釘翳根深也喎僻者風
牽喎僻也冰瑕者冰瑕翳深也粘睛者兩瞼
粘睛也玉翳者玉翳浮滿也水輪者膜入水
輪也逆順者逆順生翳也撞破者被物撞破
也撞刺者撞刺生翳也鍼刺者痛如鍼刺也
淚出者衝風淚出也瘡痍者風赤瘡痍也客
熱者暴風客熱也傷寒者傷寒熱病後患目

也肝熱者肝虛積熱也因他者因他病後生
翳也痰核者脾生痰核也天水者天水行後
赤眼也赤爛者胎風赤爛也旋瘡者旋瘡入
眼也轉關者轆轤轉關也生贅者瞼中生贅
也此外障四十八證之總名讀者誠能熟習
玩味自因病而各得其情矣

暴赤生翳歌

暴赤生翳心肝病風熱上壅痛難當赤腫熱淚羞
明痛最宜劆洗出血良初起先用蘆根飲黑連消
黃芩與防去翳鎮肝藁石決辛薯參苓車味羌

註 暴赤生翳其證赤腫生翳痛難當時流熱
淚羞明乃心肝二經風熱上壅攻目所致宜
劆洗出血服蘆根飲子清其內熱後服鎮肝
丸劆音廉劆者或以鍼鋒微刺之或以燈心
草微刮之也

蘆根飲子

蘆根一錢 黑參一錢五分
黃連一錢 芒消一錢

大黃一錢 黃芩一錢五分
防風一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去滓溫
服

鎮肝丸方

藁本一兩五錢 石決明二兩煅
細辛三錢 山藥炒
人參 茯苓
車前子各一兩 五味子三錢

羌活一兩

右羅爲細末煉蜜爲丸如桐子大空心茶清送下三錢

血灌瞳人歌

血灌瞳人目睛痛猶如血灌色相同膽汁肝血因熱耗血爲火廹灌睛瞳急用止痛沒藥散消黃血竭引茶清痛止大黃當歸散賊芩梔子菊蘇紅

註血灌瞳人目睛疼痛瞳人如血灌紅色緣肝血熱耗膽汁皆虧血因火廹灌入瞳中宜服

止痛沒藥散止疼後服大黃當歸散

止痛沒藥散方

沒藥二兩　芒消一兩半

大黃一兩半　血竭一兩

右搗篩爲細末食後熱茶清調下一錢

大黃當歸散方

大黃一兩　當歸一錢

木賊一兩　黃芩一兩

梔子五錢　菊花三錢

蘇木五錢　紅花八錢

右爲細末令勻每服二錢食遠茶清調下

瞼鞕睛疼歌

瞼鞕睛疼胞腫鞕瘀血翳膜目睛疼膈中積熱肝風盛外塗敷腫劆瘀紅涼膈消黃車前黑黃芩知母梔仁茺

註瞼鞕睛疼初患之時時覺疼脹久則瞼胞腫鞕睛珠疼痛此緣膈中積熱肝經風毒上衝於目宜劆洗去瘀外塗敷腫膏內服涼膈散

敷腫膏

方見卷末

涼膈散方

芒消　大黃

車前子各一錢　黑參一錢半

黃芩　知母

梔子炒　茺蔚子各一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後溫服

赤膜下垂歌

赤膜下垂覆睛瞳赤膜從氣下垂風此屬肝肺熱衝眼淚流痛癢如朱紅羚羊知母黃芩黑桔梗柴胡梔子茺

註赤膜下垂初患之時氣輪上邊起赤膜一片垂至風輪下覆瞳人緣肝肺之熱衝於眼內致生赤膜淚流痛癢宜服羚羊飲

羚羊飲

羚羊角鎊一錢五分 知母

黃芩 黑參

桔梗 柴胡

梔子炒各一錢 茺蔚子二錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

黃膜上衝歌

黃膜一片氣輪起上衝風輪覆蓋瞳赤澁淚眵疼痛極此因脾胃熱風攻通脾瀉胃黃芩黑防軍知母梔膏茺立應白芷羊躑躅鵝不食草麝歸雄

註黃膜上衝自氣輪而起一片黃膜從下上衝風輪上掩瞳人乃脾胃風熱上衝於眼致生黃膜淚流赤澁疼痛極甚宜通脾瀉胃湯外㗜立應散

通脾瀉胃湯方

黃芩一錢五分 黑參

防風 大黃

知母炒 梔子炒各一錢

石膏煅二錢 茺蔚子二錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食遠去渣溫服

立應散方

白芷 羊躑躅花減半

鵝不食草洗淨晒乾 麝香少許

當歸 雄黃另研後入各等分

右為細末每用少許含水㗜鼻內去盡濁涕淚出為度

蟹睛疼痛歌

蟹睛努出蟹睛形烏珠極痛澁羞明肝膽積熱腎

虛熱虛軟不疼實鞭疼實者瀉肝車地骨消黃知母黑柴茺虛宜鎮腎味知地山藥兎辛石决靈

註 蟹睛之證烏睛努出如豆如珠形似蟹睛疼痛極甚澁淚羞明初起爲實鞭而極痛久則爲虛軟而不疼總因肝膽積熱衝睛腎中虛熱注目所致實者宜瀉肝湯虛者用鎮腎决明丸

瀉肝湯方

車前子　地骨皮

芒消各一錢　大黃

知母各一錢半　黑參一錢

柴胡二錢　茺蔚子二錢

右爲粗末以水二盞煎至八分去滓空心溫服

鎮腎决明丸方

五味子半兩　知母炒

生地黃　山藥炒各一兩半

兎絲子一兩　細辛半兩

石决明煅一兩

右爲細末煉蜜爲丸桐子大空心茶清送三錢

旋螺尖起歌

旋螺尖起如螺殼烏睛色變極痛疼殼形尖起色靑黑肝經積熱血瘀凝輕宜瀉膽防辛梗赤芍天冬五味茺重者瀉肝消黃桔柴芩知母細車行

註 旋螺外障氣輪之內烏珠色變靑白如螺螄之殼其色初靑久黑其形尖圓乃肝經積熱亢極瘀血凝滯所致輕者宜瀉膽湯重者用瀉肝飲子

瀉膽湯方

防風二錢　細辛五分

桔梗一錢　赤芍藥一錢

天門冬去心一錢　五味子五分

茺蔚子二錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去滓溫服

瀉肝飲子

芒消　大黃

桔梗　柴胡

黃芩　知母炒

細辛　車前子各一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去滓溫服

努肉攀睛歌

努肉攀睛大眥起初侵風輪久掩瞳或癢或疼漸

積厚赤爛多年肺熱壅初起紫金膏點效久宜鉤割熨烙攻內服除風湯蔚桔細辛連味大黃風

註努肉攀睛之證起於大眥初則漸侵風輪久則掩過瞳人或癢或痛漸漸積厚此證多因赤爛年久或肺經風熱壅盛所致初起可點紫金膏努瘀白退久則堅靭難消必須鉤割熨烙後服除風湯

除風湯方

茺蔚子一錢　桔梗一錢

細辛五分　黃連一錢

五味子五分　大黃一錢

防風一錢

右為末以水二盞煎至一盞食後去滓溫服

紫金膏

方見卷末

雞冠蜆肉歌

雞冠蜆肉內眥生胃心積熱共肝風或青或赤如雞蜆輕侵風輪重掩瞳鉤割後服抽風桔消黃車

黑細芩風茺蔚丸芩石決黑軍苓山藥地黃茺

註雞冠蜆肉之證起於脾眥之內或青或赤如雞冠蜆肉之形漸漸而長從大眥侵及風輪久則掩及全目此乃脾胃積熱肝風上衝所致先宜用手法鉤割後服抽風湯或茺蔚丸

抽風湯方

桔梗一錢　芒消一錢五分

大黃一錢　車前子一錢

黑參一錢五分　細辛一錢

黃芩一錢五分　防風二錢
右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去滓溫
服
茺蔚丸方
黃芩一兩　石决明煅一兩
黑參一兩　大黃一兩
茯苓一兩　山藥炒一兩
生地黃一兩五錢　茺蔚子二兩
右爲細末煉蜜爲丸桐子大空心茶清下三

錢
神祟疼痛歌
神祟疼痛忽然發胞熱睛疼緣肺肝洗肝散用消
黃桔梔子黃芩知母添黑參熱甚加歸地外點還
宜石燕丹
註　神祟疼痛之證平素無病忽然發動瞼皮火
熱睛珠如刺極痛難當此肺肝風熱上攻於
眼不可劇洗宜服酒調洗肝散外點石燕丹
酒調洗肝散方

朴消　大黃
桔梗　梔子
黃芩　知母炒
黑參各等分
熱甚者加生地黃當歸尾
右爲末每服二三錢溫酒調下日服二次
石燕丹
方見卷末
突起睛高歌
突起睛高珠腫疼風熱毒火上衝睛鍼後退熱桔

梗飲消黃茺芍黑芩風還睛五味參苓細山藥車
前防遠羌
註　突起睛高之證緣風熱火毒上衝於眼疼痛
難忍睛珠突高脹起宜先用鍼出其惡涎毒
水後服退熱桔梗飲子用還睛丸調理可愈
退熱桔梗飲子
桔梗　芒消
大黃　茺蔚子

白芍藥炒　黑參
黃芩　防風各一錢
右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去滓溫
服
還睛丸方
五味子半兩　人參一兩
茯苓一兩　細辛半兩
山藥一兩　車前子
防風　遠志

茺蔚子各一兩
右爲細末煉蜜丸桐子大空心茶清送下三
錢
漏睛膿出歌
漏睛膿出驗眥間或流膿汁或清涎日無翳障不
疼痛風熱攻衝心火炎竹葉瀉經湯柴瀉升麻竹
葉草車前黃芩草決川羌活苓芍將軍梔子連
註漏睛膿出之證生於瞼眥或流膿水或淌清
涎日無翳障不疼不痛乃風熱攻衝心火上
炎宜用竹葉瀉經湯主之
竹葉瀉經湯方
柴胡五分　澤瀉四分
升麻五分　青竹葉十片
甘草炙五分　車前子四分
黃芩六分　草決明四分
川羌活五分　白茯苓四分
赤芍藥四分　大黃六分
梔子仁炒五分　川黃連五分

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後溫服
鶻眼凝睛歌
鶻眼凝睛睛突定目珠脹鞕痛難當積熱上衝腦
熱注外用摩風鍼血良內服瀉肝湯桔蔚柴防芩
黑參消黃
註鶻眼凝睛之證睛突於外不能動轉堅鞕高
努如鶻眼脹滿疼痛難忍此積熱上衝腦中
風熱蘊注於目所致宜先用金鍼出血瀉毒
外敷摩風膏內服瀉肝湯

摩風膏

方見卷末

瀉肝湯方

桔梗　茺蔚子

柴胡　防風

黃芩　黑參

芒消　大黃各等分

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去滓溫

服

倒睫拳毛歌

倒睫拳毛內刺睛皮鬆弦緊癢兼疼磣澁難開胞
瞼爛肝風脾熱兩相壅細辛湯用知茺黑軍細防
風桔梗羚

註倒睫拳毛之證由皮鬆弦緊故拳毛倒入內刺睛珠磣澁難開眼胞赤爛癢而兼疼此乃脾熱肝風合邪上壅所致宜用細辛湯內清邪熱外散風邪也

細辛湯方

知母二錢　茺蔚子二錢

黑參一錢　大黃一錢

細辛一錢　防風二錢

桔梗一錢　羚羊角一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去滓溫

服

胞肉膠凝歌

胞肉膠凝胞肉腫初小漸大摩隱瞳胃脾風熱上
攻目通脾瀉胃熱風清

註胞肉膠凝之證脾中蓄肉壅起初小漸大摩隱瞳人眼胞濕爛眵淚膠粘此乃脾胃中邪風積熱上壅於目所致宜用通脾瀉胃湯散風清熱兩解其邪

通脾瀉胃湯

方見黃膜上衝下

兩背赤脈歌

背赤病屬心經火大背多實小背虛實者洗心散
歸芍麻黃連芥大黃梔虛者九仙芩朮芍菊芎歸

草芷通宜

註背赤之證赤脈起於大眥者心經之實火也赤脈起於小眥者心經之虛熱也實者用洗心散兩解其實邪虛者宜九仙散清降其虛熱也

七寶洗心散方

當歸一錢　赤芍藥一錢

麻黃八分　黃連一錢

荊芥八分　大黃一錢

梔子一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

九仙散方

黃芩　荊芥

赤芍藥　菊花

川芎　當歸

甘草　白芷

木通各一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後服

花翳白陷歌

花翳白陷在烏睛四圍漸起漫神瓏狀如棗花魚鱗翳肺肝風熱腦中衝知母飲子防風桔知母消黃芩細辛茺

註花翳白陷者乃黑睛生翳風輪四圍漸起中間低陷其翳狀如棗花魚鱗之形烏睛或白或帶微黃此因肺肝積熱風邪上衝於腦所致宜用知母飲子

知母飲子

防風一錢五分　桔梗一錢五分

知母一錢　芒消一錢

大黃一錢五分　茯苓一錢

細辛一錢　茺蔚子一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

黑翳如珠歌

黑翳如珠黑睛上形如珠子黑而圓淚出羞澁疼

痛甚大人肝腎虛風宜通明補腎丸可服小兒患此名眼疳羚羊角飲消黃細知母羚防一併煎

註 黑翳如珠之證黑睛上有黑翳圓如珠子之形淚出羞澁難開疼痛極甚若大人患此證爲肝腎虛熱風邪宜用通明補腎丸小兒患此證爲實熱眼疳宜服羚羊角飲子泄其實熱也

通明補腎丸

方見五風初患不足下

羚羊角飲子

芒消一錢　大黃一錢

細辛五分　知母一錢

羚羊角一錢　防風一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食遠溫服

釘翳根深歌

釘翳根深睛內生鞕似釘頭極痛疼赤澁羞明時淚出肝心毒熱上衝瞳除熱飲子知母桔消黃茺蔚黑苓風

註 釘翳根深者睛中翳黑鞕如釘子之形其證疼痛赤澁淚出羞明此乃肝心毒熱上攻睛瞳宜服除熱飲子清瀉其毒熱也

除熱飲子

知母二錢　桔梗二錢

芒消一錢　大黃一錢

茺蔚子一錢　黑參二錢

黃芩二錢　防風一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫

服

風牽喎僻歌

風牽喎僻瞼痠赤陽明風熱刺睛明內服排風蠍味蛇天麻辛芍桔防風

註 風牽喎僻之證瞼皮痠赤時時口眼相牽而動此乃陽明風熱上壅所致宜先用鍼刺睛明穴外泄其邪後服排風散內疎其風

排風散方

乾蠍　五味子

烏蛇各一錢　天麻二錢
細辛　白芍藥炒
桔梗各一錢　防風二錢
右為細末令勻食後米飲調下三錢

冰瑕翳深歌

冰瑕翳深色微青橫貫烏睛珠癢疼淚眵赤脈絲肝熱石燕丹宜外點靈內服茺蔚消黃細元芍知母殼防風

註 冰瑕翳深之證翳色青白如冰橫貫烏睛其

證或癢或疼發歇無時眵黏淚出白睛赤脈此乃肝經之熱宜外點石燕丹內服茺蔚散

石燕丹

方見卷末

茺蔚散方

茺蔚子二錢　芒消一錢
大黃一錢　細辛五分
黑參一錢　赤芍藥一錢五分
知母一錢　枳殼一錢
防風二錢
右為粗末以水二盞煎至一盞食遠溫服

兩瞼粘睛歌

兩瞼粘睛眵癢疼脾胃風溼熱甚成菊花通聖消黃桔芍草荊歸膏薄芎麻芩梔滑翹防朮外加羌細菊蔓荊

註 兩瞼粘睛之證瞼內生瘡眵淚癢痛胞瞼粘合難開此乃脾胃中風濕熱盛合邪上攻宜用防風通聖散加羌活菊花細辛蔓荊子外

散風邪內清邪熱

菊花通聖散方

芒消五分　大黃酒蒸五分
桔梗一錢　白芍藥炒五分
甘草生一錢五分　荊芥穗五分
當歸五分　石膏一錢
薄荷五分　川芎五分
麻黃五分　黃芩一錢
梔子炒黑一錢　滑石二錢

連翹五分　防風五分

白朮五分炒

外加羌活細辛菊花蔓荊子各五分

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去滓溫服

玉翳浮滿歌

玉翳浮滿時或疼風熱衝腦蓋瞳睛洗刀通聖羌獨細蒺元賊決蛻蔓青

註玉翳浮滿之證初起時或疼痛黑睛上翳如玉色遮蓋瞳人皆緣肝經熱極風熱衝腦所致宜用洗刀散除風熱而消翳膜也

洗刀散方

即防風通聖散加羌活獨活細辛蒺藜元參木賊草決明蟬蛻蔓荊子青葙子各一錢

膜入水輪歌

膜入水輪睛瘡後瘡愈坐翳侵水輪肺肝虛熱大腸燥日久失治傷瞳神退熱飲軍羌蔚黑辛防五味桔黃芩

註膜入水輪者因黑白睛上生瘡而起愈後瘡痕不沒漸生翳膜侵入水輪此乃肝經積熱大腸燥滯邪熱上逆所致宜用退熱飲子清降其熱

退熱飲子

大黃一錢　茺蔚子二錢

黑參一錢　細辛一錢

防風一錢　五味子五分

桔梗一錢　黃芩一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去滓溫服

逆順生翳歌

逆順生翳上下生順則下垂逆上衝鉤割後用知母飲知味軍芩車桔茺

註逆順生翳之證從上垂下侵入黑睛爲順從下衝上侵入黑睛爲逆順則易安逆則難治並宜手法鉤割去其翳膜後服知母飲子清其內熱

知母飲子

知母一錢　五味子五分

大黃一錢炒　黃芩一錢

車前子二錢　桔梗一錢

茺蔚子二錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

風牽瞼出歌

風牽瞼出瞼皮翻胞瞼俱紅眵淚漣胃經積熱肝

風盛劆洗去瘀病可痊後服黃耆湯蔚芎防芩苓草大黃煎

註 風牽瞼出之證乃瞼皮翻出向外上下胞瞼俱赤眵淚淋漓皆緣胃經積熱肝有風邪宜先用劆洗去瘀後服黃耆湯清熱散邪也

黃耆湯方

黃耆一錢　茺蔚子一錢

地骨皮一錢　防風一錢五分

黃芩一錢　茯苓一錢

甘草五分　大黃一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

瞼生風粟椒瘡歌

椒瘡風粟瞼胞生多淚難睜磨澁疼脾經風熱粟黃軟脾經溼熱椒鞕紅劆洗後用清脾飲知母翹軍生地風黃芩元粉黃連桔陳皮荊芥黑參靈

註 椒瘡風粟之證或起於瞼邊或生於胞內皆淚多難睜沙澁磨睛疼痛粟瘡如粟其形黃

軟屬脾經風熱而成椒瘡如椒其形紅鞕屬脾經溼熱而成並宜劆洗出血服除風清脾飲椒瘡倍芩連生地風粟倍荊芥防風

除風清脾飲

知母　連翹

大黃　生地黃

防風　黃芩

元明粉　黃連

桔梗　陳皮

荆芥穗　黑參各等分

右為粗末以水二盞煎至一盞去滓食遠溫服

混睛歌

混睛初起白睛混漸生赤脈遮瞳睛或混白膜浸珠上白忌光赤散紅先癢後疼隱澁淚肝藏毒風劆洗通後服地黃生熟地蒺藜當歸甘草通黃連木賊烏犀角羌活元參軍穀精

註 混睛之證初起白睛混赤漸生赤脈遮漫烏

睛或白或赤漫珠一色白忌光澁如苔赤忌赤脈外散其證初起則先癢後痛漸致澁淚出羞明隱痛視物昏矇此乃肝藏毒風與瘀血上凝所致先宜劆洗去瘀後服地黃散外點摩障靈光膏

地黃散方

生地黃七錢　熟地黃焙乾七錢

白蒺藜炒四錢　當歸七錢

甘草炙五錢　木通五錢

黃連酒炒五錢　木賊五錢

烏犀角鎊五錢　羌活五錢

元參五錢　大黃七錢

穀精草五錢

右為細末令勻每服三錢煮羊肝汁食遠調服

摩障靈光膏方見卷末

被物撞破歌

被物撞破珠脹痛腫閉胞靑劆洗良外塗生地地

黃散芎地羚軍芍殼香

註 被物撞破者或因打撲或因撞損睛珠脹痛眼胞靑紫腫閉難開先宜劆洗散瘀外敷搗爛生地黃膏內服生地黃散

生地黃散方

川芎　生地黃

羚羊角　大黃

赤芍藥　枳殼

木香各一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

撞刺生翳歌

撞刺生翳遺刺痕日久血瘀障翳生赤脈滿疼經效散柴軍歸芍草犀同

註撞刺生翳之證或被竹木簽刺成瘡因治療不淨留痕日久瘀血凝積遂生翳膜赤脈滿目澁痛淚出宜用經效散清熱散瘀也

經效散方

柴胡二錢　大黃一錢

當歸尾一錢　赤芍藥一錢

甘草梢五分　犀角一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

痛如鍼刺歌

痛如鍼刺心火熾睛珠如同鍼刺疼頭疼目眩眼系急鍼後八正草梔燈桑車萹蓄滑生地竹葉生軍瞿麥通

註痛如鍼刺乃心經毒火上熾睛珠忽然極痛猶如鍼刺微帶頭疼目眩眼系緊急先宜火鍼刺太陽穴外散其邪後服加味八正散內泄其熱也

加味八正散方

甘草　梔子

燈心草　桑白皮

車前子　萹蓄

滑石　生地黃

苦竹葉　大黃

瞿麥　木通各等分

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

眼癢歌

眼癢皆因肝膽風癢生皆驗黑白睛外用廣大重明洗內服荊防羌烏芎

註眼癢之證皆因肝膽二經風邪鬱發所致或

在瞼邊皆內甚則癢連睛珠癢極難忍外以廣大重明湯薰洗內服驅風一字散疎散風邪

廣大重明湯

方見卷末

驅風一字散方

荊芥穗五錢　防風二兩五錢

羌活二兩五錢　川烏炮五錢

川芎五錢

右為細末令勻每服二錢食後薄荷湯調下

衝風淚出歌

風淚初起冬月甚久則冬夏淚濛濛肝虛冷淚不疼赤實則熱淚腫紅疼虛用補肝歸白芍蒺芎熟地木賊風實用茶調荊薄草賊防羌決菊膏芎

註衝風淚出之證見風淚出初起則冬月甚夏月輕久則冬夏皆然此乃肝藏虛風邪熱所致若淚冷不赤不痛為虛宜用補肝湯淚熱腫赤疼痛為實宜用川芎茶調散

止淚補肝散方

當歸二錢　白芍藥炒一錢

蒺藜一錢　川芎五分

熟地黃二錢　木賊一錢

防風一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食遠去滓溫服

川芎茶調散方

荊芥　薄荷

甘草炙　木賊

防風　羌活

石決明煅　菊花

石膏　川芎各一兩

右為細末令勻每服二錢食後茶清調下

風赤瘡痍歌

風赤瘡痍皆瞼生黑睛端好瞼爛紅脾經風熱宜急治久生翳膜遮瞳睛加減四物湯生地苦參牛蒡薄荷風當歸赤芍天花粉連翹荊芥穗川芎

註 風赤瘡痍者起於兩眥其黑睛則端然無恙惟瞼邊爛而紅赤此乃脾經風熱上攻所致宜急治之久則恐生翳膜遮蓋瞳睛用加減四物湯

加減四物湯方

生地黃　苦參

牛蒡子　薄荷

防風　當歸

赤芍藥　天花粉

連翹　荊芥穗

川芎各一錢 [illegible]

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

暴風客熱歌

暴風客熱胞腫疼淚多痒赤脹白睛原於肺熱召風鬱菊花通聖可收功

註 暴風客熱者胞腫疼痛淚多痒赤白睛脹起此證原於肺客邪熱外召風邪先宜刷洗後用菊花通聖散內清邪熱外散風邪也

菊花通聖散

方見兩瞼粘睛下

傷寒熱病後患目歌

傷寒餘熱過食辛睛散黑花澁淚頻紅腫痛用生犀飲羚防芩桔知苓參

註 傷寒熱病後患目者因餘熱未清過食辛熱兩熱合邪以致瞳人散大時見黑花隱澁淚多紅腫疼痛宜用生犀飲清解其熱也

生犀飲

生犀角一錢　羚羊角一錢

防風一錢　黃芩一錢

桔梗一錢五分　知母一錢

茯苓一錢　人參一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

肝虛積熱歌

肝虛積熱根發歇起初紅腫痛羞明年深生翳漸

昏暗青葙丸用兔絲茺生地青葙防五味黑柴澤瀉細車苓

註 肝虛積熱之證時發時歇初則紅腫疼痛澁淚難開久則漸重遂生翳膜視物昏暗宜用青葙子丸治之

青葙丸方

兔絲子一兩　茺蔚子一兩
生地黃一兩　青葙子二兩
防風一兩　五味子三錢
黑參一兩　柴胡一兩
澤瀉一兩　細辛二錢
車前子一兩　茯苓一兩

右為細末煉蜜為丸桐子大空心茶清送下三錢

因他患後生翳歌

因患病後生雲翳赤爛日久翳遮瞳心無黃赤猶能見羊肝丸蒺菊川芎决地楮槐连五味荊歸甘草甤仁風

註 因患他病後生翳者為患後生翳也初則赤爛日久漸生雲翳遮蔽瞳人視無所見醫者當細看翳心若不黃赤猶能通三光者可治宜常服羊肝丸可愈

羊肝丸方

雄羊肝一具　白蒺藜一兩炒去刺
菊花一兩去梗葉　川芎一錢
石決明一兩　生地黃一兩
楮實子五錢　槐角五錢炒
黃連五錢　五味子五錢
荊芥穗一錢五分　當歸尾五錢
甘草五錢　甤仁七錢去殼油
防風二錢

右為細末雄羊肝一具滾水沸過和前藥搗為丸如桐子大每服五六十丸空心薄荷湯下

脾生痰核歌

脾生痰核痰火結核形如豆堅不疼失治成瘻流

膿血防風散結芷芩風黑桔前胡陳赤芍浙貝蒼朮花粉同

註 瘰生痰核之證因痰火結聚而成生於胞外皮內核形如豆堅鞕不疼宜用防風散結湯化痰散熱若久而不治漸長爲瘻破則成漏爲難治矣

防風散結湯方

白芷　黃芩

防風　黑參

桔梗　前胡

陳皮　赤芍藥

浙貝母　蒼朮

天花粉各八分

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去滓溫服

天行赤眼歌

天行赤眼四時生傳染熱淚腫赤疼受邪淺深隨人化驅風散熱飲防風牛蒡將軍羌赤芍連翹梔

薄草歸芎

註 天行赤眼者四時流行風熱之毒傳染而成老幼相傳沿門逐戶赤腫澁淚羞明疼痛受邪淺深視人強弱強者先愈弱者遲愈宜用驅風散熱飲風盛倍羌防熱盛倍大黃

驅風散熱飲

防風　牛蒡子炒研

大黃酒洗　羌活

赤芍藥　連翹

梔子炒　薄荷各一錢

甘草五分　當歸尾

川芎各一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去滓溫服

小兒青盲歌

小兒青盲胎受風瞳子端然視物矇明目羊肝桂栢味細菊羌連白朮同

註 小兒青盲者因胎受風邪生後瞳人端好黑

白分明惟覩物不見有時夜卧多驚嘔吐痰
涎黃汁宜用鎮肝明目羊肝丸久服可愈

鎮肝明目羊肝丸方

羯羊肝一具竹刀切片用新瓦盆焙乾如大只用一半

官桂　栢子仁

五味子　細辛

菊花　羌活各五錢

黃連炒七錢　白朮五錢

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大沸湯研調空

心服一錢

胎風赤爛歌

胎風赤爛緣胎熱目赤眵黏眥爛紅小防風湯羌
梔草歸尾將軍赤芍風

註胎風赤爛之證因在母腹其母過食辛熱或
生後乳母過食辛熱致令小兒雙目盡赤眵
淚膠黏四眥濕爛宜用小防風湯治之

小防風湯方

羌活　梔子

甘草　當歸尾

大黃　赤芍藥

防風各五分

右爲粗末以水一盞半煎至五分空心溫服

疳瘡入眼歌

小兒疳瘡入眼中赤腫難開澁淚疼久生雲翳如
銀色肝經餘熱上衝睛紅花散用草歸地赤芍軍
翹紫草紅

註小兒疳瘡之證因患痘時瘡生眼中赤腫難

開澁淚羞明疼痛久則生翳如銀色此乃痘
後肝經餘熱上攻睛瞳所致宜用紅花散清
熱散瘀其證自愈

紅花散方

甘草　當歸尾

生地黃　赤芍藥

大黃　連翹

紫草　紅花各五分

右爲粗末燈心草十莖竹葉十片爲引以水

一盞半煎至五分食遠去渣溫服

轆轤轉關歌

轆轤轉關肝風盛旋轉睛珠轆轤同輕則瞳斜重反背初起鈎籐飲蠍芎參防二麻殭蠶草後服天冬飲赤苓羌活天冬五味子人參知母蔚防風

註 轆轤轉關之證因肝經風邪甚盛以致二目睛珠旋轉不定與轆轤相同輕則瞳人偏斜重則瞳人反背初起宜用鈎籐飲疎散風邪定後用天門冬飲調理即愈

鈎籐飲

鈎籐五分 全蠍一錢炒去毒

川芎 人參

防風各七分 麻黃三分

天麻七分 殭蠶一錢二分炒

甘草三分炙

右為粗末以水二盞煎至一盞去渣不拘時服

天門冬飲

赤茯苓七分 羌活七分

天門冬一錢 五味子五分

人參七分 知母一錢

茺蔚子一錢 防風五分

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

小兒生贅歌

小兒生贅生瞼內初小漸大隱摩瞳赤澁淚多脾胃熱鈎割劆洗去瘀紅清胃散用車前子膏軍柴

桔黑芩風

註 小兒生贅之證生於眼胞之內初起如麻子久則漸長如豆隱摩瞳人赤澁淚出此乃脾胃積熱上衝所致先用手法或鈎割或劆洗散去外瘀後用清胃散清其內熱

清胃散方

車前子 石膏

大黃 柴胡

桔梗 黑參

黃芩　防風各一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去滓溫服

小兒疳眼歌

小兒疳眼肝脾病腫疼澁淚翳遮瞳咬甲揉鼻合面臥肥兒神麥荑連同

註小兒疳眼者初因飲食傷脾久則肝熱上衝腫痛難開隱澁淚多漸生白膜雲翳遮睛外則揚眉咬甲揉鼻喜合面而臥不喜擡頭宜用四味肥兒丸久服即效

四味肥兒丸方

神麴炒　麥芽炒

蕪荑　黃連炒各等分

右爲細末合勻水糊爲丸桐子大每服一錢空心白湯送下

小兒通睛歌

小兒通睛因驚振看東反西視斜偏牛黃珠麝竺金黛地龍蘇附珀油蠶

註小兒通睛之證或因驚恐或緣擊振致雙目睛通瞻視偏斜看東反西視左反右急用牛黃丸疎風鎮驚久則即成難治之證

牛黃丸方

牛黃三錢　珍珠三錢

麝香少許　天竺黃三錢

金箔量加爲衣　青黛三錢

地龍三錢　蘇合油五錢

白附子炮三錢　琥珀三錢

香油五錢　殭蠶三錢

以上九味各另研極細共爲一處用細甘草稍一兩煎汁次入蘇合油香油兌均和藥爲丸黃豆大金箔爲衣薄荷湯化下一丸忌一切酒麵辛熱生痰等物

眯目飛塵飛絲歌

眯目塵絲入目中淚澁難開睛痛疼初宜外治久生翳酒調散用草歸羌蟬蛸赤芍菊梢翹麻羌活大黃同

註　眯目者或飛塵飛絲風吹入目也其證淚多隱澁難開睛珠疼痛初得時宜翻轉眼皮用綿裹釵脚撥出眯物若日久生雲翳者宜用酒調散治之

酒調散方

甘草　當歸
茺蔚子　桑螵蛸
赤芍藥　蒼朮
菊花　桔梗

連翹　麻黄
羌活　大黄各一兩

右爲細末每服三錢酒調下不拘時服

補遺

能遠怯近歌

近視昏矇遠視明陽光有餘損陰精須用地芝丸枳殼菊花生地共天冬

註　能遠怯近者謂視物遠則能見近則昏矇也蓋由其人陽氣有餘陰精不足故光華散亂不能收斂於近也宜用地芝丸養陰久服則目自愈

地芝丸方

枳殼去穰　菊花各三兩
生地黄焙乾　天門冬去心各四兩

右爲細末煉蜜爲丸桐子大每服百丸食後茶清送下

能近怯遠歌

近視清明遠視昏陽光不足被陰侵定志丸用菖蒲遠硃砂人參白茯神

註　能近怯遠者非生成近視謂平昔無此證忽視物近則明了遠則昏暗也由其人陰氣偏

盛陽氣不足陽被陰侵是以光華不能發越於遠也宜定志丸補心壯神神足則自能遠視矣

定志丸方

菖蒲 二兩　遠志 二兩去心

硃砂 三錢研細另用　人參 一兩

白茯神 一兩

右為細末煉蜜為丸桐子大以硃砂為衣每服五十丸食後米飲湯送下

瞳神散大歌

瞳神散大風輪窄邪熱蒸之風氣攻或因思怒痰

寒瘧地黃丸內芍歸芎防巳丹柴知二地丹參獨

檗味寒茺

註 瞳神散大者謂瞳神散大風輪反為窄窄一週甚則一週如線乃邪熱內蒸風氣上攻所致亦有因憂思氣怒痰火傷寒瘧疾經産敗血等證而成宜用地黃丸

地黃丸方 一名羌活退翳丸

白芍藥 一兩三錢酒炒　當歸身 五錢酒炒

川芎 三錢酒洗　防巳 二錢酒製

牡丹皮 三錢酒洗　柴胡 三錢

知母 三錢鹽水炒　熟地黃 八錢焙

生地黃 八錢　丹參 五錢

獨活 三錢　黃檗 五錢酒製

五味子 三錢　寒水石 三錢

茺蔚子 五錢

右為細末煉蜜為丸桐子大每服三錢空心白滾湯送下

瞳神縮小歌

瞳神縮小如鍼簪勞傷精血損腎肝視不甚昏微

隱澁清腎抑陽芩檗連草決苓歸生地芍獨活知

枸杞寒

註 瞳神縮小者謂瞳神漸漸縮小如簪脚甚則如鍼乃淫慾勞傷精血虧損腎肝二經所致其證視物不甚昏惟覺羞明隱澁宜用清腎抑陽丸壯水以制陽也

清腎抑陽丸方

黃蘗鹽水製二兩　黃連酒炒二兩

草決明炒一兩　白茯苓一兩

當歸酒洗炒一兩　生地黃一兩

白芍藥酒炒一兩　獨活八錢

知母鹽水製一兩　枸杞子二兩

寒水石另研一兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三錢空心白滾湯送下

乾澁昏花歌

乾澁昏花肝腎病酒色勞瞻思慮傷四物五子車前子覆盆枸杞兔絲當熟地川芎芍地膚五膽膏宜外點良

註 乾澁昏花者謂目覺乾澁不爽視物昏花也此乃肝腎俱傷之候或因嗜酒恣慾或勞瞻竭視或思慮太過皆成此證宜用四物五子丸滋陰養水畧帶抑火以培其本也

四物五子丸方

車前子酒蒸　覆盆子

枸杞子　兔絲子酒煮爛

當歸酒洗　熟地黃

川芎　白芍藥

地膚子各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服二錢不拘時鹽湯送下

五膽膏

方見卷末

白眼痛歌

白眼痛病不紅腫紅絲赤脈沙澁疼肺脾濕熱兼伏火須辨赤脈三陽經桑皮湯澤元芩桔菊草旋苓桑麥冬

註 白眼痛者俗呼為害白眼其證不紅不腫沙澁疼痛多生紅絲赤脈乃脾肺絡傷濕熱兼氣分伏火上衝所致須看赤脈紅絲以辨三陽從上而下者太陽也羌活為使從下而上者陽明也升麻為使從外至內者少陽也柴

胡為使宜桑白皮湯主之

桑白皮湯方

澤瀉八分　元參八分

黃芩一錢　桔梗七分

菊花五分　甘草二分半

旋覆花一錢　茯苓七分

桑白皮七分　麥門冬一錢去心

右為粗末以水二盞煎至一盞去渣溫服

女子逆經歌

女子逆經血灌瞳滿眼如朱努肉生總因血熱經阻逆通經蘇木大黃紅芩連羌薄梔香附生地歸芍賊草芎

註女子逆經之證乃血逆上行衝灌瞳人以致滿眼赤澁或生努肉總由血熱經阻不行因而上逆也宜用通經散破血通經其血翳自退

通經散方

蘇木一兩　大黃五錢

紅花一兩　黃芩二兩

黃連　羌活

薄荷　黑梔子

香附　生地黃

當歸　赤芍藥

木賊　甘草

川芎各二兩

右為粗末令勻每服五錢以水一盞半煎至七分食後去渣溫服

行經目痛歌

女子行經目澁疼眩暈頭疼雲翳生去血過多肝藏損當歸補血薄羌茺柴胡蒺藜菊防草生地當歸白芍芎

註行經目痛者女子遇經行之際眼目澁痛頭疼眩暈腫澁難開生翳於黑睛上或如粟米或花翳白陷此因經行去血過多肝經虛損故也宜用當歸補血湯治之

當歸補血湯方

薄荷五分　羌活五分
茺蔚子一錢　柴胡八分
蒺藜一錢　菊花八分
防風八分　甘草四分
生地黃二錢　當歸一錢五分
白芍藥一錢　川芎八分
右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫
服

妊娠目病歌

妊娠目病有餘證須辨氣分血分瞖氣分旋螺瞳
散大天冬飲用茯苓知羌活防風參五味血分瘀
血並凝脂保胎芩芥歸芍草連翹芎地縮陳皮

註妊娠目病者為有餘之證有氣分血分之別
屬氣分者多見旋螺瞳人散大乃氣分之熱
宜天門冬飲屬血分者多生瘀血凝脂瞖障
乃血分之熱宜用保胎清火湯以治之

天門冬飲

天門冬一錢五分　茯苓一錢

知母一錢五分　羌活五分
防風五分　人參五分
五味子五分
右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫
服

保胎清火湯方

黃芩一錢一分　荊芥穗
當歸身　白芍藥各一錢
甘草炙三分　連翹一錢
川芎八分　生地黃
縮砂仁　陳皮各一錢
右為粗末以水二盞煎至一盞食遠去渣溫
服

產後病目歌

產後患目血不足病有三因治可通思哭勞瞻多
內障嗜辛厚味外障成外因頭風風瀾瀉四物補
肝香附芎夏枯熟地歸芍草隨人加減可收功

註產後患目乃去血過多不足之證病雖有三

因之別而治法可以加減變通內因者多緣思慮哭泣或竭視勞聽致成內障須四物補肝湯倍熟地芎歸外因者因嗜辛辣厚味或因頭風致成風赤濕爛宜本方倍香附川芎夏枯草隨證加減以治之

四物補肝湯方

香附（酒製）一錢五分　川芎一錢

夏枯草二錢　熟地黃（焙乾）四錢

當歸身（酒洗）二錢　白芍藥（酒洗）一錢五分

甘草（炙）五分

右為粗末以水二盞煎至一盞食遠去渣溫服

附外治方

焮腫膏方

膩粉少許　黃蠟

代赭石（研）各五錢　細磁末

黃蘗（細末）　麻油各一兩

右為極細末入銅杓內入油蠟同煎為膏塗患處

紫金膏方

爐甘石（爐甘石入大銀罐內鹽泥封固用炭火煅一炷香以罐通紅為度取起為末用黃連水飛過再入黃芩黃連黃蘗湯內將湯煮乾以甘石如松花色四兩）

黃丹（入鍋內炒黑色用草試之草灼提起如此三次研極細末水飛四兩）

硼砂（研細飛過）二錢　硃砂（研細飛過）二錢

輕粉五分　青鹽（水洗去泥）五分

珍珠三錢　白丁香（乳汁化開去渣）五分

沒藥五分　乳香五分

海螵蛸（去皮研細）二錢　枯礬五分

硇砂五分　當歸（研細）五分

川芎（研細）五分　黃連（研細）五分

甘草（研細）五分　麝香五分

冰片五分

如法炮製各研極細無聲用好白蜜十五兩入鍋內熬去沫只用白蜜十兩先下爐甘石攪勻次下黃丹攪勻再下諸藥不住手攪勻如紫金色不粘手為度

石燕丹方

爐甘石爐甘石入大銀罐內鹽泥封固用炭火煅一炷香以罐通紅爲度取起爲末用黃連水飛過再入黃芩黃連黃蘗湯內將湯煮乾以甘石如松花色四兩

硼砂銅杓內同水煮乾　石燕

琥珀　硃砂水飛各取淨末一錢五分

鷹屎白一錢如無白丁香代之　氷片

麝香各分半

右爲極細末研至無聲每用少許水蘸點眼

大眥

枯澁無淚加熊膽白蜜

血翳加真阿魏

黃翳加雞內金

風熱翳加蕤仁

熱翳加珍珠牛黃

冷翳加附子尖雄黃

老翳倍硼砂加豬胰子

摩風膏方

黃連　細辛

當歸　杏仁去皮尖爲霜

防風　松脂各五錢

白芷　黃蠟各一兩

麻油四兩

先將蠟油溶化前藥共研爲細末慢火熬膏

貼太陽穴

摩障靈光膏方

黃連剉如豆大一兩童便浸一宿曬乾爲末

黃丹水飛三兩　當歸酒洗二錢

麝香五分　乳香五分

輕粉一錢　硇砂一錢

白丁香一錢　龍腦一錢

海螵蛸另研細末一錢　爐甘石六兩以黃連一兩煎水淬七次研細

先用好白蜜十兩熬五七沸以淨紙搭去蠟

面除黃丹外下餘藥用柳木攪勻次下黃丹

再攪慢火徐徐攪至紫色却將乳香麝香輕

粉硇砂和勻入上藥內以不粘手爲度

廣大重明湯方

防風　菊花
龍膽草　甘草
細辛 各等分
右爲粗末水一盞煎半盞去渣帶熱薰洗
五膽膏方
豬膽汁　黃牛膽汁
羊膽汁　鯉魚膽汁 各二錢五分
白蜜 二兩　胡黃連 研末
青皮 研末　川黃連 研末

熊膽 各二錢五分
右將諸藥末與蜜並膽汁和勻入磁瓶內以
細紙封頭牢繫坐飯甑中蒸待飯熟爲度

御纂醫宗金鑑卷七十九

編輯刺灸心法要訣目錄

九鍼原始歌
九鍼式圖並九鍼主治法歌
行鍼次第手法歌 共十二歌
中指定同身寸圖
行鍼分寸法歌
十二經井滎俞經合原刺淺深歌
五藏井滎俞經合歌
六府井滎俞原經合歌

十二經表裏原絡總歌
肺經表裏原絡穴圖
肺經表裏原絡穴主治歌
大腸經表裏原絡穴圖
大腸經表裏原絡穴主治歌
脾經表裏原絡穴圖
脾經表裏原絡穴主治歌
胃經表裏原絡穴圖

胃經表裏原絡穴主治歌
心經表裏原絡穴圖
心經表裏原絡穴主治歌
小腸經表裏原絡穴圖
小腸經表裏原絡穴主治歌
腎經表裏原絡穴圖
腎經表裏原絡穴主治歌
膀胱經表裏原絡穴圖
膀胱經表裏原絡穴主治歌

三焦經表裏原絡穴圖
三焦經表裏原絡穴主治歌
心包絡經表裏原絡穴圖
心包絡經表裏原絡穴主治歌
膽經表裏原絡穴圖
膽經表裏原絡穴主治歌
肝經表裏原絡穴圖
肝經表裏原絡穴主治歌
八脈交會八穴歌
衝脈公孫穴圖
衝脈公孫穴主治歌
陰維內關穴圖
陰維內關穴主治歌
帶脈臨泣穴圖
帶脈臨泣穴主治歌
陽維外關穴圖
陽維外關穴主治歌
督脈後谿穴圖

督脈後谿穴主治歌
陽蹻申脈穴圖
陽蹻申脈穴主治歌
任脈列缺穴圖
任脈列缺穴主治歌
陰蹻照海穴圖
陰蹻照海穴主治歌
手足十二經所屬歌
天干十二經表裏歌

地支十二經流注歌
十二經相傳次序歌
十二經起止歌
十二經穴周流歌
十二經脈氣血多少歌

御纂醫宗金鑑卷七十九

編輯刺灸心法要訣

九鍼原始歌

九鍼因何而有名原於天地大數生始於一而終於九天地人時音律星風野九九八十一鍼應其數起黃鐘皮肉筋脈聲陰陽齒氣九竅關節通

註靈樞九鍼篇帝曰九鍼焉生何因有名岐伯曰天地之大數也始於一終於九一法天二法地三法人四法時五法音六法律七法星八法風九法野九鍼者聖人起天地之數始於一而終於九九而九之九九八十一以起黃鐘之數鍼之數應之而人之身形亦應之皮應天肉應地血脈應人筋應時聲應音陰陽應律齒面目應星氣應風九竅三百六十五絡應九野此天人相通之道也故一鍼皮二鍼肉三鍼脈四鍼筋五鍼骨六鍼調陰陽七鍼益精八鍼除風九鍼通九竅除三百六十五節氣各有所主也

九鍼式圖並九鍼主治法歌

一曰鑱鍼式圖



註 經之一曰鑱鍼者取法於巾鍼去末寸半卒銳之長一寸六分鑱者銳也卒者尾也謂此鍼長一寸六分上去末寸半下只留一分之鋒欲淺刺不令深入也

鑱鍼主治法歌

鑱鍼即今箭頭鍼主刺皮膚邪肉侵毋令深入瀉

陽氣邪正相安榮衛均

註 鑱鍼即今箭頭鍼也主刺邪熱病在頭身皮膚之證毋令深入深則有傷陽氣故必分許淺淺刺之使邪去而正不傷榮衛得和則病除矣

二曰員鍼式圖



註 經之二曰員鍼者取法於絮鍼筩其身而卵其鋒長一寸六分筩身卵鋒者謂身直如竹筩末鋒員如卵銳也

員鍼主治法歌

員鍼取法於絮鍼主治邪氣侵肉分筩身卵鋒不傷正利導分肉邪自平

註 員鍼即絮鍼也主治邪氣在分肉之間蓋筩身卵鋒利導分肉能使邪氣行而不傷於肌肉之正氣也

三曰鍉鍼式圖

註 經之三曰鍉鍼者取法於黍粟之銳長三寸

半黍粟之銳者員而微尖利於用補者也

鍉鍼主治法歌

鍉鍼之銳如黍粟恐其深入傷肌肉按脈勿陷以致氣刺之邪氣使獨出

註 鍉鍼之鋒如黍粟之銳主治邪在脈中不欲深入只按脈以侯氣至刺脈中之邪氣使獨出也若深按陷至肌肉邪氣雖出而肌肉之正氣必傷矣

四曰鋒鍼式圖



註 經之四曰鋒鍼者取法於絮鍼刃三隅長一寸六分其上去八分下留八分刃三隅者蓋直壯而銳可以寫熱出血也

鋒鍼主治法歌

鋒鍼卽今三稜名主刺瘤邪時氣壅發於經絡痼不解寫熱出血榮衞通

註 鋒鍼卽今三稜鍼主刺時氣溫熱瘤邪也凡

發於經絡中壅痼不解之病用三稜鍼之鋒利以寫熱出血使經絡開通榮衞調和而壅痼之疾愈矣

五曰鈹鍼式圖

註 經之五曰鈹鍼者取法於劍鋒廣二分半長四寸其必廣二分半長四寸末如劍鋒者取其能開通也

鈹鍼主治法歌

鈹鍼之鋒末如劍主刺寒熱兩相搏合而爲癰膿已成大膿一寫卽時和

註 鈹鍼之鋒末如劍者主刺寒熱相搏或邪氣鬱於榮衞凝滯不通發爲癰疽其膿已成用此開之以取大膿大膿寫則陰陽和而癰熱愈矣

六曰員利鍼式圖

註 經之六曰員利鍼者取法於氂鍼微大其末

反小其身長一寸六分其取法於氂者以毛之强者曰氂用其細健可稍深也

員利鍼主治法歌

員利鍼形尖如氂主治虛邪客於經暴痺走注歷節病刺之經絡卽時通

註 員利鍼尖其形如氂員而且銳主治虛邪客於經絡而爲暴痺與走注歷節疼痛等病以此刺之則經絡流通而虛邪自去矣

七曰毫鍼式圖

註 經之七曰毫鍼者尖如蚊虻喙取法於毫毛長一寸六分其必尖如蚊虻喙者取其微細徐緩也

毫鍼主治法歌

毫鍼主治虛痺纏養正除邪在徐緩寒熱痛痺浮淺疾靜入徐出邪正安

註 毫鍼者因取法於毫毛故名之也主刺邪客經絡而為痛痺邪氣輕淺者也凡正氣不足

之人用此鍼刺之靜以徐往漸散其邪微以久留繕養正氣則寒邪痛痺浮淺之在絡者皆可平也

八曰長鍼式圖

註 經之八曰長鍼者取法於綦鍼長七寸為其可以取深邪遠痺也

長鍼主治法歌

長鍼主治虛邪傷內舍骨解節腠殃欲取深邪除遠痺刺法得宜始可康

註 長鍼即今環跳鍼也主虛邪深入內舍於骨解腰脊節腠之間凡欲取深遠疼痛之邪必得身長末鋒之鍼如法以刺之方能使深邪出遠痺解而得安康也

九曰大鍼式圖

註 經之九曰大鍼者取法於鋒鍼其鋒微員長四寸尖形如挺粗而且巨可以瀉通機關也

大鍼主治法歌

大鍼主刺周身病淫邪溢於肌體中為風為水關節痺關節一利大氣通

註 大鍼者即古人之燔鍼也凡周身淫邪或風或水溢於肌體留而不能過於關節壅滯為病者以此刺之使關節利大氣通則淫邪壅於經絡風虛腫毒傷於肌體者皆可去也

按 此九鍼皆本於靈樞經中大小長短之法無有異也但細玩經中九鍼之用凡所取者皆

言有餘之實邪則鍼之不宜於治虛也從可
知矣

行鍼次第手法歌

行鍼手法口訣多撮要編為十二歌取穴持溫進
指攝退搓撚留搖拔合

註 十二字分次第手法歌訣始自三衢楊繼洲
後之諸家口訣雖多皆不免於繁雜今撮其
要仍編為十二歌訣庶簡明切當便於後學

一取穴歌

取穴先將爪切深須教毋外慕其心令彼榮衛無

傷礙醫者方堪入妙鍼

註 凡下鍼用左手大指爪甲重切所鍼之穴令
氣血開散病者心專於內不要外馳然後下
鍼使鍼不傷榮衛方堪入妙也

二持鍼歌

持鍼之士要心雄手如握虎莫放鬆欲識機關三
部奥須將此理再推窮

註 凡下鍼之士須心小力雄以右手持鍼於穴
上勢若握虎不敢放鬆着力旋插直至應止
之處吸氣三口然後提鍼徐徐而用凡機關
三才奥理欲識於心而行於鍼者須將此再
三推窮可也

三溫鍼歌

溫鍼之理最為良口內溫和審穴方毋令冷熱相
爭搏榮衛宣通始安祥

註 凡下鍼必先將所用之鍼入於口中使之溫
熱審定穴所方可與刺勿令冷熱相爭庶血
氣調和而得安祥也

四進鍼歌

進鍼理法取關機失經失穴最不宜陽經取陷陰
經䐃三思已定鍼之愈

註 凡下鍼要病人神氣定息數勻醫者亦如之
關機最密切勿太忙須細審經絡穴所在何
部分不可輕施其鍼失於經絡穴所也如在
陽部必取筋骨間陷下之處則不傷於筋骨
如在陰分郄䐃之內動脈相應間則以爪重

切經絡少待片時方可進鍼而不傷於榮衛
又必三思已定然後下鍼病可愈矣

五指循歌

部分經絡要指循只爲鍼頭不緊沉推則行之引
則止調和血氣使來臨

註 凡下鍼若氣不至用指於所屬部分經絡之路上下左右推而行之引而止之往來循之使氣血上下均勻鍼下自然氣至沉緊得氣即寫之意也

六攝法歌

攝法原因氣滯經大指爪甲切莫輕以指攝鍼待
氣至邪氣流行鍼自輕

註 凡攝鍼者因鍼下邪氣滯澀不行也隨經絡上下用大指爪甲重切之使正氣流行則邪氣不能滯澀而鍼下自覺活動矣

七退鍼歌

退鍼手法理要知三才訣內總玄機一部六數三
吸氣須臾疾病自然愈

註 凡退鍼全在手法三才之內皆有要訣元機不可不知如欲退鍼必須緩緩而出自地部退至人部再漸退至天部俱用少陰之六數瀉之每一部六數須要少停三部共行三六一十八數令病人吸氣三口隨吸隨提徐徐退至天部其疾病自然除矣

八搓鍼歌

搓鍼瀉氣最爲奇氣至鍼纏莫就移渾如搓線攸
攸轉急則纏鍼肉不離

註 搓鍼者凡進退搓捻皆催其氣至以瀉邪氣也如覺鍼下氣緊切勿就移須用瀉法但微微動轉如搓線之狀若轉之太緊必至肉纏鍼頭邪氣滯澀而不能除矣

九撚鍼歌

撚鍼指法不相同一般在手兩般功內外轉移行
上下助正伏邪疾自輕

註 凡撚鍼時雖一般在手而指法不同故功有兩般也如欲治上則大指向外撚外撚者令

其氣向上也如欲治下則大指向内撚内撚者令其氣至下也内撚爲之補外撚爲之瀉如經絡向下者轉鍼頭逆之則爲迎也經絡向上者移鍼頭順之則爲隨也指法得宜則正氣自復而邪氣自退矣

十留鍼歌

留鍼取氣候沉浮出入徐徐必逗留能令榮衛縱横散巧妙元機在指頭

註留鍼者凡出鍼至於天部入鍼至於地部須在皮膚肌肉間徐徐容留令榮衛宣散方可出鍼入鍼若出鍼太急則血隨鍼出反傷榮衛其巧妙元機全在指頭也

十一搖鍼歌

搖鍼三部皆六搖依次推排在指梢孔穴大開無窒礙邪氣退除病自消

註搖鍼者如出鍼三部欲瀉之際每一部搖二三搖多者不過六搖而已以指捻鍼如扶人頭搖之之狀使孔穴開大無有窒礙庶邪氣退除而病愈矣

十二拔鍼歌

拔鍼之時切勿忙閉門存神要精詳不沉不緊求鍼尾此訣須當韞錦囊

註凡鍼畢拔鍼最要精詳不可輕率忙亂也如欲出鍼須待鍼下氣緩不沉不緊覺輕動滑快方以右指捻住鍼尾以左手大指按其鍼穴及穴外之皮令鍼穴門戸不開神氣内存然後拔鍼庶不致於出血此鍼家要訣須當韞於錦囊也

中指定同身寸圖

男左女右手中指
第二節屈指兩紋
尖相去為一寸取
稻稈心量或薄篾
量皆易折而不伸
縮為準用繩則伸
縮不便故多不準

行鍼分寸法歌

行鍼分寸中指傳屈指中節兩紋尖男左女右童稚一長短肥瘦審經權

注 行鍼取分寸法以同身寸法為準男左手女右手以中指第二節屈指兩紋尖相去為一寸童稚亦如之雖人身有長短體有肥瘦入鍼之分數不一而身形之長者其指節亦長身形短者其指節亦短但隨其長短以取分寸則自準矣肥人肌肉肥厚血氣充滿宜刺三分半瘦人肌肉瘦薄血氣未盛宜刺二分然雖如此猶當有經有權不可執一而論如遇不肥不瘦之人只在二三分之間酌量取之可也

十二經井滎俞經合原刺淺深歌

出井流滎注為俞行經入合藏俞原春宜鍼滎夏鍼俞秋宜鍼合冬井閒藏病鍼俞府病合藏府有病皆鍼原凡諸井穴肌肉淺不宜深鍼自古傳

注 井滎俞經合原十二經穴名也手足陽經有原穴手足陰經無原穴陰之俞穴即陰之原穴也所出為井井者如水之出也所流為滎滎者如水之流也所注為俞俞者如水之注也所行為經經者如水之行也所入為合合者如水之會也原者如水之源也夫春鍼滎者取絡脈在分肉間刺之[illegible]者也夏鍼俞者取孫絡在肌肉皮膚之[illegible]也秋鍼合者亦取絡脈在分肉間故如春時之所刺冬鍼井者取絡脈孫絡之下比他時所刺則深而留之

以冬氣入藏故也經原之原手足陰陽之經
諸病皆宜刺之但所刺有深有淺不能枚舉
此四時鍼刺之大旨自古相傳者也

五藏井滎俞經合歌

太陰肺脈井少商魚際之穴號滎那太淵一穴名
爲俞經渠經合尺澤當
太陰脾井隱白穴流於大都滎來接太白爲俞經
商坵陰陵泉與合爲穴
少陰心脈井少衝尋至少府即名滎神門一穴爲
俞穴經合靈道少海眞
少陰腎脈井湧泉然谷爲滎本天然太谿爲俞經
復溜陰谷爲合踝前旋
厥陰心包井中衝掌中勞宮即爲滎大陵穴取名
爲俞間使經合曲澤終
厥陰肝脈井大敦行間之穴便爲滎太衝之處爲
俞穴經合中封曲泉名

六府井滎俞原經合歌

陽明大腸井商陽二間爲滎俞三間合谷原經陽

谿取曲池爲合正相當
陽明胃脈井厲兌內庭爲滎須必要會陷谷名俞衝
陽原經合解谿三里位
太陽小腸井少澤流於前谷爲滎穴後谿爲俞原
腕谷經合陽谷小海欹
太陽膀胱井至陰通谷爲滎亦穴名束骨爲俞原
京骨崑崙爲經合委中
少陽三焦井關衝尋至液門號爲滎俞原中渚陽
池取經合支溝天井中
少陽膽脈井竅陰俠谿爲滎是穴名俞原臨泣坵
墟穴經歸陽輔合陽陵

十二經表裏原絡總歌

藏府有病均宜刺原絡表裏相隨看肺原太淵大
偏歷大腸合谷列缺端脾原太白胃豐隆胃衝
陽公孫間心原神門小支正小心腕骨通里邊腎
原太谿傍飛陽膀胱京骨大鍾班三焦陽池包內
關包原大陵焦外關膽原坵墟肝蠡溝肝膽太衝
光明關

註

凡藏府有病均可以刺之即難經云五藏六府有病皆取其原者是也蓋各經有所主之病必隨其各經表裏先主後客並刺之主者原穴也客者絡穴也如手太陰肺經病可刺本經裏之原穴即太淵穴也復刺大腸表之絡穴即偏歷穴也手陽明大腸經病可刺本經表之原穴即合谷穴也復刺肺經裏之絡穴即列缺穴也足太陰脾經病可刺本經裏之原穴即太白穴也復刺胃經表之絡穴即豐隆穴也足陽明胃經病可刺本經表之原

穴即衝陽穴也復刺脾經裏之絡穴即公孫穴也手少陰心經病可刺本經裏之原穴即神門穴也復刺小腸經表之絡穴即支正穴也手太陽小腸經病可刺本經表之原穴即腕骨穴也復刺心經裏之絡穴即通里穴也足少陰腎經病可刺本經裏之原穴即太谿穴也復刺膀胱經表之絡穴即飛揚穴也足太陽膀胱經病可刺本經表之原穴即京骨穴也復刺腎經裏之絡穴即大鍾穴也手少陽三焦經病可刺本經表之原穴即陽池穴也復刺心包絡經裏之絡穴即內關穴也手厥陰心包絡經病可刺本經裏之原穴即大陵穴也復刺三焦經表之絡穴即外關穴也足少陽膽經病可刺本經表之原穴即坵墟穴也復刺肝經裏之絡穴即蠡溝穴也足厥陰肝經病可刺本經裏之原穴即太衝穴也復刺膽經表之絡穴即光明穴也此十二經

主病之原穴為主絡穴為客隨表隨裏之刺法也

肺經表裏原絡穴圖

肺經表裏原絡穴主治歌

肺經原絡應刺病胸脹溏瀉小便頻洒翕寒熱欬喘短木痛皮膚肩缺盆

註 肺經裏之原穴太淵大腸表之絡穴偏歷二穴應刺之證即胸脹溏瀉小便頻數洒洒惡寒翕翕發熱咳嗽喘促短氣皮膚肩背缺盆麻木疼痛皆肺大腸經病也

大腸經表裏原絡穴圖

大腸經表裏原絡穴主治歌

大腸原絡應刺病大（大指）次（次指）不用肩臂疼氣滿皮膚木不仁面頰顋腫耳聾鳴

註 大腸表之原穴合谷肺經裏之絡穴列缺二穴應刺之證即手之大指次指不用肩臂疼痛皮膚麻木不仁面頰顋腫耳鳴耳聾皆大腸肺經病也

脾經表裏原絡穴圖

脾經表裏原絡穴主治歌

脾經原絡應刺病重倦面黃舌強疼腹滿時痛吐或瀉善飢不食脾病明

註 脾經裏之原穴太白胃經表之絡穴豐隆二穴應刺之證即身重倦怠面黃舌強而疼腹滿時時作痛或吐或瀉善飢而不欲食皆脾胃經病也

胃經表裏原絡穴圖

胃經表裏原絡穴主治歌

胃經原絡應刺病項膺股胻足跗疼狂妄高歌棄衣走惡聞烟火木音驚

註 胃經表之原穴衝陽脾經裏之絡穴公孫二穴應刺之證即項頸胸膺膀股脛胻足跗疼痛發狂妄言高歌棄衣而走惡烟火聞木音即驚皆胃脾經病也

心經表裏原絡穴圖

心經表裏原絡穴主治歌

心經原絡應刺病消渴背腹引腰疼眩仆欬吐下泄氣熱煩好笑善忘驚

註 心經裏之原穴神門小腸表之絡穴支正二穴應刺之證飲水即消背腹引腰作痛眩暈仆倒上欬吐下泄氣熱而心煩好笑善忘多驚皆心與小腸經病也

小腸經表裏原絡穴圖

小腸經表裏原絡穴主治歌

小腸原絡應刺病顴頷耳腫苦寒熱肩臑肘臂內外廉痛不能轉腰似折

註 小腸表之原穴腕骨心經裏之絡穴通里二穴應刺之證即顴頷耳腫苦寒熱肩臑肘臂內外側痛不能轉動腰痛似折皆小腸心經病也

腎經表裏原絡穴圖

腎經表裏原絡穴主治歌

腎經原絡應刺病大小腹痛大便難臍下氣逆脊背痛唾血渴熱兩足寒

註腎經裏之原穴太谿膀胱表之絡穴飛陽二穴應刺之證即大腹少腹脊背疼痛大便結燥臍下氣逆上冲口渴吐血兩足寒冷皆腎膀胱經病也

膀胱經表裏原絡穴圖

腎經表裏原絡穴主治歌

膀胱原絡應刺病目脫淚出頭項疼臍突大小腹脹痛按之尿難溲血膿

註膀胱表之原穴京骨腎經裏之絡穴大鍾二穴應刺之證即目胞脫陷淚出頭項疼痛臍突大腹少腹脹痛按之則尿難出而溲血膿皆膀胱腎經病也

三焦經表裏原絡穴圖



三焦經表裏原絡穴主治歌

三焦原絡應刺病，小指次指如廢同，目眥耳後喉腫痛，自汗肩臑內外疼。

註 三焦表之原穴陽池，心包裏之絡穴內關，二穴應刺之證，即手之小指次指如廢而不能用，目眥耳後咽喉腫痛，自汗肩臑內外側疼，皆三焦包絡經病也。

心包絡經表裏原絡穴圖

心包絡經表裏原絡穴主治歌

心包原絡應刺病，面紅目赤笑不休，心中動熱掌中熱，胸腋臂手痛中求。

註 心包裏之原穴大陵，三焦表之絡穴外關，二穴應刺之證，即面紅目赤好笑不休，心中動悸內熱，手心熱，胸腋與臂手疼痛，皆心包絡三焦經病也。

膽經表裏原絡穴圖

膽經表裏原絡穴主治歌

膽經原絡應刺病，口苦胸脇痛不寧，髀膝外踝諸節痛，太息馬刀俠瘤癭。

註：膽經表之原穴丘墟，肝經裏之絡穴蠡溝，二穴應刺之證，即口苦胸脇髀膝外踝諸節疼痛，太息馬刀瘻瘤，皆膽肝經病也。

肝經表裏原絡穴圖

肝經表裏原絡穴主治歌

肝經原絡應刺病，頭痛頰腫脇疝疼，婦人少腹胞中痛，便難溲淋怒色青。

註：肝經裏之原穴太衝，膽經表之絡穴光明，二穴應刺之證，即頭痛頰腫脇疝疼痛，婦人少腹胞中疼痛，大便難，小便淋，好怒色青，皆肝膽經病也。

八脈交會八穴歌

公孫衝脈胃心胸，內關陰維下總同，臨泣膽經連

帶脈陽維目銳外關逢後谿督脈內眥頸申脈陽蹻絡亦通列缺任脈行肺系陰蹻照海膈喉嚨

註 公孫二穴是足太陰脾經穴也通於衝脈內關二穴此二穴是手厥陰心包絡穴也四穴通於陰維脈四經會合循行之處在胃心胸之間故主治胃與心胸之病也○臨泣二穴是足少陽膽經穴也通於帶脈外關二穴此二穴是手少陽三焦經穴也四穴通於陽維脈四經會合連絡之處在於目銳眥耳後頰

頸肩之間故主治目銳眥耳後頰頸肩之病也○後谿二穴是手太陽小腸經穴也通於督脈申脈二穴此二穴是足太陽膀胱經穴也四穴通於陽蹻脈四經會合別絡之處在於目內眥頸項耳肩膊小腸膀胱之間故主治目內眥頸項耳肩膊小腸膀胱之病也○列缺二穴是手太陰肺經穴也通於任脈照海二穴此二穴是足少陰腎經穴也四穴通於陰蹻脈四經會合系絡之處在於肺系咽

喉胸膈之間故主治肺系咽喉胸膈之病也

衝脈公孫穴圖

衝脈公孫穴主治歌

九種心疼病不寧結胸翻胃食難停酒食積聚腸鳴見水食氣疾膈臍疼腹痛脇脹胸膈滿瘧疾腸風大便紅胎衣不下血迷心急刺公孫穴自靈

註 九種心疼者曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰蟲曰注曰去來痛結胸者胸滿鞕痛也翻胃者朝食暮吐食難停留也傷酒傷食積滯腸胃雷鳴水食氣疾膈間臍腹疼痛兩脇作脹胸膈滿悶瘧疾腸風大便下血以及婦人胞衣不下瘀血上攻迷心皆宜刺此公孫穴則立應也

陰維內關穴圖

陰維內關穴主治歌

中滿心胸多痞脹腸鳴泄瀉及脫肛食難下膈傷於酒積塊堅鞕橫脇旁婦女脇疼並心痛裏急腹痛勢難當傷寒不解結胸病瘧疾內關可獨當

註 中滿心胸痞脹不通快也腸鳴泄瀉者暴瀉脫肛也食難下膈傷於酒者謂嘔吐食不能下或因酒傷也積塊堅鞕橫衝於脇婦女心脇疼痛裏急脹痛傷寒結胸鞕痛瘧疾裏實等病皆刺內關無不愈矣

帶脈臨泣穴圖



帶脈臨泣穴主治歌

中風手足舉動難麻痛發熱筋拘攣頭風腫痛連顋項眼赤而疼合頭眩齒痛耳聾咽腫證遊風搔癢筋牽腿疼脇脹肋肢痛鍼入臨泣病可痊

註 中風手足舉動難謂手足不隨也若疼痛麻木拘攣兼發熱者風熱也頭風旋暈及腫痛連顋項目牙齒兩耳咽喉皆赤腫痛遊風搔癢筋脈牽引腰脇四肢與肋疼痛等證皆宜刺此臨泣穴立時有奇功也

陽維外關穴圖

陽維外關穴主治歌

肢節腫疼與膝冷四肢不遂合頭風背胯內外筋骨痛頭項眉稜病不寧手足熱麻夜盜汗破傷跟腫目睛紅傷寒自汗烘烘熱惟有外關鍼極靈

註 四肢骨節腫痛兩膝痺冷手足不遂偏正頭風脊背腰胯筋骨頭項眉稜疼痛手足發熱麻木夜間盜汗及破傷遊風跟腫痛兩眼赤紅傷寒陽明自汗蒸熱烘烘皆宜刺外關穴其病立已

督脈後谿穴圖

督脈後谿穴主治歌

手足拘攣戰掉眩中風不語並癲癇頭疼眼腫連漣淚背腰腿膝痛綿綿項強傷寒病不解牙齒顋腫喉病難手足麻木破傷風盜汗後谿穴先砭

〔註〕手足拘攣者屈伸難也戰掉者手足顫搖不能握也眩者暈也中風卒然昏仆不能語言癲癇不省人事痰涎抽掣頭痛及暴發火眼熱淚常流行痺腿膝背腰歷節周身疼痛項強傷寒感冒汗不出不能解上下牙齒顋齦咽喉腫疼手足麻木不仁破傷受風寢汗等證先砭後谿穴開通脈道無不愈矣

陽蹻申脈穴圖

陽蹻申脈穴主治歌

腰背脊強足踝風惡風自汗或頭疼手足麻攣臂間冷雷頭赤目眉稜痛吹乳耳聾鼻衄血癲癇肢節苦煩疼遍身腫滿汗淋漓申脈先鍼有奇功

註 腰背脊強不能俯仰也足內踝紅腫名遶踝風也足外踝紅腫名穿踝風也惡風自汗與雷頭風痛暴發火眼眉稜骨痛手足麻木拘攣臂冷及婦人吹乳乳房紅腫未産者名內吹已産者名外吹也耳聾鼻衄癲癇抽搐肢

節煩疼徧身腫滿頭汗淋漓等證此皆風熱痰飲流注攻衝爲病證宜先鍼申脈立時有功

任脈列缺穴圖

任脈列缺穴主治歌

痔瘧肛腫泄痢纏吐紅溺血嗽咳痰牙疼喉腫小便澁心胸腹疼噎咽難産後發強不能語腰痛血疾臍腹寒死胎不下上攻膈列缺一刺病乃痊

註 內痔肛腫泄痢赤白咳痰唾血溺血及牙齦咽喉腫痛小便赤澁艱難心胸腹痛噎咽不快産後發血上干心氣身發強直不能語言或瘀滯腰痛臍腹寒冷子死腹中胎衣不下上攻膈塞並刺列缺其證必痊

陰蹻照海穴圖

陰蹻照海穴主治歌

喉閉淋澁與胸腫膀胱氣痛並腸鳴食黃酒積臍腹痛嘔瀉胃翻及乳癰便燥難產血昏迷積塊腸風下便紅膈中不快梅核氣格主照海鍼有靈

註 上焦火盛咽喉閉塞不通下焦熱結膀胱氣痛小便淋澁胸中腫痛或食積酒積內蓄傷脾發黃或臍腹痛或嘔瀉胃番吐食乳癰夾便燥結及婦人生產艱難瘀血塊痛昏迷腸風下血不已或膈中之氣怏怏不快如梅核氣格塞咽喉之間咯之不出嚥之不下等疾急刺照海穴則諸證自散

手足十二經所屬歌

五藏六府共包絡手足所屬三陰陽太陰足脾手肺藏陽明足胃手大腸少陰足腎手心藏太陽足膀手小腸厥陰足肝手包絡少陰足膽手焦當

註 五藏心肝脾肺腎六府膽胃大腸小腸膀胱三焦共包絡分屬手足三陰三陽爲十二經也如肺手太陰心手少陰心包絡手厥陰手

之三陰也手太陽小腸手陽明大腸手少陽三焦手之三陽也足太陽膀胱足陽明胃足少陽膽足之三陽也足太陰脾足少陰腎足厥陰肝足之三陰也

天干十二經表裏歌

甲膽乙肝丙小腸丁心戊胃巳脾鄉庚屬大腸辛屬肺壬屬膀胱癸腎藏三焦陽府須歸丙包絡從陰丁火旁陽干爲表陰干裏藏府表裏配陰陽

按 舊云三焦亦向壬中寄包絡同歸入癸方夫

三焦爲決瀆之官猶可言壬而包絡附於心主烏可云癸况二藏表裏皆相火也故改正之

註 甲丙戊庚壬陽干也乙丁巳辛癸陰干也陽干爲表爲府陰干爲裏爲藏故曰藏府表裏配陰陽也

地支十二經流注歌

每日寅時從肺起卯時流入大腸經辰胃巳脾午心火未時應注小腸經申屬膀胱酉腎戌走包絡亥焦宮子膽丑肝寅又肺十二經脈週環行

註 人有十二經晝夜有十二時每一經主一時先從寅時入肺起卯入于大腸辰入於胃巳入於脾午入於心未入於小腸申入於膀胱酉入於腎戌入於包絡亥入於三焦子入於膽丑入於肝至於寅時則又從肺起此十二經與十二時相循環而行者也

十二經相傳次序歌

肺大胃脾心小腸膀腎包焦膽肝續手陰藏手陽手頭足陰足腹陽頭足

註 人身正脈十有二經每於平旦寅時營氣始於中焦上注手太陰肺經自胸中而出於中府至於少商以次行於手陽明大腸等十二經終於足厥陰肝經而復始於太陰肺經也凡手之三陰從藏走手手之三陽從手走頭足之三陰從足走腹足之三陽從頭走足周流不息循環無端也

十二經起止歌

肺起中府止少商大腸商陽止迎香胃起承泣終厲兌脾起隱白大包鄉心起極泉少冲止小腸少澤止聽宮膀胱睛明止至陰腎起湧泉俞府終包絡天池中冲止三焦關冲止竹空膽童子髎止竅陰肝起大敦止期門

十二經穴周流歌

中府爲初注少商少商別絡注商陽商陽復向迎香走香接頭維至庫房維下降分趨厲兌兌傳隱白至胸鄉隱白上升達大包大包仍續極泉場泉

貫少衝心部井少澤樹連前小腸澤會聽宮睛明
分睛明下造至陰强至陰斜出湧泉底泉穴還歸
腧府彧腧府天池横絡故池出中衝心主張中衝
並與關冲合關衝宛轉絲竹傍絲竹更貫瞳竅穴
瞳竅下入竅陰方竅陰横亘大敦井敦上期門肝
脈當期門歷遍還中府經絡周流仔細詳

十二經氣血多少歌

多氣多血惟陽明少氣太陽厥陰同二少太陰常
少血六經氣血要分明

註手陽明大腸足陽明胃此二經多氣多血之
經也三焦膽腎心脾肺此六經多氣少血也
心包絡膀胱小腸肝此四經乃多血少氣也

御纂醫宗金鑑卷八十

編輯刺灸心法要訣目錄

仰人諸經起止全圖
俯人諸經起止全圖
仰人骨度部位圖
俯人骨度部位圖
周身名位骨度
仰人骨度尺寸圖
俯人骨度尺寸圖
骨度尺寸
前頭面頸穴總圖
前頭面頸諸穴行列
胸腹穴總圖
胸腹諸穴行列
後頭項穴總圖
後頭項諸穴行列
背穴總圖
背穴行列

側頭面頸肩穴總圖
側頭面頸肩諸穴行列
側腹脇肋穴總圖
側腹脇肋諸穴行列
手三陰經總穴圖
手三陰經總穴名
手三陽經總穴圖
手三陽經總穴名
足三陰經總穴圖

足三陰經總穴名
足三陽經總穴圖
足三陽經總穴名

御纂醫宗金鑑卷八十

編輯刺灸心法要訣

仰人諸經起止全圖



俯人諸經起止全圖



正面骨度部位圖

背面骨度部位圖



周身名位骨度

頭

註 頭者人之首也凡物獨出之首皆名曰頭

腦

註 腦者頭骨之髓也俗名腦子

巔

註 巔者頭頂也巔頂之骨俗名天靈蓋

囟

註 囟者巔前之頭骨也小兒初生未闔名曰囟門已闔名曰囟骨卽天靈蓋後合之骨

面

註 凡前曰面凡後曰背居頭之前故曰面也

顏

註 顏者眉目間名也

額顱

註 額前髮際之下兩眉之上名曰額一曰顙者亦額之謂也

頭角

註 頷兩旁棱處之骨也

䫜骨

註 卽兩太陽之骨也

目

註 目者司視之竅也

目胞

註 目胞者一名目窠一名目裹卽上下兩目外衛之胞也

目綱

註 目綱者卽上下目胞之兩瞼邊又名曰睫司目之開闔也

目內眥

註 目內眥者乃近鼻之內眼角以其大而圓故又名大眥也

目外眥

註 目外眥者乃近䫜前之眼角也以其小而尖故稱目銳眥也

目珠

註 目珠者目睛之俗名也

目系

註 目系者目睛入腦之系也

目眶骨

註 目眶者目窠四圍之骨也上曰眉棱骨下卽䪼骨䪼骨之外卽顴骨

䪼

註 目下之眶骨顴骨內下連上牙床者也

頞

註 頞者鼻梁卽山根也

鼻

註 鼻者司臭之竅也兩孔之界骨名曰鼻柱下至鼻之盡處名曰準頭

頄

註 頄者頤內鼻旁間近生門牙之骨也

顴

註 顴者面兩旁之高起大骨也

顋

註 顱者俗呼為腮口旁頰前肉之空軟處也

耳

註 耳者司聽之竅也

蔽

註 蔽者耳門也

耳郭

註 耳郭者耳輪也

頰

註 頰耳前顴側面兩旁之稱也

曲頰

註 曲頰者頰之骨也曲如環形受頰車骨尾之鉤者也

頰車

註 頰車者下牙床骨也總載諸齒能咀食物故名頰車

人中

註 人中者鼻柱之下脣之上穴名水溝

口

註 口者司言食之竅也

脣

註 脣者口端也

吻

註 吻者口之四周也

頤

註 頤者口角後顱之下也

頦

註 頦者口之下脣至末之處俗名下巴殼也

頷

註 頷者頦下結喉上兩側肉之空軟處也

齒

註 齒者口齗所生之骨也俗名曰牙有門牙虎牙槽牙上下盡根牙

舌

註 舌者司味之竅也

舌本

註 舌本者舌之根也

頏顙

註 頏顙者口內之上二孔司分氣之竅也

懸雍垂

註 懸雍垂者張口視喉上似乳頭之小舌俗名碓嘴

會厭

註 會厭者覆喉管之上竅似皮似膜發聲則開嚥食則閉故爲聲音之戶也

咽

註 咽者飲食之路也居喉之後

喉

註 喉者通聲息之路也居咽之前

喉嚨

註 喉嚨者喉也肺之系也

嗌

註 嗌者咽也胃之系也

結喉

註 結喉者喉之管頭也其人瘦者多外見頸前肥人則隱於肉內多不見也

胸膺

註 胸者缺盆下腹之上有骨之處也膺者胸前兩旁高處也一名曰臆胸骨肉也俗名胸膛

䯏骬

註 䯏骬者胸之衆骨名也

乳

註 乳者膺上突起兩肉有頭婦人以乳兒者也

鳩尾

註 鳩尾者即蔽心骨也其質係脆骨在胸骨之下岐骨之間

膈

註 膈者胸下腹上之界內之膜也俗名羅膈

腹

註 腹者膈之下曰腹俗名曰肚臍之下曰少腹亦名小腹

臍

註 臍者人之初生胞帶之處也

毛際

註 毛際者小腹下橫骨間叢毛之際也下橫骨俗名蓋骨

篡

註 篡者橫骨之下兩股之前相合共結之凹也前後兩陰之間名下極穴又名屏翳穴會陰穴即男女陰氣之所也

睾丸

註 睾丸者男子前陰兩丸也

上橫骨

註 上橫骨在喉前宛宛中天突穴之外小灣橫骨旁接柱骨之骨也

柱骨

註 柱骨者膺上缺盆之外俗名鎖子骨也內接橫骨外接肩解也

肩解

註 肩解者肩端之骨節解處也

髃骨

註 髃骨者肩端之骨也即肩胛骨頭臼之上稜骨也其臼接臑骨上端俗曰肩頭其外曲卷翅骨肩後之稜骨也其下稜骨在背肉內

肩胛

註 肩胛者即髃骨之末成片骨也亦名肩髆俗名鍬板子骨

臂

註 臂者上身兩大支之通稱也一名曰肱俗名胳膊胳膊中節上下骨交接處名曰肘肘上

之骨曰臑骨肘下之骨曰臂骨臂骨有正輔二骨輔骨在上短細偏外正骨居下長大偏內俱下接腕骨也

腕

註 腕者臂掌骨接交處以其宛屈故名也當外側之骨名曰高骨一名銳骨亦名踝骨

掌骨

註 掌者手之衆指之本也掌之衆骨名壅骨合湊成掌非塊然一骨也

魚

註　魚者在掌外側之上隴起其形如魚故謂之魚也

手

註　手者上體所以持物也

手心

註　手心者即掌之中也

手背

註　手背者手之表也

指骨

註　指者手指之骨也第一大指名巨指在外二節本節在掌第二名食指又名大指之次指三節在外本節在掌第三中指名將指三節在外本節在掌第四指名無名指又名小指之次指三節在外本節在掌第五指爲小指三節在外本節在掌其節節交接處皆有碎骨筋膜聯絡

爪甲

註　爪甲者指之甲也足趾同

歧骨

註　歧骨者凡骨之兩叉者皆名歧骨手足同

髃

註　髃者肩髃下內側對腋處高起軟白肉也

腋

註　腋者肩之下脇之上際俗名胳肢窩

脇肋

註　脇者腋下至肋骨盡處之統名也曰肋者脇之單條骨之謂也統脇肋之總又名曰胠

季脇

註　季脇者脇之下小肋骨也俗名軟肋

眇

註　眇者脇下無肋骨空軟處也

腦後骨

註　腦後骨者俗呼腦杓

枕骨

註　枕骨者腦後骨之下隴起者是也其骨或棱

或平或長或圓不一

完骨

註 耳後之棱骨名曰完骨在枕骨下兩旁之棱骨也

頸項

註 頸項者頸之莖也又曰頸者莖之側也項者莖之後也俗名脖項

頸骨

註 頸者頭之莖骨肩骨上際之骨俗名天柱骨也

項骨

註 項骨者頭後莖骨之上三節圓骨也

背

註 背者後身大椎以下腰以上之通稱也

膂

註 膂者夾脊骨兩旁肉也

脊骨

註 脊骨者脊膂骨也俗名脊梁骨

腰骨

註 腰骨者即脊骨十四椎下十五十六椎間尻上之骨也其形中凹上寬下窄方圓二三寸許兩旁四孔下接尻骨上際也

胂

註 胂者腰下兩旁髁骨上之肉也

臀

註 臀者胂下尻旁大肉也

尻骨

註 尻骨者腰骨下十七椎十八椎十九椎二十椎二十一椎五節之骨也上四節紋之旁左右各四孔骨形內凹如瓦長四五寸許上寬下窄末節更小如人參蘆形名尾閭一名骶端一名橛骨一名窮骨在肛門後其骨上外兩旁形如馬蹄附着兩髁骨上端俗名胯骨

肛

註 肛者大腸下口也

下橫骨髁骨楗骨

註 下橫骨在少腹下其形如蓋故名蓋骨也其骨左右二大孔上兩分出向後之骨首如張扇下寸許附著於尻骨之上形如馬蹄之處名曰髁骨下兩分出向前之骨末如楗柱在於骨內名曰楗骨與尻骨成鼎足之勢為坐之主骨也婦人俗名交骨其骨面名曰髖俠髖之臼名曰機又名髀樞外接股之髀骨也即環跳穴處此一骨五名也

股

註 股者下身兩大支之通稱也俗名大腿小腿中節上下交接處名曰膝膝上之骨曰髀骨股之大骨也膝下之骨曰䯒骨脛之大骨也

髀骨

註 髀者膝上之大骨也上端如杵接於髀樞下端如鎚接於䯒骨也

䯒骨

註 䯒骨者俗名臁脛骨也其骨兩根在前者名成骨又名骭骨形粗膝外突出之骨也在後者名輔骨形細膝內側之小骨也

伏兔

註 伏兔者髀骨前膝之上起肉似俯兔故曰伏兔

膝解

註 膝解者膝之節解也

臏骨

註 臏骨者膝上蓋骨也

連骸

註 連骸者膝外側二高骨也

膕

註 膕者膝後屈處俗名腿凹也

腨

註 腨者下腿肚也一名腓腸俗名小腿肚

踝骨

註 踝者䯒骨之下足附之上兩旁突出之高骨在外為外踝在內為內踝也

足

註 足者下體所以趨走也俗名腳

跗骨

註 跗者足背也一名足趺俗稱腳面跗骨者足趾本節之衆骨也

足心

註 足心者卽踵之中也

跟骨

註 跟足後根之骨也

趾

註 趾者足之指也其數五名爲趾者別於手也居內之大者名大趾第二趾名大趾之次趾第三趾名中趾第四名小趾之次趾第五居外之小者名小趾足之指節與手指節同其大趾之本節後內側圓骨形突者名核骨

三毛

註 足大趾爪甲後爲三毛毛後橫紋爲聚毛

踵

註 踵者足下面着於地之謂也俗名腳底板

正面骨度尺寸圖



背面骨度尺寸圖



骨度尺寸

頭部

項髮以下至背骨長二寸半（自後髮際以至大椎項骨三節處也）

按頭部折法以前髮際至後髮際折為一尺二寸如髮際不明則取眉心直上後至大杼骨折作一尺八寸此為直寸橫寸法以眼內角至外角此為一寸頭部橫直寸法並依此○督脈神庭至太陽曲差穴曲差至少陽本神穴本神至陽明頭維穴各開一寸半自神庭

至頭維各開四寸半

胸腹部

結喉以下至缺盆中長四寸（此以巨骨上陷中而言即天突穴處）

缺盆以下髑骬之中長九寸

胸圍四尺五寸

兩乳之間廣九寸半（當折八寸為當）

髑骬中下至天樞長八寸（天樞足陽明穴名在臍旁此指平臍而言）

天樞以下至橫骨長六寸半橫骨橫長六寸半（毛際下骨曰橫骨）

按此古數也以今用上下穴法參較多有未合宜從後胸腹折法為當

兩髀之間廣六寸半（此當兩股之中橫骨兩頭之處俗名髀縫）

按胸腹折法直寸以中行為之自缺盆中天突穴起至岐骨際上中庭穴止折作八寸四分自髑骬上岐骨際下至臍心折作八寸臍心下至毛際曲骨穴折作五寸橫寸以兩乳相去折作八寸胸腹橫直寸法并依此

背部

膂骨以下至尾骶二十一節長三尺（膂骨脊骨也脊骨外小而內巨人之所以能負任者以是骨之巨也脊骨二十四節今云二十一節者除項骨三節不在內尾骶骨男子者尖女人者平）

腰圍四尺二寸

按背部折法自大椎至尾骶通折三尺上七節各長一寸四分一釐共九寸八分七釐中七節各一寸六分一釐共一尺一寸二分七釐第十四節與臍平下七節各一寸二分六釐共八寸八分二釐共二尺九寸九分六釐不

足過踵者有餘未盡也直寸依此橫寸用中指同身寸法○脊骨內濶一寸凡云第二行俠脊一寸半三行俠脊三寸者皆除脊一寸外淨以寸半三寸論故在二行當爲二寸在三行當爲三寸半也

側部

自拄骨下行腋中不見者長四寸 拄骨頸項根骨也

腋以下至季脇長一尺二寸 季脇小肋也

季脇以下至髀樞長六寸 大腿曰股股上曰髀楗骨之下大腿之上兩骨合縫之所曰髀樞當足少陽環跳穴處也

髀樞下至膝中長一尺九寸

横骨上廉下至內輔之上廉長一尺八寸 骨際曰廉膝旁之骨突出者曰輔骨內曰內輔外曰外輔

內輔之上廉以下至下廉長三寸半 上廉下廉可摸而得

內輔下廉下至內踝長一尺三寸

內踝以下至地長三寸

四肢部

肩至肘長一尺七寸

肘至腕長一尺二寸半 臂之中節曰肘臂之節曰腕

腕至中指本節長四寸 掌交曰腕

本節至末長四寸半 指之後節曰本節

膝以下至外踝長一尺六寸

膝膕以下至跗屬長一尺二寸 膕膝後曲處也跗足面也在前屬在後

跗屬以下至地長三寸 跗屬者凡兩踝前後脛掌所交之處皆爲跗之屬也

外踝以下至地長一寸

足長一尺二寸廣四寸半

按骨度乃靈樞經骨度篇文所論之長短皆古數也然骨之大者太過小者不及此亦但言其則耳至於周身手足折量之法當用前中指同身寸法爲是

前頭面頸總穴圖

頭部項中

中行凡一穴

百會屬督脈

頭部前

中行凡四穴

神庭 上星 顖會 前項俱屬督脈

兩旁第二行左右凡八穴

曲差 五處 承光 通天俱足太陽穴

兩旁第三行左右凡六穴

臨泣 目窗 正營俱足少陽穴

正面部

中行凡五穴

素髎 水溝 兌端 齗交俱督脈穴

承漿任脈穴

兩旁第二行左右凡十穴

攢竹 睛明俱足太陽穴 迎香

禾髎俱手陽明穴 巨髎足陽明穴

兩旁第三行左右凡十穴

陽白足少陽穴 承泣 四白 地倉

大迎俱足陽明穴

兩旁第四行左右凡八穴

本神 瞳子髎俱足少陽穴 絲竹空手少陽穴

顴髎手太陽穴

頸部

中行凡二穴

廉泉 天突俱屬任脈

胸腹穴總圖



胸部

中行凡七穴

天突　璇璣　華蓋　紫宮

玉堂　膻中　中庭俱任

兩旁第二行左右凡十二穴自俞府夾中行各去中行二寸

俞府　彧中　神藏　靈墟

神封　步廊俱足少陰

兩旁第三行左右凡十二穴自氣戶夾俞府旁二寸去中行四寸

氣戶　庫房　屋翳　膺窗

乳中　乳根俱足陽明

兩旁第四行左右凡十二穴自雲門夾氣戶兩旁二寸去中行六寸

雲門　中府俱手太陰　周榮　胸鄉

天谿　食竇俱足太陰

腹部

中行凡十五穴

鳩尾　巨闕　上脘　中脘

建里　下脘　水分　神闕

陰交　氣海　石門　關元

中極　曲骨　會陰俱任脉

兩旁第二行左右凡二十二穴自幽門夾巨闕兩旁各半寸循衝脈下行至橫骨

幽門　通谷　陰都　石關

商曲　肓俞　中注　四滿

氣穴　大赫　橫骨俱足少陰

兩旁第三行左右凡二十六穴自不容夾幽門兩旁各一寸五分去中行二寸

不容　承滿　梁門　關門

太乙　滑肉門　天樞　外陵
大巨　水道　歸來　氣衝 俱足陽明
急脈 足厥陰穴夾氣衝旁各半寸去中行二寸半
兩旁第四行左右凡十四穴 自期門上直兩乳夾不容旁各一寸五分去中行三寸半
期門 足厥陰　日月 足少陽　腹哀　大橫
腹結　府舍　衝門 俱足太陰

後頭項穴總圖



頭部後
中行凡五穴
後頂　強間　腦戶　風府
瘂門 俱屬督脈
兩旁第二行左右凡六穴
絡却　玉枕　天柱 俱足太陽穴
兩旁第三行左右凡六穴
承靈　腦空　風池 俱足少陽穴
兩旁第四行左右凡四穴
完骨 足少陽穴　天牖 手少陽穴

背穴總圖



背部

中行凡十四穴

大椎　陶道　身柱　神道

靈臺　至陽　筋縮　中樞

脊中　懸樞　命門　陽關

腰俞　長強 俱督脈

兩旁第二行左右凡十四穴

大杼　風門　肺俞　厥陰俞

心俞　膈俞　肝俞　膽俞

脾俞　胃俞　三焦俞　腎俞

大腸俞　小腸俞　膀胱俞　中膂俞

白環俞 上俱夾脊去中行二寸　上髎　次髎

中髎　下髎 上俱夾脊骨兩旁十七十八十九二十椎空中

會陽 夾尾骨兩旁 上俱足太陽穴

兩旁第三行左右凡二十八穴 去脊中行三寸五分

附分　魄戶　膏肓俞　神堂

譩譆　膈關　魂門　陽綱

意舍　胃倉　肓門　志室

胞肓　秩邊 俱足太陽



側頭面項肩總穴圖

側頭部

左右凡二十八穴

頭維（足陽明穴） 頷厭 懸顱 懸釐

曲鬢 率谷 天衝 浮白

竅陰（俱足少陽穴） 角孫 顱息

瘈脈 翳風 絲竹（俱手少陽穴）

側面部

左右凡十四穴

客主人 聽會（俱足少陽） 和髎 耳門（俱手少陽）

扶突之[illegible]

肩膊部

左右凡十二穴

巨骨 肩髃 臂臑（俱手陽明）

肩井（足少陽穴） 肩髎 臑會（俱手少陽穴）

側腋脇肋總穴圖

側腹脇肋部

左右凡二十穴

淵液　輒筋（足少陽）　天池（手厥陰）　大包（足太陰）

章門（足厥陰）　京門　帶脈　五樞

維道　居髎（俱足少陽）

附兩手奇俞穴

左右凡六穴

拳尖（在中指本節前骨尖上屈拳取之）

五虎（一在手食指背間一在無名指背間皆在次節三節相接尖上各一穴握拳取之）

手三陰經總穴圖

手三陰經總穴名

手太陰肺經行臂內凡九穴左右同（起手大指端行三陰之上）

少商　魚際　太淵　經渠

列缺　孔最　尺澤　俠白

天府

手厥陰心包絡經行臂內凡八穴左右同（起手中指端行三陰之中）

中衝　勞宮　大陵　內關

間使　郄門　曲澤　天泉

手少陰心經行臂內凡九穴左右同起手小指內側端行三陰之下

少衝　少府　神門　陰郄

通里　靈道　少海　青靈

極泉

手三陽經總穴圖

手三陽經總穴名

手陽明大腸經行臂外凡十四穴左右同起手食指端行三陽之上

商陽　二間　三間　合谷

陽谿　偏歷　溫溜　下廉

上廉　三里　曲池　肘髎

五里　臂臑

手少陽三焦經行臂外凡十二穴左右同起手無名指端行三陽之中

關衝　液門　中渚　陽池

外關　支溝　會宗　三陽絡

四瀆　天井　清冷淵　消濼

手太陽小腸經行臂外凡八穴左右同起手小指外側端行三陽之下

少澤　前谷　後谿　腕骨

陽谷　養老　支正　小海

足三陰經總穴圖

足三陰經總穴名

足厥陰肝經行足股內凡十一穴左右同 起足大指端行二陰之間

大敦 行間 太衝 中封

蠡溝 中都 膝關 曲泉

陰包 五里 陰廉

足太陰脾經行足股內凡十一穴左右同 起足大指內側端行三陰之中

隱白 大都 太白 公孫

商丘 三陰交 漏谷 地機

陰陵泉 血海 箕門

足少陰腎經行足股內凡十穴左右同 起足心行陰之交

湧泉 然谷 太谿 大鍾

照海 水泉 復溜 交信

築賓 陰谷

足三陽經總穴圖

足三陽經總穴名

足陽明胃經行足股外凡十五穴左右同起足三指端行二陽之前

厲兌　內庭　陷谷　衝陽

解谿　豐隆　下巨虛　條口

上巨虛　三里　犢鼻　梁邱

陰市　伏兎　髀關

足少陽膽經行足股外凡十五穴左右同起足四指端行二陽之中

竅陰　俠谿　地五會　[illegible]

邱墟　懸鐘　陽輔　光明

外邱　陽交　陽陵泉　陽關

中瀆　環跳　風市

足太陽膀胱經行足股後凡十九穴左右同起足小指外側端行二陽之後

至陰　通谷　束骨　京骨

京門　申脈　僕參　崑崙

附陽　飛陽　承山　承筋

合陽　委中　委陽　浮郄

殷門　承扶　會陽

御纂醫宗金鑑卷八十一

編輯刺灸心法要訣目錄
手太陰肺藏圖
肺藏經文
肺經循行圖
肺經循行經文
肺經循行歌
肺經穴圖
肺經穴歌
肺經分寸歌
手陽明大腸府圖
大腸經文
大腸經循行圖
大腸經循行經文
大腸經循行歌
大腸經穴圖
大腸經穴歌
大腸經分寸歌

足陽明胃府圖
胃府經文
胃經循行圖
胃經循行經文
胃經循行歌
胃經穴圖
胃經穴歌
胃經分寸歌
足太陰脾藏圖
脾藏經文
脾經循行圖
脾經循行經文
脾經循行歌
脾經穴圖
脾經穴歌
脾經分寸歌

編輯刺灸心法要訣

手太陰肺藏圖

肺臟經文

經云肺者相傳之官治節出焉其形四垂附着於脊之第三椎中有二十四空行列分布以行諸藏之氣為藏之長為心之蓋又云是經常多氣少血

難經曰肺重三觔三兩六葉兩耳凡八葉主藏魄

中藏經曰肺者生氣之原乃五藏之華蓋

張介賓曰肺葉白瑩謂為華蓋以覆諸藏虛如蜂窠下無透竅吸之則滿呼之則虛一呼一吸消息自然司清濁之運化為人身之槖籥

肺經循行圖

肺經循行經文

肺手太陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主之前下肘中循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端

肺經循行歌

手太陰肺中焦生絡腸循胃散流行上膈屬肺從肺系橫出腋下臑肘中循臂寸口上魚際大指內

側爪端通支絡還從腕後出接次指屬陽明經

註 手太陰肺經之脈起於中焦者言起於任脈中脘穴也下絡大腸還循胃口者謂本經之絡散布流行下則絡於大腸還上而循胃口非上膈屬肺直行之經也夫經絡流行循還無端故手太陰之脈必自足厥陰經之支者期門穴循行中脘穴上膈屬肺以交於手太陰肺經也從肺系橫出腋下至於中府雲門穴下循於臑內天府俠白穴從俠白行少陰心主經脈之前下行肘中尺澤穴從尺澤循臂內上骨下廉孔最穴從孔最入寸口列缺經渠太淵穴從太淵上魚 句 入魚際穴從魚際出大指之端少商穴而終焉其支者從腕後直出循行次指內廉出其端以交於手陽明大腸經也

肺經穴圖

肺經穴歌

手太陰肺十一穴中府雲門天府列次則俠白下尺澤又次孔最與列缺經渠太淵下魚際抵指少商如韭葉

肺經分寸歌

太陰中府三肋間上行雲門寸六許雲在任璣旁六寸大腸巨骨下二骨天府腋三動脈求俠白肘上五寸主尺澤肘中約紋是孔最腕上七寸擬列缺腕上一寸半經渠寸口陷中取太淵掌後橫紋

頭魚際節後散脈裏少商大指端內側鼻衄刺之
立時止
註中府在任脈中行華蓋穴旁直開去六寸乳上三肋間陷中動脈應手仰而取之是其穴也○上直行一寸六分在手陽明大腸經巨骨之下陷中動脈應手舉臂取之雲門穴也○從雲門穴下循臑內腋下三寸動脈陷中以鼻尖點墨取之天府穴也○從天府穴下行肘中約紋上去五寸動脈中俠白穴也○

從俠白穴下行肘中約紋上屈肘橫紋筋骨罅中動脈應手尺澤穴也○從尺澤穴下行腕前約紋上七寸上骨下骨開陷中孔最穴也○從孔最穴循外側行腕後側上一寸五分以兩手交叉當食指末筋骨罅中列缺穴也○從列缺穴循行寸口陷中經渠穴也○從經渠穴內循手掌後陷中太淵穴也○從太淵穴上魚手大指本節後內側陷中散脈中白肉際魚際穴也○從魚際穴循行手大指內側之端去爪甲角如韭葉許白肉際少商穴也

手陽明大腸府圖

大腸經文

經云大腸者傳道之官變化出焉又云迴腸當臍左迴十六曲大四寸徑一寸寸之少半長二丈一尺受穀一斗水七升半又云廣腸附脊以受迴腸乃出滓穢之路大八寸徑二寸寸之大半長二尺八寸受穀九升三合八分合之一是經多氣少血

難經曰大腸重二觔十二兩肛門重十二兩

張介賓曰按迴腸者以其迴疊也廣腸者即迴腸之更大者直腸者又廣腸之末節下連肛門也

大腸經循行圖

大腸經循行經文

大腸手陽明之脉起於大指次指之端循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉上臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出於柱骨之上會下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫頰入下齒中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔

大腸經循行歌

陽明之脉手大腸次指內側起商陽循指上廉出合谷歧骨兩筋循臂肪入肘外廉循臑外肩端前廉柱骨旁從肩下入缺盆內絡肺下膈屬大腸支從缺盆直上頸斜貫頰前下齒當環出人中交左右上俠鼻孔注迎香

【注】手陽明大腸經之脉起於大指次指內廉之端出於大指者謂出於大指少商穴也本經之絡其支者直出於次指之端以交於手陽明大腸經之商陽穴故曰起於大指次指之端也從商陽穴循食指上廉二間三間穴也

從三間穴循出兩骨之間合谷穴也從合谷
上兩筋之間陽谿穴也從陽谿穴循臂上廉
至偏歷溫溜下廉上廉三里穴也從三里穴
入肘外廉曲池穴也從曲池穴上臑外前廉
肘髎五里臂臑穴也從臂臑穴上肩髃穴
也從肩髃穴出髃骨之前廉巨骨穴也從巨
骨穴上出於柱骨之會上言會於督脈之大
椎穴也自督脈大椎穴入交足陽明胃經之
缺盆穴絡肺下膈屬大腸者謂其支從缺盆

上頸復循本經之天鼎穴貫頰至扶突穴也
從扶突穴入下齒中禾髎穴從禾髎穴還出
挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔迎香
穴而終以交於足陽明胃經也

大腸經穴圖



大腸經穴歌

手陽明穴起商陽二間三間合谷藏陽谿偏歷歷
溫溜下廉上廉三里長曲池肘髎迎五里臂臑肩
髃巨骨起天鼎扶突接禾髎終以迎香二十止

大腸經分寸歌

商陽食指內側邊二間來尋本節前三間節後陷
中取合谷虎口岐骨間陽谿上側腕中是偏歷腕
後三寸安溫溜腕後去五寸池前五寸下廉看池
前三寸上廉中池前二寸三里逢曲池曲肘紋頭

盡肘髎上臑外廉近大筋中央尋五里肘上三寸行向裏臂臑肘上七寸量肩髃肩端舉臂取巨骨肩尖端上行天鼎喉旁四寸真扶突天突旁三寸禾髎水溝旁五分迎香禾髎上一寸大腸經穴自分明

註　商陽穴在手食指內側端後去爪甲角如韭葉許是其穴也○從商陽穴循食指上廉本節前內側陷中二間穴也○從二間穴循食指本節後內側陷中三間穴也○從三間穴循行手大指次指岐骨間陷中合谷穴也○從合谷穴循行手腕中上側兩筋間陷中張大指次指取之陽谿穴也○從陽谿穴上行手腕後上側三寸偏歷穴也○從偏歷穴上行三寸溫溜穴也○從溫溜穴上行二寸五分輔銳肉分下廉穴也○從下廉穴上行一寸上廉穴也○從上廉穴上行一寸銳肉之端按之肉起手三里穴也○從手三里穴上二寸以手拱胸屈肘橫紋頭陷中取之曲池穴也○從曲池穴上行大骨外廉陷中肘髎穴也○從肘髎穴循行肘上三寸向裏大脈中央五里穴也○從五里穴上行四寸兩筋兩骨罅宛宛陷中伸臂平手取之臂臑穴也○從臂臑穴上行臂骨頭肩端上兩骨罅陷處宛宛中舉臂取之有空肩髃穴也○從肩髃穴上行臂端兩叉骨間陷中巨骨穴也○從巨骨穴循頸缺盆上直行扶突下一寸天鼎穴也○從天鼎穴上直行曲頰下一寸人迎後一寸五分仰而取之扶突穴也○從扶突穴貫頰直鼻孔下水溝旁五分禾髎穴也○從禾髎穴上一寸鼻孔旁五分迎香穴也

足陽明胃府圖



胃府經文

經云脾胃者倉廩之官五味出焉○又云胃者水穀氣血之海也○又云胃大一尺五寸徑五寸長二尺六寸橫屈受水穀三斗五升其中之穀常留二斗水一斗五升而滿○又云是經多氣少血

難經曰胃重二觔一兩

張介賓曰胃之上口名曰賁門飲食之精氣從此上輸於脾肺宣布於諸脈胃之下口卽小腸上口名曰幽門

胃經循行圖

胃經循行經文

胃足陽明之脈起於鼻之交頞中旁約太陽之脈下循鼻外入上齒中還出俠口環脣下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣街中其支者起於胃下口循腹裏下至氣街中而合以下髀關抵伏兎下膝臏中下循脛外廉下足跗入中指外間其支者下廉三寸而

別入中指外間其支者別跗上入大指間出其端

胃經循行歌

胃足陽明交鼻起下循鼻外入上齒還出俠口繞承漿頤後大迎頰車裏耳前髮際至額顱支下人迎缺盆底下膈入胃絡脾宮直者缺盆下乳內一支幽門循腹中下行直合氣衝逢遂由髀關抵膝臏胻跗足指內間同一支下膝注三里前出中指外間通一支別走足跗指大指之端經盡已

註足陽明胃經之脈起於鼻者是謂由迎香穴上交頞中兩旁約過足太陽脈之睛明穴分下循鼻外始交於足陽明之承泣四白巨髎穴也從巨髎入上齒中還出俠口之地倉穴還繞脣下交會任脈之承漿穴却循頤後下廉復交本經之大迎穴由大迎出循頰車穴上行耳前過客主人穴合少陽經循髮際至額顱兩旁之懸顱穴頷厭穴復交足陽明之頭維穴下關穴其支者行大迎穴從大迎前循人迎水突穴氣舍穴循喉嚨入缺盆穴下

膈屬胃絡脾散布藏府其直者從缺盆穴直行氣戶庫房屋翳膺窗乳中乳根等穴下乳內廉不容穴也從不容循承滿梁門關門太乙滑肉門等穴下俠臍天樞穴也從天樞外陵大巨水道歸來等穴入氣衝中氣衝穴也其支者起於胃口是謂前之屬胃絡脾之支下循腹裏下至氣衝中而合氣衝穴會衝脈上行者也其下行本經者髀關穴也抵伏兎至伏兎穴下從伏兎行陰市穴梁丘穴下膝臏中犢鼻穴循足三里上巨虛條口下巨虛等穴下循歷外廉豐隆穴也從豐隆循解谿穴下足跗衝陽穴也從衝陽行陷谷穴內庭穴入次指外間也其本支別支一自下巨虛穴下入次指外間一別循跗上入大指次指間厲兌穴由其端交於足太陰脾經也

按足陽明是足大指之次指不是中指必傳寫之誤

胃經穴圖

胃經穴歌

四十五穴足陽明承泣四白巨髎經地倉大迎登頰車下關頭維對人迎水突氣舍連缺盆氣戶庫房屋翳膺窗乳中下乳根不容承滿出梁門關門太乙滑肉起天樞外陵大巨裏水道歸來達氣街髀關伏兔走陰市梁邱犢鼻足三里上巨虛連條口下巨虛下有豐隆解谿衝陽陷谷同內庭厲兌陽明穴大指次指之端終

胃經分寸歌

胃之經兮足陽明承泣目下七分尋再下三分名四白巨髎鼻孔旁八分地倉俠吻四分近大迎頷下寸三中頰車耳下八分陷下關耳前動脈行頭維神庭旁四五人迎喉旁寸五真水突筋前人迎下氣舍喉下一寸乘缺盆舍下橫骨陷氣戶下行一寸明庫房下行一寸六屋翳膺窗乳中根不容巨闕旁二寸一寸承滿與梁門關門太乙滑肉門天樞臍旁二寸尋樞下一寸外陵穴陵下一寸大巨陳巨下三寸水道穴水下二寸歸來存氣街歸

來下一寸共去中行二寸匀髀關膝上尺二許伏兔髀下六寸是陰市伏兔下三寸梁邱市下一寸記犢鼻膝臏陷中取膝眼三寸下三里里下三寸上廉穴廉下二寸條口舉再下二寸下廉穴復上外踝上八寸却是豐隆穴當記解谿則從豐隆下內循足腕上陷中衝陽解下高骨動陷谷衝下二寸名內庭次指外岐骨厲兌大次指端中

註　承泣穴在目下七分目下胞陷中上直瞳子正視取之是其穴也○從承泣直下三分顴

空骨內亦直瞳子取之四白穴也○從四白
下行俠鼻孔旁八分亦直瞳子取之巨髎穴
也○從巨髎下行俠口吻旁四分外許近下
微有動脈地倉穴也○從地倉行頤頷下前
一寸三分骨陷中動脈大迎穴也○從大迎
行耳下曲頰端近前八分陷中側臥開口取
之頰車穴也○從頰車上行耳前動脈側臥
合口有空取之下關穴也○從下關上行額
角入髮際以督脈中行神庭穴旁開四寸半

頭維穴也○從頭維下行頸下俠結喉旁一
寸五分大動脈應手仰頭取之人迎穴也○
從人迎下直行頸大筋前肉貼氣喉水突穴
也○從水突下直行頸大筋前結喉下一寸
許陷中貼骨尖上有缺處氣舍穴也○從氣
舍下行肩上橫骨陷中缺盆穴也○從缺盆
下行巨骨下一寸旁開中行四寸陷中仰而
取之氣戶穴也○從氣戶下行一寸六分亦
旁開中行四寸陷中仰而取之庫房穴也○

從庫房下行一寸六分亦旁開中行四寸陷
中仰而取之屋翳穴也○從屋翳下行一寸
六分亦旁開中行四寸陷中仰而取之膺窗
穴也○從膺窗下行當乳頭之中乳中穴也
○從乳中下行一寸六分亦旁開中行四寸
陷中仰而取之乳根穴也○從乳根行在第
四肋端旁開中行二寸不容穴也○從不容
穴下一寸亦旁開中行二寸承滿穴也○從
承滿下一寸亦旁開中行二寸梁門穴也○

從梁門下一寸亦旁開中行二寸關門穴也
○從關門下一寸亦旁開中行二寸太乙穴
也○從太乙下一寸亦旁開中行二寸滑肉
門穴也○從滑肉門下一寸俠臍旁二寸許
陷中天樞穴也○從天樞下一寸亦旁開中
行二寸外陵穴也○從外陵下一寸亦旁開
中行二寸大巨穴也○從大巨下三寸亦旁
開中行二寸即水道穴也○從水道下二寸
亦旁開中行二寸即歸來穴也○從歸來下

行在腿班中有肉核名曰鼠谿直上一寸動脈應手亦旁開中行二寸氣衝穴也○從氣衝下行髀上一尺二寸許中行左右各三指按捺上有肉起如伏兎之狀故名伏兎在此肉起後交紋中髀關穴也○從髀關下行膝上六寸起肉間正跪坐而取之伏兎穴也○從伏兎下行三寸在伏兎之下陷中拜揖而取之陰市穴也○從陰市下行一寸兩筋間梁邱穴也○從梁邱下行過膝蓋骨下骱骨上陷中俗名膝眼此處陷中兩旁有空狀如牛鼻在外側者犢鼻穴也○從犢鼻下行骱骨外側大筋內宛宛中足三里穴也犢鼻即膝眼處也○從足三里下行三寸兩筋骨陷中舉足取之上巨虛穴也○從上巨虛下行二寸舉足取之條口穴也○從條口下行一寸兩筋骨陷中蹲地舉足取之下巨虛穴也○從下巨虛復斜向後上行在足外踝上八寸骱骨外廉陷中豐隆穴也○從豐隆內循

下足腕上中行陷中解谿穴也○從解谿下行足跗上即脚面也高骨間動脈衝陽穴也○從衝陽下行二寸至足大指之次指本節後陷中陷谷穴也○從陷谷下至足大指之次指本節前岐骨外間陷中內庭穴也從內庭下行足大指之次指之端去爪甲角如韮葉許厲兌穴也

足太陰脾藏圖



脾藏經文

經云脾胃者倉廩之官五味出焉○又云諫議之官知周出焉○又云形如刀鐮與胃同膜而附其上之左俞當十一椎下聞聲則動動則磨胃而主運化其合肉也其榮脣也開竅於口又云是經常多氣少血

難經曰脾重二斤三兩廣扁三寸長五寸有散膏半斤主裹血溫五藏主藏意與智

中藏經曰脾主消磨五穀養於四旁

脾經循行圖

脾經循行經文

脾足太陰之脈起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上腨內循脛骨後交出厥陰之前上膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中

脾經循行歌

太陰脾起足大指上循內側白肉際核骨之後內踝前上腨循脛經膝裏股內前廉入腹中屬脾絡胃與膈通俠喉連舌散舌下支絡從胃注心中

註 足太陰脾經之脈起於足大指之端隱白穴也從隱白循指內側白肉際大都穴也從大都過核骨後太白穴也從太白循公孫穴商邱穴上內踝前廉三陰交穴也從三陰交上腨內循脛骨後漏谷穴也從漏谷交出厥陰之前地機穴陰陵泉穴也從陰陵泉上膝股內前廉血海穴箕門穴沖門穴也從沖門入腹屬脾絡胃循行府舍腹結大橫腹哀食竇天谿胸鄉周榮大包等穴而上行咽喉俠咽

連舌本散舌下也其支者從胃之絡別行上
膈注心中以交於手少陰心經也

脾經穴圖



脾經穴歌

足太陰脾由足拇隱白先從內側起大都太白繼公孫商邱直上三陰塢漏谷地機陰陵泉血海箕門衝門前府舍腹結大橫上腹哀食竇天谿連胸鄉周榮大包盡二十一穴太陰全

脾經分寸歌

大指端內側隱白節後陷中求大都太白內側核骨下節後一寸公孫呼商邱內踝微前陷踝上三寸三陰交再上三寸漏谷是踝上五寸地機朝膝

下內側陰陵泉血海膝臏上內廉箕門穴在魚腹上動脈應手越筋間衝門橫骨兩端動府舍上行七分看腹結上行三寸入大橫上行一寸三腹哀上行三寸半食竇上行三寸間天谿上行一寸六胸鄉周榮亦同然外斜腋下六寸許大包九肋季脇端

註 隱白穴在足大指內側端後去爪甲角如韭葉許是其穴也○從隱白行足大指內側次節末骨縫赤白肉際陷中大都穴也○從大

都行足大指後內側內踝前核骨下赤白肉際陷中太白穴也○從太白上行足大指本節後一寸內踝前陷中公孫穴也○從公孫上行內踝下微前陷中商邱穴也○從商邱上行內踝踝尖上三寸夾骨陷中三陰交穴也○從三陰交上行三寸夾骨陷中漏谷穴也○從漏谷上行五寸在膝下五寸內側夾骨陷中伸足取之地機穴也○從地機上行膝下內側曲膝橫紋頭陷中陰陵泉穴也○

從陰陵泉上行在膝臏上一寸內廉白肉際陷中血海穴也○從血海上行在魚腹上越兩筋間陰股內廉動脈應手不禁重按箕門穴也○從箕門上行橫骨兩端約紋中動脈去腹中行旁開三寸半衝門穴也○從衝門上行七分去腹中行亦旁開三寸半府舍穴也○從府舍上行三寸去腹中行亦旁開三寸半腹結穴也○從腹結上行一寸三分去腹中行亦旁開三寸半大橫穴也○從大橫

上行三寸半去腹中行亦旁開三寸半腹哀穴也○從腹哀上行三寸或從乳上三肋間動脈應手處往下六寸四分去胸中行旁開六寸舉臂取之食竇穴也○從食竇上行一寸六分去胸中行旁開六寸仰而取之天谿穴也○從天谿上行一寸六分去胸中行亦旁開六寸仰而取之胸鄉穴也○從胸鄉上行一寸六分去胸中行亦旁開六寸仰而取之周榮穴也○從周榮外斜下行過少陽膽

經淵液穴下三寸至液下六寸許出九肋間季脇端大包穴也

御纂醫宗金鑑卷八十二

編輯刺灸心法要訣目錄

手少陰心藏圖
心藏經文
心經循行圖
心經循行經文
心經循行歌
心經穴圖
心經穴歌
心經分寸歌

手太陽小腸府圖
小腸經文
小腸經循行圖
小腸經循行經文
小腸經循行歌
小腸經穴圖
小腸經穴歌
小腸經分寸歌
足太陽膀胱府圖
膀胱經文
膀胱經循行圖
膀胱經循行經文
膀胱經循行歌
膀胱經穴圖
膀胱經歌
膀胱經分寸歌
手厥陰心包絡府圖

心包絡解
心包絡經循行圖
心包絡經循行經文
心包絡經循行歌
心包絡經穴圖
心包絡經穴歌
心包絡經分寸歌

編輯刺灸心法要訣

少陰心藏圖



心藏經文

經云心者君主之官神明出焉○又云心居肺管之下膈膜之上附着脊之第五椎其合脈也其榮色也開竅於耳又曰開竅於舌○又云是經少血少氣

難經曰心重十二兩中有七孔三毛盛精汁三合主藏神

張介賓曰心象尖圓形如蓮蕊其中有竅多寡不同以導引天真之氣下無透竅上通乎舌共有四系以通四藏心外有赤黃脂裹是爲心包絡心下有膈膜與脊脇周迴相着遮蔽濁氣使不得上熏心肺所謂膻中也

心經循行圖



心經循行經文

心手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心系上俠咽繫目系其直者復從心系却上肺下出腋下循臑內後廉行手太陰肺心主之後下肘內循臂內後廉抵掌後銳骨之端入掌內後廉循小指之內出其端

心經循行歌

手少陰脈起心中下膈直與小腸通支者還從肺系走直上喉嚨繫目瞳直者上肺出腋下臑後肘內少海從臂內後廉抵掌中銳骨之端注少衝

註 手少陰心經之脈起於心中出屬心系由心系下膈絡小腸其經之支者從心系上行俠咽繫目之系其經之直者復從心系退上通肺行手太陰肺心主之後下出行腋下極泉穴也從極泉穴循臑內後廉青靈穴也從青靈穴下肘內循臂內後廉少海穴也從少海穴抵掌後銳骨之端靈道通里陰郄神門等穴也從神門穴入掌內後廉少府穴也從少府穴循小指之內出其端少衝穴而終以交於手太陽小腸經也

心經穴圖

心經穴歌

手少陰心起極泉青靈少海靈道全通里陰郄神門下少府少衝小指邊

心經分寸歌

少陰心起極泉中腋下筋間動引胸青靈肘上三寸取少海肘後端五分靈道掌後一寸半通里腕後一寸同陰郄腕後內半寸神門掌後銳骨陷少府小指本節末小指內側取少衝

註 極泉穴在腋下臂內筋間動脈引胸中是其穴也○從極泉下行至肘在肘上三寸伸肘舉臂取之青靈穴也○從青靈下行肘內廉節後大骨外上去肘端五分肘內橫紋頭屈肘向頭取之少海穴也○從少海下行掌後一寸五分靈道穴也○從靈道下行五分循腕側外腕後一寸陷中通里穴也○從通里內行五分掌後脈中腕後五分陰郄穴也○從陰郄行掌後銳骨端陷中神門穴也○從神門行手小指本節末外側骨縫陷中少府

穴也○從少府行小指內中行去爪甲角如韭葉少衝穴也

手太陽小腸府圖



小腸經文

經云：小腸者受盛之官，化物出焉。又云：小腸後附於脊，前附於臍上，左環迴疊積十六曲，大二寸半，徑八分分之少半，長三丈二尺，受穀二斗四升，水六升三合合之大半。又云：小腸上口在臍上二寸近脊，水穀由此而入，復下一寸外附於臍，為水分穴，當小腸下口，至是而泌別清濁，水液滲入膀胱，滓穢流入大腸。又云：是經多血少氣。

難經曰：小腸重二斤十四兩。

小腸經循行圖

小腸經循行經文

小腸手太陽之脈，起於小指之端，循手外側上腕，出踝中，直上循臂骨下廉，出肘內側兩骨之間，上循臑外後廉，出肩解，繞肩胛，交肩上，入缺盆，絡心，循咽下膈，抵胃屬小腸。其支者，從缺盆循頸上頰，至目銳眥，却入耳中。其支者，別頰上䪼抵鼻，至目內眥，斜絡於顴。

小腸經循行歌

手太陽經小腸脈，小指之端起少澤，循手外側出踝中，循臂骨出肘內側，上循臑外出後廉，直過肩解繞肩胛，交肩下入缺盆內，向腋絡心循咽嗌，下膈抵胃屬小腸，一支缺盆貫頸頰，至目銳眥却入耳，復從耳前仍上頰，抵鼻升至目內眥，斜絡於顴別絡接。

註 手太陽小腸之經，從小指內側少陰之脈少衝穴，循小指之端少澤穴起，循手外側前谷穴、後谿穴，上腕至腕骨穴，從腕骨出踝中陽谷穴、養老穴也，從養老直上循臂骨下

廉支正穴也從支正出肘內側兩筋間小海穴也從小海上循臑外後廉出肩解肩貞穴繞肩胛臑俞穴上肩天宗穴也從天宗循行秉風曲垣等穴從肩中俞入缺盆穴散而內行絡心循咽下膈抵胃屬小腸之分其支者從缺盆循頸入天窗天容穴上頰顴髎穴至目銳眥卻入耳中聽宮穴也其別支從頰上䪼抵鼻至目內眥以交於足太陽經

小腸經穴圖

小腸經穴歌

手太陽經小腸穴少澤先於小指設前谷後谿腕骨間陽谷須同養老列支正小海上肩貞臑俞天宗秉風合曲垣肩外復肩中天窗循次上天容此經穴數一十九還有顴髎入聽宮

小腸經分寸歌

小指端外為少澤前谷本節前外側節後橫紋取後谿腕骨腕前骨陷側陽谷銳骨下陷肘腕上一寸名養老支正外側上四寸小海肘端五分好肩貞肩端後陷中臑俞肩髃骨陷考（肩髃骨陷者下中取胛骨上舉臂陷之也）天宗骨下陷中秉風肩上小髃空（肩上髃有空骨後舉臂有）曲垣肩中曲胛陷外俞上胛一寸從（卽外有俞肩胛上廉去脊三寸）中俞大椎二寸旁天窗曲頰動陷詳天容耳下曲頰後顴髎面頄銳骨端（面頄骨下廉銳骨端陷中）聽宮耳中珠子上（耳中珠子大如赤小豆）此為小腸手太陽

注　少澤穴在手小指外側端去爪甲角一分陷中是其穴也○從少澤上行手小指外側本節前陷中前谷穴也○從前谷上行手小指

本節後外側橫紋尖上陷中仰手握拳取之後谿穴也○從後谿上行手掌外側腕前起骨下歧縫陷中腕骨穴也○從腕骨上行手掌外側腕下銳骨下陷中陽谷穴也○從陽谷上行手下銳骨上一空處後一寸許陷中養老穴也○從養老上行外廉四寸支正穴也○從支正上行肘外大骨外去肘端五分陷中屈手向頭取之小海穴也○從小海上行肩曲胛骨下大骨傍兩骨解間肩端後陷

中肩貞穴也○從肩貞上行肩端臑上肩骨下胛骨上廉陷中舉臂取之臑俞穴也○從臑俞上行肩骨下陷中天宗穴也○從天宗上行肩上小髃骨舉臂有空秉風穴也○從秉風上行肩中央曲胛陷中按之應手痛曲垣穴也○從曲垣上行肩胛上廉去脊傍開二寸陷中肩外俞穴也○從肩外俞上行肩胛內廉去脊骨椎之大椎穴傍開二寸陷中肩中俞穴也○從肩中俞上行頸大筋前曲

頰下動脈應手陷中天窗穴也○從天窗上行耳下曲頰後天容穴也○從天容上行面頄骨下廉銳骨端陷中顴髎穴也○從顴髎上行耳中之珠聽宮穴也

足太陽膀胱府圖



膀胱經文

經云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣又云膀胱當十九椎居腎之下大腸之前有下口無上口當臍上一寸水分穴處爲小腸下口乃膀胱上際水液由此別迴腸隨氣泌滲而入其出入皆由氣化入氣不化則水歸大腸而爲泄瀉出氣不化則閉塞下竅而爲癃腫也是經多血少氣

難經曰膀胱重九兩二銖縱廣九寸盛溺九升九合口廣二寸半

膀胱經循行圖

膀胱循行經文

膀胱足太陽之脈起於目內眥上額交顛其直者從顛入絡腦還出別下項循肩髆內挾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下挾脊貫臀入膕中其支者從髆內左右別下貫胛挾脊內過髀樞循髀外從後廉下合膕中以下貫腨內出外踝之後循京骨至小指外側

膀胱經循行歌

足太陽經膀胱脈目內眥上起額尖支者顛上至

耳角直者從顛腦後懸絡腦還出別下項仍循肩髆俠脊邊抵腰脊腎膀胱內一支下與後陰連貫臀斜入委中穴一支髆內左右別貫胛俠脊過髀樞髀內後廉膕中合下貫腨內外踝後京骨之下指外側

註足太陽之脈起目內眥睛明穴從睛明循行攢竹曲差五處上額交顛入承光穴從承光循行通天穴其支者從顛至耳上角交於足少陽之經其直者從通天入絡於大杼穴從

大杼循行脊髆內風門穴從風門循行肺俞
穴挾脊抵厥中厥陰俞穴從厥陰俞穴循行
心俞鬲俞肝俞膽俞脾俞胃俞三焦俞入循
膂絡腎從腎俞穴循行氣海俞從腰中下挾
脊大腸俞穴從小腸俞循行關元俞膀胱俞
中膂俞白環俞等穴又從上髎次髎中髎下
髎等穴其支者又從二行髆內從附分穴循
行貫胛魄戶穴從魄戶循行挾脊內膏肓神
堂譩譆膈關魂門陽綱意舍胃倉肓門志室

胞肓等穴過髀樞秩邊穴從秩邊穴循髀外
從後廉承扶浮陽委陽穴下合膕中委中穴
從委中循行合陽穴從合陽下貫腨內承筋
穴從承筋循行承山飛陽附陽等穴從附陽
穴循行出外踝之後崑崙穴從崑崙穴循行
僕參申脈金門穴又至京骨即本經之京骨
穴也從京骨循行束骨通谷穴至小指外側
至陰穴而終以交于足之少陰經也

膀胱經穴圖



膀胱經穴歌

足太陽經六十三睛明攢竹曲差參五處承光接
通天絡却玉枕天柱邊大杼風門引肺俞厥陰心
膈肝膽居脾胃三焦腎俞次大腸小腸膀胱如中
膂白環皆二行去脊中間二寸許上髎次髎中後
下會陽須下尻旁取還從附分在三行二椎三寸
半相當魄戶膏肓與神堂譩譆膈關魂門旁陽綱
意舍及胃倉肓門志室連胞肓秩邊承扶殷門穴
浮郄相鄰是委陽委中再下合陽去承筋承山相

次長飛陽附陽達崑崙僕參申脈過金門京骨束骨近通谷小指外側尋至陰

膀胱經分寸歌

足太陽兮膀胱經目內眥角始睛明眉頭陷中攢竹取曲差神庭傍寸五五處直行後五分承通絡却玉枕穴後循俱足寸五行大杼項後髮際內大筋外廉之陷中自此脊中開二寸第一大杼二風門三椎肺俞厥陰四心五督六膈七論肝九膽十脾十一胃俞十二椎下尋十三三焦十四腎氣海

俞在十五椎大腸十六小十八膀胱俞穴十九椎中膂內俞二十下白環俞穴廿一椎小腸俞至白環內腰空上次中下髎會陽陰微尻骨旁背開三寸二行了別從脊中三寸半第二椎下爲附分三椎魄戶四膏肓第五椎下神堂尊第六譩譆膈關七第九魂門陽綱十十一意舍之穴存十二胃倉穴已分十三肓門端正在十四志室不須論十九胞肓廿秩邊背部三行下行循承扶臀下股上約下行六寸是殷門從殷外斜上一寸曲膝得之浮郄專委陽承扶下六寸從郄內斜並殷門委中膝膕約紋裏此下三寸尋合陽承筋腳跟上七寸穴在腨腸之中央承山腿肚分肉間外踝七寸上飛陽附陽外踝上三寸崑崙外跟陷中央僕參亦在踝骨下申脈踝下五分張金門申脈下一寸京骨外側大骨當束骨本節後陷中通谷節前限中量至陰小指外側端去爪甲之韭葉方

註 睛明穴在目內眥外一分宛宛中是其穴也○從睛明上行眉頭陷者中攢竹穴也○從

攢竹上行髮際間俠督脈之神庭穴傍開一寸五分正頭取之曲差穴也○從曲差後行五分俠督脈之上星傍開一寸五分五處穴也○從五處後行一寸五分承光穴也○從承光後行一寸五分俠督脈之百會穴傍開一寸五分通天穴也○從通天後行一寸五分絡却穴也○從絡却後行一寸五分玉枕穴也○從玉枕俠項後大筋外廉下行髮際陷中天柱穴也○從天柱下行以項後第一

椎下兩旁相去脊中各二寸陷中正坐取之大杼穴也○從大杼下行二椎下兩旁各去脊中二寸正坐取之風門穴也○從風門行三椎下去脊中各二寸又以手搭背左取右右取左當中指末是穴之處正坐取之肺俞穴也○從肺俞行四椎下去脊中二寸正坐取之厥陰俞穴也○從厥陰俞行五椎下去脊中二寸正坐取之心俞穴也○從心俞行六椎下去脊中二寸正坐取之督俞穴也○

從督俞行七椎下去脊中二寸正坐取之膈俞穴也○從膈俞行九椎下去脊中二寸正坐取之膽俞穴也○從膽俞行十一椎下去脊中二寸正坐取之脾俞穴也○從脾俞行十二椎下去脊中二寸正坐取之胃俞穴也○從胃俞行十三椎下去脊中二寸正坐取之三焦俞穴也○從三焦俞行十四椎下與臍平去脊中二寸正坐取之腎俞穴也○從腎俞行十五椎下去脊中二寸正坐取之氣

海俞穴也○從氣海俞行十六椎下去脊中二寸伏而取之大腸俞穴也○從大腸俞行十七椎下去脊中二寸伏而取之關元俞穴也○從關元俞行十八椎下去脊中二寸伏而取之小腸俞穴也○從小腸俞行十九椎下去脊中二寸伏而取之膀胱俞穴也○從膀胱俞行二十椎下去脊中二寸俠脊胂起肉間伏而取之中膂俞穴也○從中膂俞行二十椎下去脊中二寸伏而取之白環俞穴

也○從白環俞行腰髁骨下一寸俠脊兩旁第一空陷中上髎穴也○從上髎行俠脊旁第二空陷中次髎穴也○從次髎行俠脊旁第三空陷中中髎穴也○從中髎行俠脊旁第四空陷中下髎穴也○從下髎行陰尾尻骨兩旁五分許會陽穴也○自大杼別脉其支者從肩髆內循行第二椎下附項內廉兩傍相去脊中各三寸半正坐取之附分穴也○從附分下行第三椎下去脊中各三寸半

正坐取之魄戶穴也○從魄戶下行第四椎下五椎上此穴居中去脊中各三寸半正坐曲脊取之膏肓穴也如取其穴先令病人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂動乃從胛骨上角摸索至胛骨下頭其間當有四肋三間依胛骨之際相去骨際如容側指許按其中一間空處自覺牽引肩是其穴也○從膏肓下行第五椎下去脊中各三寸半陷中正坐取

之神堂穴也○從神堂下行第六椎下去脊中各三寸半正坐取之譩譆穴也以手重按病人呼譩譆是其穴處蓋因其痛也○從譩譆下行第七椎下去脊中各三寸半陷中正坐開肩取之膈關穴也○從膈關下行第九椎下相去脊中各三寸半陷中正坐取之魂門穴也○從魂門下行第十椎下去脊中三寸半陷中正坐取之陽綱穴也○從陽綱下行第十一椎下去脊中三寸半正坐取之意

舍穴也○從意舍下行第十椎下去脊中各三寸半正坐取之胃倉穴也○從胃倉下行第十三椎下去脊中各三寸半正坐取之肓門穴也○從肓門下行第十四椎下去脊中各三寸半陷中正坐取之志室穴也○從志室下行第十九椎下去脊中各三寸半伏而取之胞肓穴也○從胞肓下行第二十一椎下去脊中各三寸半陷中伏而取之秩邊穴也○從秩邊下行在尻臀下陰股上約紋中

承扶穴也○從殷門外微斜上一寸屈膝得之浮郄穴也故在委陽穴上一寸也○從浮郄下行仍在承扶穴下六寸屈伸取之委陽穴也而與合陽下合膕中也○從委陽下行膕中央約紋動脈陷中令人仰頦至地伏臥取之委中穴也○從委中下行膝膕約紋下三寸合陽穴也○從合陽下行腨腸中央陷中腳跟上七寸承筋穴也○從承筋下行腿肚下尖分肉間陷中承山穴也○從承山斜

行足外踝後上七寸陷中飛陽穴也○從飛陽下行足外踝上三寸筋骨之間附陽穴也○從附陽下行足外踝後五分跟骨上陷中細動脉應手崑崙穴也○從崑崙下行足跟骨下陷中拱足取之僕參穴也○從僕參行足外踝下五分陷中容爪甲許白肉際中脈穴也○從申脈下行一寸金門穴也○從金門行足外側大骨下赤白肉際陷中京骨穴也按而得之小指本節後大骨名京骨其穴在骨下○從京骨行足小指外側本節後陷中赤白肉際束骨穴也○從束骨行足小指外側本節前陷中通谷穴也○從通谷行足小指外側去爪甲角如韭葉至陰穴也

手厥陰心包絡圖

心包絡解

張介賓曰心包一藏難經言其無形滑壽曰心包一名手心主以藏象校之在心下橫膜之上豎膜之下其與橫膜相粘而黃脂裹者心也脂膜之外有細筋膜如絲與心肺相連者心包也此說爲是凡言無形者非○靈蘭秘典論有十二官獨少心包一官而有膻中者臣使之官喜樂由焉二句今考心包藏居膈上經始胸中正值膻中之所位居相火代君行事實臣使也此一官即此經之謂歟

心包絡經循行圖



心包絡循行經文

手厥陰心主包絡之脈起於胸中出屬心包絡下膈歷絡三焦其支者循胸中出脅下腋三寸上抵腋下循臑內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小指次指出其端

心包絡經循行歌

手厥陰心主起胸屬包下膈三焦宮支者循胸出脇下脇下連腋三寸同仍上抵腋循臑內太陰少陰兩經中指透中衝支者別小指次指絡相通

註 手厥陰心包絡之脈起於胸中出而外行天池穴屬心包絡之經也內行下膈歷絡三焦者散布於上中下也其支者循胸中出腋下三寸即天池穴處也從天池循臑內至天泉從天泉穴行手太陰手少陰兩經之間入肘內曲澤穴下臂行兩筋之間郄門間使內關大陵四穴入掌中勞宮穴從勞宮循中指出其端中衝穴也其本支之別支別行掌

中循小指次指之端以交於手少陽三焦經也

心包絡經穴圖

心包絡經穴歌

心包九穴天池近天泉曲澤郄門認間使內關踰大陵勞宮中衝中指盡

心包絡經分寸歌

心絡起自天池間乳後傍一腋下三天泉繞腋下二寸曲澤屈肘陷中參郄門去腕後五寸間使腕後三寸然內關去腕後二寸大陵掌後橫紋間勞宮屈拳名指取中指之末中衝端

［注］天池穴在乳傍一二寸許直腋下行三寸脇之撅起肋骨間是其穴也○從天池穴斜上繞腋循臂內廉下行二寸舉臂取之天泉穴也○從天泉穴下行肘內廉大筋內側橫紋頭下陷中動脈曲澤穴也○從曲澤穴下行掌後去腕五寸郄門穴也○從郄門穴下行掌後去腕三寸兩筋間陷中間使穴也○從間使穴下行掌後去腕二寸兩筋間內關穴也○從內關穴下行掌後骨下橫紋中兩筋間陷中大陵穴也○從大陵穴下行掌中央

動脈屈無名指取之勞宮穴也○從勞宮穴下行手中指之端去爪甲角如韭葉許陷中中衝穴也

御纂醫宗金鑑卷八十三

編輯刺灸心法要訣目錄

足少陰腎藏圖

腎藏經文

腎經循行圖

腎經循行經文

腎經循行歌

腎經穴圖

腎經穴歌

腎經分寸歌

手少陽三焦府圖

三焦經文

三焦經循行圖

三焦經循行經文

三焦經循行歌

三焦經穴圖

三焦經穴歌

三焦經分寸歌

足少陽膽府圖

膽府經文

膽經循行圖

膽經循行經文

膽經循行歌

膽經穴圖

膽經穴歌

膽經分寸歌

足厥陰肝藏圖

肝藏經文

肝經循行圖

肝經循行經文

肝經循行歌

肝經穴圖

肝經穴歌

肝經分寸歌

御纂醫宗金鑑卷八十三

編輯刺灸心法要訣

足少陰腎藏圖



腎藏經文

經云腎者作强之官伎巧出焉又云腎附於脊之十四椎下是經常少血多氣其合骨也其榮髮也開竅於二陰

難經曰腎有兩枚重一觔二兩主藏精與志

中藏經曰腎者精神之舍性命之根

張介賓云腎有兩枚形如豇豆相並而曲附於脊之兩旁相去各一寸五分外有黃脂包裹各有帶二條上條繫於心下條趨脊下大骨在脊骨之端如半手許中有兩穴是腎帶經過處上行脊髓至腦中連於髓海

腎經循行圖

腎經循行經文

腎足少陰之脈起於小指之下斜趨足心之湧泉穴出於然谷之下循內踝之後別入跟中以上腨內出膕內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨俠舌本其支者從肺出絡心注胸中

腎經循行歌

足腎經脈屬少陰小指斜趨湧泉心然骨之下內踝後別入跟中腨內侵出膕內廉上股內貫脊屬腎膀胱臨直者屬腎貫肝膈入肺循喉舌本尋支者從肺絡心內仍至胸中部分深

註　足少陰腎經之脈起自足太陽小指之下至陰穴斜趨足心湧泉穴出然谷穴之下循內踝後太谿穴從太谿別入跟中大鍾穴從大鍾循行水泉照海復溜交信穴上腨內築賓穴也從築賓出膕內廉陰谷穴從陰谷上股內後廉橫骨穴從橫骨內貫行脊屬腎絡膀胱也其直者從腎外行大赫氣穴四滿中注肓俞商曲石關陰都通谷等穴入內貫肝與膈外循幽門步廊神封靈墟神藏彧中俞府等穴入肺中循喉嚨俠舌本而終其支者從肺出絡心注胸中以交於手厥陰經也

腎經穴圖

腎經穴歌

足少陰腎二十七湧泉然谷照海出太谿水泉連大鍾復溜交信築賓立陰谷橫骨趨大赫氣穴四滿中注得肓俞商曲石關蹲陰都通谷幽門僻步廊神封出靈墟神藏彧中俞府畢

腎經分寸歌

足掌心中是湧泉然谷內踝一寸前太谿踝後跟骨上大鍾跟後踵中邊水泉谿下一寸覓照海踝下四分真復溜踝後上二寸交信後上二寸聯二

穴只隔筋前後大陰之後少陰前（前傍骨是復溜後傍骨是交信二穴只隔一條筋）築賓內踝上腨分陰谷膝下曲膝間橫骨大赫並氣穴四滿中注亦相連五穴上行皆一寸中行旁開五分邊肓俞上行亦一寸但在臍旁半寸間商曲石關陰都穴通谷幽門五穴聯五穴上下一寸取各開中行五分前步廊神封靈墟穴神藏彧中俞府安上行寸六旁二寸俞府璇璣二寸觀

註 湧泉穴在足心陷中伸腿屈足卷指宛宛中是其穴也○從湧泉上行足內踝前起大骨下陷中然谷穴也○從然谷行足內踝後五分跟骨上動脈陷中太谿穴也○從太谿行足跟後跟中大骨上兩筋間大鍾穴也○從大鍾行太谿下一寸內踝下水泉穴也○從水泉行足內踝下四分前後有筋上有踝骨下有軟骨之中陷中照海穴也○從照海行足內踝後除踝上二寸許前傍骨陷中復溜穴也○從復溜斜外上行復溜穴之後二寸

許後傍筋交信穴也○從交信斜外上行過三陰交穴上腨分中築賓穴也腨者俗名腿肚也○從築賓上行膝下內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝得之陰谷穴也○從陰谷上行入腹陰上橫骨中宛曲如仰月中央去任脈之中行旁開五分橫骨穴也○從橫骨上行一寸大赫穴也亦去中行旁開五分○從大赫上行一寸氣穴穴也亦去中行旁開五分○從氣穴穴上行一寸四滿穴也

亦去中行旁開五分○從四滿上行一寸中注穴也亦去中行旁開五分○從中注上行一寸盲俞穴也直臍旁去臍中五分○從盲俞上行二寸商曲穴也亦去中行旁開五分○從商曲上行一寸石關穴也亦去中行旁開五分○從石關上行一寸陰都穴也亦去中行旁開五分○從陰都上行一寸陷中通谷穴也亦去中行旁開五分○從通谷上行一寸陷中幽門穴也亦去中行旁開五分○

從幽門上行一寸六分陷中去中行旁開二寸仰而取之步廊穴也○從步廊上行一寸六分亦去中行旁開二寸仰而取之神封穴也○從神封上行一寸六分亦去中行旁開二寸陷中仰而取之靈墟穴也○從靈墟上行一寸六分亦去中行旁開二寸陷中仰而取之神藏穴也○從神藏上行一寸六分亦去中行旁開二寸陷中仰而取之彧中穴也○從彧中上行巨骨下俠任脈之璇璣中行

旁開二寸陷中仰而取之是其穴也

手少陽三焦府圖



三焦經文

經云上焦如霧中焦如漚下焦如瀆又云三焦者決瀆之官水道出焉又云是經少血多氣中藏經云三焦者人之三元之氣也號曰中清之府總領五藏六府營衛經絡內外左右上下之氣也三焦通則內外左右上下皆通也其於周身灌體和內調外榮左養右導上宣下莫大於此也

三焦經循行圖



三焦經循行經文

三焦手少陽之脈起於小指次指之端上出次指之間循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後入缺盆布膻中散絡心包下膈循屬三焦其支者從膻中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上角以屈下頰至䪼其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目銳眥

三焦經循行歌

手經少陽三焦脈起自小指次指端兩指岐骨手腕表上出臂外兩骨間肘後臑外循肩上少陽之後交別傳下入缺盆膻中分散絡心包膈裏穿支者膻中缺盆上上項耳後耳角旋屈下至䪼仍注頰一支出耳入耳前郤從上關交曲頰至目銳眥乃盡焉

註手少陽三焦之脈起於手小指次指外側之端關衝穴從關衝上出兩指之間液門中渚穴循手腕表陽池穴也從陽池出臂外兩骨

之間外關支溝會宗三陽絡四瀆天井等穴上貫肘清冷淵穴也從清冷淵穴循臂臑外上肩循消濼臑會肩髎天髎穴從天髎穴而交出足少陽經之後入缺盆布膻中散絡心包下膈內而循行之分皆屬三焦經也其支者從膻中上外出缺盆上項天牖穴從天牖穴循繫耳後翳風瘈脈顱息穴從顱息直上出耳上角角孫穴絲竹空穴也由角孫絲竹空穴繞耳以屈下至䪼和髎耳門穴也其本支之別支者從耳後出走耳前過足少陽經客主人穴之前交頰至目銳之外皆以交於足少陽膽經也

三焦經穴圖

三焦經穴歌

手少三焦所從經二十三穴起關衝液門中渚陽池歷外關支溝會宗逢三陽絡入四瀆內注於天井清冷中消濼臑會肩髎穴天髎天牖經翳風瘈脈顱息角耳門和髎上行絲竹空

三焦經分寸歌

無名外側端關衝液門小次指陷中中渚液門上一寸陽池腕前表陷中外關腕後二寸陷關上一寸支溝名外關一寸會宗平斜上一寸三陽絡肘

前五寸四瀆稱天井肘外大骨後肘上一寸骨罅中井上一寸清冷淵消濼臂肘分肉端臑會肩端前三寸肩髎臑上陷中看天髎肩井後一寸天牖耳下一寸間翳風耳後尖角陷瘈脈耳後青脈看顱息青絡脈之上角孫耳上髮下間耳門耳前缺處陷和髎橫動脈耳前欲覓絲竹空何在眉後陷中仔細觀

註　關衝穴在手四指外側端去爪甲角如韭葉許是其穴也○從關衝上行手小指次指岐

骨間陷中握拳取之液門穴也○從液門上行一寸陷中中渚穴也○從中渚由四指本節直上行手表腕上陷中陽池穴也○從陽池上行手腕後二寸兩骨間陷中外關穴也○從外關上行一寸兩骨間陷中支溝穴也○從支溝外開一寸會宗穴也以支溝會宗二穴相並平直空中相離一寸也○從會宗內斜上行一寸臂上大交脈三陽絡穴也○從三陽絡上行肘前五寸外廉陷中四瀆穴也○從四瀆斜外上行肘外大骨尖後肘上一寸兩筋叉骨罅中屈肘拱胸取之天井穴也○從天井上行一寸伸肘舉臂取之清冷淵穴也○從清冷淵上行肩下臂外肘上分肉間消濼穴也○從消濼上行臑外去肩端三寸宛宛中臑會穴也○從臑會上行肩端臑上陷中斜舉臂取之肩髎穴也○從肩髎上行肩缺盆中直是少陽經之肩井穴後一寸天髎穴也○從天髎上行頸大筋外缺盆

上手太陽經天容穴後足太陽經天柱穴前足少陽膽經完骨穴下髮際中上斜俠耳後一寸天牖穴也○從天牖上行耳後尖角陷中按之引耳中痛翳風穴也○從翳風上行耳後中間雞足青絡脈中瘈脈穴也○從瘈脈行耳後上間青絡脈中顱息穴也○從顱息上行耳上上間髮際下開口有空角孫穴也○從角孫繞行耳前起肉當耳缺處陷中耳門穴也○從耳門行耳前兌髮下橫動脈

中和髎穴也從髮下卻鬢角也○從和髎上行眉後陷中絲竹空穴也

足少陽膽腑圖

膽腑經文

經云膽者中正之官決斷出焉又云是經多血少氣

又曰凡十一藏皆取決於膽也

難經曰膽在肝之短葉間重三兩三銖長三寸盛精汁三合

中藏經曰膽者清淨之府號曰將軍主藏而不寫

膽經循行圖



膽經循行經文

膽足少陽之脈起於目銳眥上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眥後其支者別銳眥下大迎合手少陽抵於䪼下加頰車下頸合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬膽循脅裏出氣街繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胸過季脅下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次指之間其支者別跗上入大指之間循大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛

膽經循行歌

足脈少陽膽之經始從兩目銳眥生抵頭循角下耳後腦空風池次第行手少陽前至肩上交少陽右上缺盆支者耳後貫耳內出走耳前銳眥循一支銳眥大迎下合手少陽抵項根下加頰車缺盆合入胸貫膈絡肝經屬膽仍從脅裏過下入氣街毛際縈橫入髀厭環跳內直者缺盆下腋膺過季脅下髀厭內出膝外廉是陽陵外輔絕骨踝前過足跗小指次指分一支別從大指去三毛之際接肝經

註　足少陽膽經之脈起於目之銳眥瞳子髎穴循聽會客主人穴上抵頭角頷厭穴也從頷厭循懸顱懸釐曲鬢率谷折而下行於耳後之天衝浮白竅陰完骨等穴折外上行至眉頭之本神陽白臨泣目窗正營承靈腦空等

穴循頸至風池穴過手少陽經天牖穴之前至肩上本經之肩井穴從肩井穴却交出於手少陽之後入缺盆處也其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眥後此一小支之脈行於頭之無穴處也又其支者別銳眥下手陽明之大迎穴合手少陽抵於䪼下加頰車下頸合缺盆穴以下入胸中貫膈絡肝屬膽循脅裏出氣街散布蔽府外繞毛際橫入髀厭中環跳穴也其支者從缺盆下腋淵液穴

從淵液穴循胸輒筋穴也從輒筋日月穴過季脇至京門穴從京門循行帶脈五樞維道居髎下合髀厭中環跳穴也從環跳穴以下循髀陽風市穴從風市循行中瀆陽關出膝外廉陽陵泉穴也從陽陵泉穴循行陽交外邱光明等穴下外輔骨之前陽輔穴也從陽輔穴直下抵絶骨之端懸鍾穴從懸鍾下出外踝之前邱墟穴從邱墟穴循足跗上臨泣穴也從臨泣入小指次指之間俠谿竅陰穴

也其支者別跗上入大指之間循大指岐骨内出其端還貫爪甲出三毛以交於足厥陰肝經也

膽經穴圖



膽經穴歌

足少陽經童子髎四十三穴行迢迢聽會客主頷厭集懸顱懸釐曲鬢翹率谷天衝浮白次竅陰完骨本神至陽白臨泣開目窗正營承靈腦空是風池肩井淵液長輒筋日月京門鄉帶脈五樞維道續居髎環跳市中瀆陽關陽陵復陽交外邱光明陽輔高懸鍾邱墟足臨泣地五俠谿竅陰畢

膽經分寸歌

足少陽兮四十三頭上廿穴分三折起自童子至

風池積數陳之依次第外眥五分瞳子髎耳前陷
中尋聽會上行一寸客主人內斜曲角上頷厭後
行顱中釐下穴曲鬢耳前上髮際率谷入髮寸半
安天衝耳後斜二寸浮白下行一寸間竅陰穴在
枕骨下完骨耳後入髮際量得四分須用記本神
神庭旁三寸入髮四分耳上係陽白眉上一寸許
上行五分是臨泣臨後寸半目窗穴正營承靈及
腦空後行相去一寸五風池耳後髮陷中肩井肩
上陷中取大骨之前寸半明淵液腋下行三寸輒

筋復前一寸行日月乳下二肋縫下行五分是穴
名臍上五分傍九五季肋俠脊是京門季下寸八
尋帶脈帶下三寸穴五樞維道章下五三定維下
三寸居髎名環跳髀樞宛中陷風市垂手中指終
膝上五寸中瀆穴膝上二寸陽關尋陽陵膝下一
寸住陽交外踝上七寸外邱外踝七寸同此係斜
屬三陽分踝上五寸定光明踝上四寸陽輔穴踝
上三寸是懸鍾邱墟踝前陷中取邱下三寸臨泣
存臨下五分地五會會下一寸俠谿輪欲覓竅陰
穴何在小指次指外側尋

註 瞳子髎在目銳眥去眥五分是其穴也○從瞳子髎下外斜行耳前起骨上面下一寸耳珠下動脈宛宛中開口有空側臥張口取之聽會穴也○從聽會上直行一寸開口有空側臥張口取之客主人穴也○從客主人上內斜行兩太陽曲角上廉頷厭穴也○從頷厭後行耳前曲角上兩太陽之中懸顱穴也○從懸顱後行耳前曲角上兩太陽下廉懸

釐穴也○從懸釐後行耳前入髮際曲隅陷中鼓頷有空曲鬢穴也○從曲鬢後行耳上入髮際寸半陷者宛宛中嚼牙取之率谷穴也○從率谷後行耳後三分許入髮際二寸天衝穴也○從天衝下行耳後入髮際一寸浮白穴也○從浮白下行耳後高上枕骨下搖動有空竅陰穴也○從竅陰行耳後入髮際四分完骨穴也○從完骨折上行神庭旁三寸直耳上入髮際四分本神穴也○從本

神行眉上一寸直瞳子陽白穴也○從陽白上直行入髮際五分陷中正睛取之臨泣穴也○從臨泣後行一寸目窗穴也○從目窗後行一寸正營穴也○從正營後行一寸五分承靈穴也○從承靈後行一寸五分腦空穴也○從腦空下行耳後下髮際陷中大筋外廉按之引於耳中風池穴也○從風池下行肩上會其支者合缺盆上大骨前一寸半以三指按取當中指下陷中肩井穴也○從

肩井下行腋下三寸宛宛中舉臂取之淵液穴也○從淵液下行復前一寸三肋端橫直蔽骨旁七寸五分半直兩乳側臥屈上足取之輒筋穴也○從輒筋行乳下二肋端縫下五分日月穴也○從日月行監骨腰中季肋本俠脊臍上五分旁開九寸半側臥屈上足伸下足舉臂取之京門穴也○從京門下行季脅下一寸八分陷中臍上二分旁開八寸半帶脈穴也○從帶脈下三寸五樞穴也○

從五樞下行過肝經之章門穴下五寸三分維道穴也○從維道下行三寸監骨上陷中居髎穴也○從居髎下行髀樞中側臥伸下足屈上足取之環跳穴也○從環跳下行膝上外廉兩筋中以手着腿中指盡處風市穴也○從風市下髀骨外膝上外廉五寸分肉間陷中中瀆穴也○從中瀆下行膝上二寸犢鼻外陷中陽關穴也○從陽關下行膝下一寸外廉陷中尖骨前筋骨間蹲坐取之陽

陵泉穴也○從陽陵泉下行足外踝上七寸內斜三陽分肉間陽交穴也○從陽交行外踝上七寸外斜外丘穴也○從外丘下行外踝上五寸光明穴也○從光明下行一寸輔骨前絕骨端內斜三分陽輔穴也○從陽輔下行三寸外踝骨尖內動脈中尋按取之懸鍾穴也○從懸鍾行外踝下斜前陷中丘墟穴也○從丘墟下行三寸在足小指四指本節後足跗間陷中臨泣穴也○從臨泣下行

五分足小指四指本節後間陷中地五會穴也○從地五會下行一寸足小指四指本節前岐骨間陷中俠谿穴也○從俠谿下行足小指四指外側端去爪甲角如韭葉竅陰穴也

足厥陰肝藏圖



肝藏經文

經云肝者將軍之官謀慮出焉又云肝居膈下上着脊之九椎下是經常多血少氣其合筋也其榮爪也主藏魂開竅於目其系上絡心肺下亦無竅難經曰肝重二觔四兩左三葉右四葉凡七葉肝之為藏其治在左其藏在右脅右腎之前並胃着脊之第九椎

肝經循行圖



肝經循行經文

肝足厥陰之脈起於大指聚毛之上上循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膕內廉循股陰入毛中過陰器抵小腹俠胃屬肝絡膽上貫膈布脅肋循喉嚨之後上入頏顙連目系上出額與督脈會於巔其支者從目系下頰裏環脣內其支者復從肝別貫膈上注肺

肝經循行歌

厥陰足脈肝所終大指之端毛際叢足跗上廉太衝分踝前一寸入中封上踝交出太陰後循膕內廉陰股衝環繞陰器抵小腹俠胃屬肝絡膽逢上貫膈裏布脅肋俠喉頏顙目繫同脈上巔會督脈出支者還生目系中下絡頰裏環脣內支者便從膈肺通

註 足厥陰肝經之脈起於足大指聚毛之際大敦行間穴從行間上循足跗上廉太衝穴從太衝穴去內踝一寸至於中封穴也從中封穴循行內踝五寸入於蠡溝穴也從蠡溝上踝七寸中都穴上內踝八寸交出於足太陰陰經之後上踝內廉膝關曲泉穴也從曲泉循股陰陰包五里穴入於毛中之陰廉穴過陰器入抵小腹上行於章門穴從章門循行期門穴從期門內行俠胃屬肝絡膽上貫膈布脅肋散布於藏府循喉嚨之後上入頏顙連目系上額與督脈會於巔也其有一支者不上會於巔但從目下頰裏環脣內又一支復從肝別貫膈上注於肺以交於手太陰肺經也

肝經穴圖

肝經穴歌

足厥陰經一十四大敦行間太衝是中封蠡溝伴中都膝關曲泉陰包五里陰廉上急脉章門纔過期門至

肝經分寸歌

大敦足大端外側行間兩指縫中明太衝本節後二寸中封內踝前一寸蠡溝踝上五寸是中都上行二寸中膝關犢鼻下二寸曲泉曲膝盡橫紋陰包膝上行四寸氣衝三寸下五里陰廉氣衝下二寸急脉毛際旁二五厥陰大絡系睾丸章門臍上二旁六期門從章斜行乳直乳二肋端縫已

註大敦穴在足大指端去爪甲後如韭葉許外側聚毛中是其穴也○從大敦上行足大指次指岐骨縫間動脉應手陷中行間穴也○從行間上行二寸許足跗間動脉應手陷中太衝穴也○從太衝上行足內踝前一寸筋裏宛宛中中封穴也○從中封上行內踝上五寸蠡溝穴也○從蠡溝上行二寸當胻骨

中中都穴也○從中都上行犢鼻下二寸旁陷者中膝關穴也○從膝關上行膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝橫紋頭取之曲泉穴也○從曲泉上行膝上四寸股內廉兩筋間蹉足取之看膝內側有槽中陰包穴也○從陰包上行在足陽明胃經之氣衝穴下三寸陰股中動脉應手五里穴也○從五里上行羊矢下斜裏三分直上氣衝下二寸動脉陷中陰廉穴也○從陰廉上行陰上中行

兩旁相去二寸半按之隱指而堅甚按則痛引上下此厥陰之大絡爲舉之系急脈穴也○從急脈上行足太陰脾經之大横穴外季肋直臍軟骨端臍上二寸兩旁開六寸側臥取肘尖盡處章門穴也○從章門上行足陽明胃經之不容穴旁一寸五分上直乳第二肋端期門穴也

御纂醫宗金鑑卷八十四

編輯刺灸心法要訣目錄

奇經八脈總歌
任脈循行圖
任脈循行經文
任脈循行歌
任脈穴圖
任脈穴歌
任脈分寸歌
督脈循行圖
督脈循行經文
督脈循行歌
督脈穴圖
督脈穴歌
督脈分寸歌附督脈解
衝脈循行圖
衝脈循行經文
衝脈循行歌

衝脈穴圖
衝脈穴歌
衝脈分寸歌附任督衝一脈合解
帶脈循行圖
帶脈循行經文
帶脈循行歌
帶脈穴圖
帶脈穴歌
帶脈分寸歌

陽蹻陰蹻脈循行經文
陽蹻脈循行圖
陽蹻脈循行歌
陽蹻脈穴圖
陽蹻脈穴歌
陽蹻脈分寸歌
陰蹻脈循行圖
陰蹻脈循行歌
陰蹻脈穴圖
陰蹻脈穴歌
陰蹻脈分寸歌
陽維陰維脈循行經文
陽維脈循行圖
陽維脈循行歌
陽維脈穴圖
陽維脈穴歌
陽維脈分寸歌
陰維脈循行圖

陰維脈循行歌
陰維脈穴圖
陰維脈穴歌
陰維脈分寸歌

編輯刺灸心法要訣

奇經八脈總歌

正經經外是奇經八脈分司各有名任脈任前督於後衝起會陰腎同行陽蹻跟外膀胱別陰起跟前隨少陰陽維維絡諸陽脈陰維維絡在諸陰帶脈圍腰如束帶不由常度號奇經

註脈有奇常十二經者常脈也奇經則不拘於常故謂之奇也蓋人之氣血常行於十二經

脈經脈滿溢流入他經別道而行故名奇經奇經有八曰任督衝帶陽蹻陰蹻陽維陰維是也任脈任於前督脈督於後衝脈為諸脈之海帶脈猶身之束帶陽蹻為足太陽之別陰蹻為足少陰之別陽維則維絡諸陽陰維則維絡諸陰陰陽相維諸經乃調故此八脈譬猶圖設溝渠以備水潦斯無濫溢之患人有奇經亦若是也

任脈循行圖

任脈循行經文

素問骨空論曰任脈者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉上頤循面入目

靈樞五音五味篇曰衝脈任脈皆起於胞中上循背裏為經絡之海其浮而外者循腹上行會於咽喉別而絡口脣

任脈循行歌

任脈起於中極下會陰腹裏上關元循內上行會衝脈浮外循腹至喉咽別絡口脣承漿已過足陽

明上頤間循面入目至睛明交督陰脈海名傳

註任脈者起於中極之下中極者穴名也在少腹聚毛處之上毛際也中極之下謂曲骨之下會陰穴也以上毛際循腹裏上關元者謂從會陰循內上行會於衝脈爲經絡之海也其浮而外者循腹上行至於咽喉別絡口脣至承漿而終上頤循面入目至睛明者謂不直交督脈由足陽明承泣穴上頤循面入目內眥之足太陽睛明穴始交於督脈總爲陰脈之海也

任脈穴圖

任脈穴歌

任脈中行二十四會陰潛伏兩陰間曲骨之前中極在關元石門氣海邊陰交神闕水分處下脘建里中脘前上脘巨闕連鳩尾中庭膻中玉堂聯紫宮華蓋循璇璣天突廉泉承漿端

任脈分寸歌

任脈會陰兩陰間曲骨毛際陷中安中極臍下四寸取關元臍下三寸連臍下二寸名石門臍下寸半氣海全臍下一寸陰交穴臍之中央即神闕臍

上一寸爲水分臍上二寸下脘列臍上三寸名建里臍上四寸中脘許臍上五寸上脘在巨闕臍上六寸五鳩尾蔽骨下五分中庭膻下六寸取膻中卻在兩乳間膻上寸六玉堂主膻上紫宮三寸二膻上華蓋四八舉（四寸八分）膻上璇璣五寸入璣上一寸天突起天突喉下約四寸廉泉頷下骨尖已承漿頤前脣棱下任脈中央行腹裏

註 會陰穴在前陰後陰之中間任督衝三脈所起督由會陰而行背任由會陰而行腹衝由

會陰而行足也○從會陰上行橫骨上毛際陷中動脈應手臍下五寸曲骨穴也○從曲骨上行在臍下四寸中極穴也○從中極上行在臍下三寸關元穴也○從關元上行在臍下二寸石門穴也○從石門上行在臍下一寸五分宛宛中氣海穴也○從氣海上行在臍下一寸陰交穴也○從陰交上行當臍之中神闕穴也○從神闕上行臍上一寸水分穴也○從水分上行臍上二寸下脘穴也○從下脘上行臍上三寸建里穴也○從建里上行在臍上四寸中脘穴也○從中脘上行在臍上五寸上脘穴也○從上脘上行在兩岐骨下二寸巨闕穴也○從巨闕上行一寸鳩尾穴也○從鳩尾上行一寸陷中中庭穴也○從中庭上行一寸六分膻中穴也○從膻中上行一寸六分陷中玉堂穴也○從玉堂上行一寸六分陷中紫宮穴也○從紫宮上行一寸六分陷中華蓋穴也○從華

蓋上行一寸陷中璇璣穴也○從璇璣上行一寸天突穴也○從天突上行在頷下結喉上中央舌本下仰而取之廉泉穴也○從廉泉上行在頤前下脣棱下陷中承漿穴也

督脈循行圖



督脈循行經文

素問骨空論曰督脈者起於少腹以下骨中央女子入繫廷孔其孔溺孔之端也其絡循陰器合篡間繞篡後別繞臀至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後廉貫脊屬腎與太陽起於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項循肩髆內俠脊抵腰中入循膂絡腎其男子循莖下至篡與女子等其少腹直上者貫臍中央上貫心入喉上頤環脣上繫兩目之下中央

督脈循行歌

督脈少腹骨中央女子入繫溺孔疆男子之絡循陰器繞篡之後別臀方至少陰者循腹裏會任直上關元行屬腎會衝街腹氣入喉上頤環脣當上繫兩目中央下始合內眥絡太陽上額交巔入絡腦還出下項肩髆場俠脊抵腰入循膂絡腎莖篡等同鄉此是申明督脈路總爲陽脈之督綱

註 督脈者起於少腹下骨中央謂男女少腹以下橫骨內之中央即女子入繫廷孔之端男

子陰器合篡間也男子陰莖盡處精室孔溺孔合並一路合篡處也即女子胞孔溺孔合並之處廷孔之端即下文曰與女子等也其絡循陰器合篡間繞篡後行是謂本絡外合太陽中絡也別絡繞臀是謂別絡內並少陰腹裡也故經曰至少陰與巨陽中絡者合也至少陰者循行上股內後廉循腹裏與任脈上會於關元貫脊屬腎俠腎上行與衝脈會於腹氣之街故經曰自少腹直上貫臍中央

上貫心入喉上頤環脣內行至督脈齦交而終外行繫兩目之下中央循行目內眥會於太陽故經曰與太陽起於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項循肩髆內俠脊抵腰中入循膂絡腎復會於少陰此督脈之循行也

督脈穴圖



督脈穴歌

督脈行脈之中行二十八穴始長強腰俞陽關入命門懸樞脊中中樞長筋縮至陽歸靈臺神道身柱陶道開大椎瘂門連風府腦戶強間後項排百會前頂通顖會上星神庭素髎對水溝兌端在脣上齦交上齒縫之內

督脈分寸歌

尾閭骨端是長強二十一椎腰俞當十六陽關十四命三一懸樞脊中央十椎中樞筋縮九七椎之下乃至陽六靈五身三身柱陶道一椎之下鄉一

椎之上大椎穴上至髮際瘂門行風府一寸宛中取腦戶二五枕之方再上四寸強間位五寸五分後項強七寸百會頂中取耳尖前後髮中央前項前行八寸半前行一尺顖會量一尺一寸上星位前髮尺二神庭當鼻端準頭素髎穴水溝鼻下人中藏兌端唇上端上取齦交唇內齒縫鄉

註 督脈之別起於長強者即總督後外合太陽循行尾閭間長強穴也依脊上項散頭上下

當肩左右別走太陽入貫膂補脊脈循外而上行也故難經曰起於下極之俞即長強尾閭間也並於脊裏即俠脊也上至風府入屬於腦即上項散頭也從長強貫脊上行二十一椎下腰俞穴也十六椎下陽關穴也十四椎下命門穴也十三椎下懸樞穴也十一椎下脊中穴也十椎下中樞穴也九椎下筋縮穴也七椎下至陽穴也六椎下靈台穴也五椎下神道穴也三椎下身柱穴也一椎下陶

道穴也一椎之上大椎穴也上至上髮際瘂門穴也從瘂門入髮際風府穴也從風府上行一寸五分枕骨上腦戶穴也從腦戶上行一寸五分強間穴也從強間上行一寸五分後頂穴也從後頂上行一寸五分直兩耳尖頂陷中百會穴也從百會前行一寸五分前頂穴也從前頂前行一寸五分顖會穴也從顖會又前行一寸上星穴也從上星至前髮際神庭穴也前後髮際合骨度共一尺二寸也從前髮際下至鼻端準頭素髎穴也鼻柱下溝中央近鼻孔陷中水溝穴也唇上端兌端穴也唇內齒上齦縫中齦交穴也凡二十八穴循行背之中行者也

按督脈始於長強者本自靈樞經脈篇曰督脈之別名長強俠膂上項散頭上下當肩胛左右別走太陽入貫膂難經二十八難曰督脈者起於下極之俞並於脊裡之上至風府入屬於腦乃指穴而言也前論督脈起於少腹者是指循行而言也

衝脈循行圖



衝脈循行經文

素問骨空論曰衝脈者起於氣街並於少陰之經俠臍上行至胸中而散

靈樞衛氣篇曰請言氣街胸氣有街腹氣有街頭氣有街脛氣有街故氣在頭者止之於腦氣在胸者止之膺與背俞氣在腹者止之背俞與衝脈在臍之左右之動脈者氣在脛者止之於氣街與承山踝上

衝脈循行歌

衝脈起於腹氣街後天宗氣氣衝來並於先天之眞氣相並俠臍上胸街大氣至胸中而散會合督任充身懷分布藏府諸經絡名之曰海不爲乖

註　衝脈者起於氣街是起於腹氣之街也名曰氣街者是謂氣所行之街也一身之大氣積於胸中者有先天之眞氣是所受者卽人之腎間動氣也有後天之宗氣是水穀所化者卽人之胃氣也此所謂起於腹氣之街者是起胃中穀氣也並於少陰者是並於腎間動

氣也其眞氣與穀氣相並俠臍上行至胸中而散是謂大氣至胸中分布五藏六府諸經而充身者也靈樞順逆肥瘦篇曰衝脈者五藏六府之海也五藏六府皆稟氣焉靈樞動俞篇又曰衝脈者十二經之海與少陰之大絡起於腎下出於氣街也靈樞五音五味篇又曰衝脈任脈皆起於胞中者卽此之起於腎下之謂也而謂起於腎下者卽並於少陰之經腎間動氣上行也素問骨空論曰衝脈

起於氣衝者即此出於氣街之謂也不曰起
而曰出者謂穀氣由陽明胃經出而會於氣
街也

衝脈穴圖



衝脈穴歌

衝脈俠臍起橫骨大氣四注肓俞同商石陰通幽
門穴至胸散布任流行

衝脈分寸歌

衝脈分寸同少陰起於橫骨至幽門上行每穴皆
一寸穴開中行各五分

註衝脈起於足陽明並於足少陰腹氣之街俠
臍中行左右五分而上行自少腹下尖陰上
橫骨穴從橫骨穴上行大赫氣穴四海中注
肓俞商曲石關陰都通谷幽門等共十一穴
每穴上行相去各一寸中行左右各五分

按任督衝三脈素問骨空論曰任脈起於中極
之下毛際以上是外指少腹之分也循腹裏
是內指胞中也督脈起於少腹以下骨中央
女子廷孔男子陰器合篡貫脊屬腎亦是外
指少腹內指胞中也衝脈起於氣街並少陰
之經亦是指於胞中也雖未明言胞中而實
未嘗不起於胞中也是以知任督衝三脈皆

起於胞中然三脈皆後天水穀所化胃氣出於氣街會於胞中與先天腎間動之真氣並行而充身者也由此觀之三脈同出一源無疑矣故王冰內經註甲乙經鍼灸圖經以任脈循背者謂之督脈自少腹上謂之任脈亦謂之督脈則是以背腹陰陽別爲名目耳然衝脈亦起於胞中並足少陰而上行是任脈督脈衝脈乃一源而三歧者故人身之有腹背猶天地之有子午任督之有前後猶二陸之分陰陽也胞中者謂男女丹田之通稱也在女子謂之女子胞在男子即精室也

帶脈循行圖

帶脈循行經文

靈樞經脈別篇曰足少陰上至膕中別走太陽而合上至腎當十四椎出屬帶脈

三十八難曰帶脈者起於季脇迴身一周

帶脈循行歌

帶脈足少陰經脈上膕別走太陽經合腎十四椎
屬帶起於季脇繞身行

註帶脈本由足少陰經之脈上至膕中別走太陽而合腎當十四椎出屬帶脈故起於季脇

繞身一周行也

帶脈穴圖

帶脈穴次

帶起少陽帶脈穴繞行五樞維道間京門之下居髎上周廻季脇束帶然

註 足少陰之正脈出於然谷循內踝後其別者入膕中上腨內至膕中別走而合太陽上至腎之氣穴當十四椎內與足少陰衝脈會外與足少陽帶脈合會而不與衝脈偕行出於季脇屬少陽帶脈穴也故難經曰帶脈者起於季脇也廻身一周者謂起於足少陽帶脈穴循行五樞穴維道穴不行居髎穴廻行如帶故曰帶脈也

帶脈分寸歌

帶脈部分足少陽季脇寸八足其鄉由帶三寸五樞穴過章五三維道當

註 帶脈部分在足少陽經季脇之下一寸八分即帶脈穴也從帶脈穴下三寸即五樞穴也從五樞下行過肝經之章門穴下五寸三分即維道穴也

陽蹻脈循行圖

陽蹻陰蹻脈循行經文

靈樞脈度篇曰蹻脈者少陰之別起於然谷之後上內踝之上直上循陰股入陰上循胸裏入缺盆上出人迎之前入頄屬目內眥合於太陽陽蹻而上行氣並相還則為濡目氣不榮則目不合

二十八難曰陽蹻脈者起於跟中循外踝上行入風池陰蹻脈者亦起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脈

陽蹻脈循行歌

陽蹻脈起於跟中上合三陽外踝行從脇循肩入頸頄屬目內眥太陽經

注 陽蹻之脈起於足跟之中上合三陽外踝上行從脇少陽居髎之穴上循肩入頸頄陽明之肩髃承泣等穴屬目內眥而會太陽也

陽蹻脈穴圖

陽蹻脈穴歌

陽蹻脈起申僕陽居髎肩髃巨骨臑俞地倉巨髎泣終於睛明一穴強

陽蹻脈分寸歌

陽蹻脈起足太陽申脈外踝五分藏僕參後繞跟骨下附陽外踝三寸鄉居髎監骨上陷取肩髃一穴肩尖當肩上上行名巨骨肩胛之上臑俞坊口吻旁四地倉位鼻旁八分巨髎彊目下七分是承泣目內眥出睛明昂

註蹻者足也奇經涉於足者之名也曰陽者以其所行陽經也陽蹻者謂足太陽經之別脈也起於足太陽膀胱經足外踝下五分陷中申脈穴也從申脈繞後跟骨下僕參穴也從僕參穴又前斜足外踝上三寸附陽穴也又與足少陽會於季脇䯒骨端下八寸三分居髎穴也又與手陽明會於膊骨頭肩端上肩髃穴也從肩髃穴上行肩尖上兩叉骨巨骨穴也又與手足太陽陽維會於肩後大骨下胛上廉臑俞穴也又與手足陽明會於夾口吻旁四分地倉穴也從地倉穴行於鼻孔旁八分巨髎穴也又與任脈足陽明會於目下七分承泣穴也又與手足太陽足陽明陰蹻會於目內眥外一分睛明穴也

陰蹻脈循行圖



陰蹻脈循行歌

陰蹻亦起於跟中少陰之別內踝行上循陰股入
胸腹上至咽喉至睛明

註 陰蹻之脈亦起於跟中由少陰別脈然谷之
穴上行內踝循陰股入胸腹上至咽喉睛明
穴亦會於太陽也

陰蹻脈穴圖

陰蹻脈穴歌

陰蹻起於然谷穴上行照海交信列三穴原本足
少陰足之太陽睛明接

陰蹻脈分寸歌

陰蹻脈起足少陰足內踝前然谷尋踝下一寸照
海陷踝上二寸交信眞目內眥外宛中取睛明一
穴甚分明

註 陰蹻者以其所行陰經爲足少陰之別脈也
起於足少陰腎經足內踝前大骨下陷中然
谷穴也從然谷穴循內踝之下一寸照海穴
也從照海穴不循太谿穴又郄於足內踝之
上二寸直行交信穴從交信穴上循陰股入
陰而行上循胸裏入缺盆上出人迎之前入
頄鼻旁屬目內眥外宛宛中睛明穴合於太
陽陽蹻上行氣並相還則爲濡目之用矣故
知陰蹻脈氣若不與陽蹻脈氣並榮於目則
目不能合也此陰蹻循行之經脈也

陽維脈循行圖

陽維陰維脈循行經文

二十八難曰陽維陰維者維絡於身溢畜不能環流灌溢諸經者也故陽維起於諸陽之會陰維起於諸陰交也

陽維脈循行歌

陽維脈起足太陽外踝之下金門彊從胻背肩項面頭維絡諸陽會督場

註 陽維之脈起於足太陽經外踝之下金門穴也從胻骨背外肩胛項旁面上頭後至瘂門穴維絡諸陽會於督脈也

陽維脈穴圖



陽維脉穴歌

陽維脉起穴金門臑俞天髎肩井深本神陽白並臨泣正營腦空風池巡風府瘂門此二穴項後入髮足其根

陽維脉分寸歌

陽維脉起足太陽外踝一寸金門藏踝上七寸陽交位肩後胛上臑俞當天髎穴在缺盆上肩上陷中肩井鄉本神入髮四分許眉上一寸陽白詳入髮五分臨泣穴上行一寸正營場枕骨之下腦空位風池耳後陷中藏項後入髮瘂門穴入髮一寸風府疆

註陽維起於諸陽之會者謂起於足太陽膀胱經之足外踝下一寸金門穴也從金門穴行於足少陽膽經之足外踝上七寸陽交穴也又與手足太陽及蹻脉會於肩後大骨下胛上廉臑俞穴也又與手足少陽會於缺盆中上毖骨際天髎穴也又會於肩上陷中肩井穴也從肩井穴上頭與足少陽會於眉上一

寸陽白穴也從陽白穴上行於目上直入髮際本神臨泣穴也從臨泣穴上行二寸正營穴也從正營穴循行枕骨下腦空穴也從腦空穴下行至耳後大筋外廉風池穴也又與督脉會於項後風府瘂門穴此陽維脉氣所發也

陰維脉循行圖

陰維脈循行歌

陰維脈起足少陰內踝上行穴築賓循腹至乳上
結喉維絡諸陰會於任

註 陰維之脈起於足少陰經內踝上行築賓之穴循腹至乳上結喉至廉泉穴維絡諸陰會於任脈也

陰維脈穴圖

陰維脈穴歌

陰維之穴起築賓府舍大橫腹哀循期門天突廉
舌本此是陰維脈維陰

陰維脈分寸歌

陰維脈起足少陰內踝之後尋築賓少腹之下稱
府舍大橫平臍是穴名此穴去中三寸半行至乳
下腹哀明期門直乳二肋縫天突結喉下一寸

註 陰維起於諸陰之交者謂起於足少陰腎經之足內踝後上腨分中名曰築賓穴也與足太陰交於少腹下去腹中行三寸半府舍穴也又平臍去中行三寸半大橫穴也又行至乳下二肋端縫之下二寸腹哀穴也又與足厥陰交於乳下二肋端縫期門穴也又與任脈交於結喉下一寸宛宛中天突穴也從天突穴上行在頷下結喉上中央舌本下廉泉穴此陰維脈氣所發也

御纂醫宗金鑑卷八十五

編輯刺灸心法要訣目錄

前面要穴圖
後頭要穴圖
頭部主病鍼灸要穴歌
胸腹部要穴圖
胸腹部主病鍼灸要穴歌
背部要穴圖
背部主病鍼灸要穴歌
仰手要穴圖
覆手要穴圖
手部主病鍼灸要穴歌
陰足要穴圖
陽足要穴圖
足部主病鍼灸要穴歌

御纂醫宗金鑑卷八十五

編輯刺灸心法要訣

前面要穴圖

後頭要穴圖



頭部主病鍼灸要穴歌

百會主治卒中風兼治癲癇兒病驚大腸下氣脫肛病提補諸陽氣上升

註 百會穴提補陽氣上升主治大人中風痰火癲癇小兒急慢驚風大腸下氣脫肛等證鍼二分灸五壯

神庭主灸羊癇風目眩頭痛灸腦空翳風專刺耳聾病兼刺瘰癧項下生

註 神庭穴主治風癇羊癲灸三壯禁鍼刺○腦

空穴主治偏正頭疼目眩刺四分灸五壯○翳風穴主治耳聾及瘰癧鍼經云先將銅錢約二十文令患者咬之尋取穴中鍼三分禁灸

上星通天主鼻淵瘜肉痔塞灸能痊兼治頭風目諸疾炷如小麥灼相安

註 上星通天二穴主治鼻淵鼻塞瘜肉鼻痔左鼻灸右右鼻灸左左右鼻俱病者左右俱灸灸後鼻中當去一塊形如朽骨狀其病自愈兼治頭風目疾等證也上星穴宜刺三分留六呼灸五壯一云宜三稜鍼出血以瀉諸陽之熱氣通天穴宜刺三分留七呼灸三壯其壯如小麥大始相宜也

瘂門風府祇宜刺中風舌緩不能言頸項強急及瘛瘲頭風百病與傷寒

註 瘂門風府二穴主治中風舌緩暴瘖不語傷風傷寒頭痛項急不得回顧及抽搐等病瘂門穴鍼二分不可深入禁灸風府穴鍼三分

留三呼禁灸

頭維主刺頭風疼目痛如脫淚不明禁灸隨皮三分刺兼刺攢竹更有功

註 頭維攢竹二穴主治頭風疼痛如破目痛如脫淚出不明頭維穴隨皮鍼三分禁灸○攢竹穴刺一分留六呼禁灸隨皮者鍼入即眠鍼隨皮刺去也

率谷酒傷吐痰眩風池主治肺中寒兼治偏正頭疼痛頰車落頰風自痊

註 率谷穴主治傷酒嘔吐痰眩刺三分灸三壯
風池穴治肺受風寒及偏正頭風刺四分灸
三壯七壯炷宜小頰車穴治落頰風落頰風
者下頦脫落也刺三分灸三壯炷如小麥

臨泣主治鼻不通眵䁾冷淚雲翳生驚癇反視卒
暴厥日晡發瘧脇下疼

註 臨泣穴主治鼻塞目眩生翳眵䁾眼目諸疾
及驚癇反視卒暴痰厥瘧疾晚發等病刺三
分留七呼禁灸

水溝中風口不開中惡癲癇口眼歪刺治風水頭
面腫灸治兒風急慢災

註 水溝穴主治中風口噤牙關不開卒中惡邪
鬼擊不省人事癲癇卒倒口眼歪邪風水面
腫及小兒急慢驚風等病刺三分留六呼灸
三壯至七壯炷如小麥然灸不及鍼

承漿主治男七疝女子瘕聚兒緊脣偏風不遂刺
之效消渴牙疳灸功深

註 承漿穴主治男子諸疝女子瘕聚小兒撮口
及偏風半身不遂口眼喎邪口噤不開消渴
飲水不休口齒疳蝕生瘡等證刺二分留五
呼灸三壯

迎香主刺鼻失臭兼刺面癢若蟲行先補後瀉三
分刺此穴須知禁火攻

註 迎香穴主治鼻塞不聞香臭浮腫風動面癢
狀如蟲行等證鍼三分禁灸

口眼歪邪灸地倉頰腫脣弛牙噤強失音不語目
不閉瞤動視物目䀮䀮

註 地倉穴主偏風口眼歪邪牙關不開齒痛頰
腫目不能閉脣緩不收飲食難進失音不語
眼目瞤動視物䀮䀮昏夜無見等證刺三分
留五呼灸七壯或二七壯重者七七壯俱可

聽會主治耳聾鳴兼刺迎香功最靈中風瘈瘲喎
斜病牙車脫臼齒根疼

註 聽會穴主治耳聾耳鳴牙車脫臼齒痛中風
瘈瘲喎邪等證鍼四分灸三壯兼瀉迎香功
效如神迎香穴鍼三分禁灸

聽宮主治耳聾鳴睛明攢竹目昏矇迎風流淚眥
癢痛雀目攣睛白翳生
註聽宮穴主治耳內蟬鳴耳聾刺三分灸三壯
睛明攢竹二穴主治目痛視不明迎風淚努
肉攣睛白翳眥癢雀目諸證睛明穴鍼分半
留六呼禁灸○攢竹穴治證同前刺三分留
六呼禁灸

胸腹要穴圖



胸腹部主病鍼灸要穴歌
膻中穴主灸肺癰欬嗽哮喘及氣癭巨闕九種心
疼病痰飲吐水息賁寧
註膻中穴主治哮喘肺癰欬嗽氣癭等證灸七
壯禁鍼○巨闕穴主治九種心痛痰飲吐水
腹痛息賁等證鍼三分留七呼灸七壯
上脘奔豚與伏梁中脘主治脾胃傷兼治脾痛瘧
痰暈痞滿翻胃盡安康
註上脘穴主治腎積奔豚心積伏梁之證鍼八

分留七呼灸五壯千金云每日灸二七壯至
百壯孕婦不可灸○中脘穴主治內傷脾胃
心脾痛瘧疾痰暈痞滿翻胃等證鍼八分灸
七壯一云二七壯至百壯孕婦不可灸
水分脹滿臍突鞕水道不利灸之良神闕百病老
虛瀉産脹溲難兒脫肛
註水分穴主治鼓脹堅鞕肚臍突出小便不利
灸五壯禁鍼孕婦不可灸○神闕穴主治百
病及老人虛人泄瀉又治産後腹脹小便不

通小兒脫肛等證灸三壯禁鍼一法納炒乾淨鹽填滿臍上加厚薑一片蓋定上加艾炷灸百壯或以川椒代鹽亦妙

氣海主治臍下氣關元諸虛瀉濁遺中極下元虛寒病一切痼冷總皆宜

註 氣海穴主治一切氣疾陰證痼冷及風寒暑濕水腫心腹鼓脹諸虛癥瘕等證鍼八分灸五壯○關元穴主治諸虛腎積及虛老人泄瀉遺精白濁等證鍼八分留七呼灸七壯千

金云婦人鍼之則無子○中極穴主治下元寒冷虛損及婦人月事不調赤白帶下鍼八分留十呼灸三壯孕婦不可灸

膺腫乳癰灸乳根小兒龜胸灸亦同嘔吐吞酸灸日月大赫專治病遺精

註 乳根穴主治胸前腫乳癰小兒龜胸等證鍼三分灸三壯○日月穴主治嘔吐吞酸鍼七分灸五壯○大赫穴主治遺精鍼三分灸五壯

天樞主灸脾胃傷脾瀉痢疾甚相當兼灸鼓脹癥瘕病艾火多加病必康

註 天樞穴主治內傷脾胃赤白痢疾脾瀉及臍腹鼓脹癥瘕等證鍼五分留七呼灸五壯千金云魂魄之舍不可鍼孕婦不可灸

章門主治痞塊病但灸左邊可拔根若灸腎積臍下氣兩邊齊灸自然平

註 章門穴主治痞塊多灸左邊腎積灸兩邊鍼六分留六呼灸三壯一云百壯

期門主治奔豚病上氣欬逆胸背疼兼治傷寒脇鞕痛熱入血室刺有功

註 期門穴主治奔豚上氣欬逆胸滿胸背徹痛胸痛腹鞕及傷寒熱入血室鍼四分灸五壯

帶脈主灸一切疝偏墜木腎盡成功兼灸婦人濁帶下丹田溫煖自然停

註 帶脈穴主治疝氣偏墜木腎及婦人赤白帶下等證鍼六分灸五壯

背部要穴圖



背部主病鍼灸要穴歌

腰俞主治腰脊痛冷痺强急動作難腰下至足不
仁冷婦人經病溺赤痊

註　腰俞穴主治腰脊重痛難動不得俯仰艱難腰以下至足冷痺不仁及婦人經閉溺血等證刺二分留七呼灸五壯

至陽專灸黃疸病兼灸痞滿喘促聲命門老虛腰
痛證更治脫肛痔腸風

註　至陽穴主治身面俱黃胸脇支滿喘促不寧鍼五分灸三壯○命門穴主治老人腎虛腰疼及久痔脫肛腸風下血等證鍼五分灸三壯若年二十以上者不宜灸灸恐絕子

膏肓一穴灸勞傷百損諸虛無不良此穴禁鍼惟
宜艾千金百壯效非常

註　膏肓穴主治諸虛百損五勞七傷身形羸瘦夢遺失精上氣欬逆痰火發狂健忘怔忡胎前產後勞瘵傳尸等證灸七七壯至百壯

大杼主刺身發熱兼刺瘧疾欬嗽痰神道惟灸背

上痛怯怯短氣艾火添

註　大杼穴主治遍身發熱瘧疾欬嗽多痰鍼五分禁灸○神道穴主治背上冷痛怯怯短氣灸七壯禁鍼

風門主治易感風風寒痰嗽吐血紅兼治一切鼻
中病艾火多加嗅自通

註　風門穴主治腠理不密易感風寒欬嗽吐痰咯血鼻衄及一切鼻中諸病鍼三分灸五壯

肺俞內傷嗽吐紅兼灸肺痿與肺癰小兒龜背亦

堪灸肺氣舒通背自平

註 肺俞穴主治內傷外感欬嗽吐血肺痿肺癰小兒龜背鍼三分留七呼灸三壯

膈俞主治胸脇痛兼灸痰瘧痃癖攻更治一切失血證多加艾灼總收功

註 膈俞穴主治胸脇疼痛痰瘧痃癖一切血疾灸三壯禁鍼

肝俞主灸積聚痛兼灸氣短語聲輕更同命門一併灸能使瞽目復重明

註 肝俞穴主治左脇積聚疼痛氣短不語若同命門穴一併灸之即兩目昏暗者可使復明肝俞穴灸七壯禁鍼命門穴鍼五分灸三壯

膽俞主灸脇滿嘔驚悸臥睡不能安兼灸酒疸目黃色面發赤斑灸自痊

註 膽俞穴主治兩脇脹滿乾嘔驚悸睡臥不安及酒疸目睛發黃面發赤斑等證灸三壯禁鍼

脾俞主灸傷脾胃吐瀉瘧痢疸瘕癥喘急吐血諸般證更治嬰兒慢脾風

註 脾俞穴主治內傷脾胃吐瀉瘧痢黃疸食積癥瘕吐血喘急及小兒慢脾風證灸五壯禁鍼

三焦俞治脹滿疼積塊堅硬痛不寧更治赤白休息痢刺灸此穴自然輕

註 三焦俞穴主治脹滿積塊堅硬疼痛及赤白痢疾不止等證鍼二分灸五壯

胃俞主治黃疸病食畢頭目即暈眩瘧疾善饑不能食艾火多加自可痊

註 胃俞穴主治黃疸食畢頭眩瘧疾善饑不能食等證鍼三分灸三壯

腎俞主灸下元虛令人有子效多奇兼灸吐血聾腰痛女疸婦帶不能遺

註 腎俞穴主治下元諸虛精冷無子及耳聾吐血腰痛女勞疸婦人赤白帶下等證灸三壯禁鍼

大腸俞治腰脊疼大小便難此可通兼治泄瀉痢

疾病先補後瀉要分明

註 大腸俞穴主治腰脊疼痛大小便不通及泄瀉痢疾等證鍼三分灸三壯

膀胱俞治小便難少腹脹痛不能安更治腰脊強直痛艾火多添疾自痊

註 膀胱俞穴主治小便不通少腹脹痛及腰脊強直疼痛等證鍼三分灸七壯

譩譆主治久瘧病五藏瘧灸藏俞平意舍主治脇滿痛兼療嘔吐立時寧

註 譩譆俞穴主治久瘧若五藏瘧灸五藏俞五藏俞者心肝脾肺腎俞也俱鍼六分灸二七壯○意舍穴主治兩脇脹滿疼痛嘔吐鍼五分灸三壯

身柱主治羊癇風欬嗽痰喘腰背疼長強惟治諸般痔百勞穴灸汗津津

註 身柱穴主治風癇發狂欬嗽痰喘腰背疼痛等證鍼五分灸七七壯○長強穴主治諸般痔漏疼痛鍼三分灸三十壯○百勞穴主治

滿身發熱虛汗盜汗津津不止鍼五分留三呼瀉五吸灸以年為壯

仰手要穴圖

覆手要穴圖

手部主病鍼灸要穴歌

尺澤主刺肺諸疾絞腸痧痛鎖喉風傷寒熱病汗不解兼刺小兒急慢風

註　尺澤穴主治欬唾膿血喉痺肺積息賁及絞腸痧痛傷寒汗不出小兒急慢驚風等證刺三分或三稜鍼出血禁灸

列缺主治嗽寒痰偏正頭疼治自痊男子五淋陰中痛尿血精出灸便安

註　列缺穴主治欬嗽寒痰偏正頭疼及男子淋瀝陰中疼痛尿血精出等證鍼二分灸七壯炷如小麥

經渠主刺瘧寒熱胸背拘急脹滿堅喉痺欬逆氣數欠嘔吐心疼亦可痊

註　經渠穴主治瘧寒熱胸背拘急膨脹喉痺欬逆上氣數欠嘔吐心疼等證鍼二分禁灸

太淵主刺牙齒病腕肘無力或痛疼兼刺欬嗽風痰疾偏正頭疼效若神

註　太淵穴主治牙齒疼痛手腕無力疼痛及欬

嗽風痰偏正頭疼等證鍼二分灸三壯

魚際主灸牙齒痛在左灸左右同然更刺傷寒汗不出兼治瘧疾方欲寒

註　魚際穴主治牙齒痛瘧疾初起先覺發寒傷寒汗不出等證鍼二分惟牙痛可灸餘證禁灸

少衝主治心膽虛怔忡癲狂不可遺少商惟鍼雙鵝痺血出喉開功最奇

註　少衝穴主治心虛膽寒怔忡癲狂鍼一分灸

三壯○少商穴主治雙蛾風喉痺以三稜鍼刺微出血禁灸

少海主刺腋下瘰漏臂痺痛羊癇風靈道主治心疼痛瘈瘲暴瘖不出聲

註 少海穴主治腋下瘰癧漏臂與風吹肘臂疼痛也及癲癇羊鳴等證鍼五分禁灸○靈道穴主治心痛羊癇瘈瘲肘攣暴瘖不能言等證鍼三分灸三壯

通里主治溫熱病無汗懊憹心悸驚喉痺苦嘔暴瘖痖婦人經漏過多崩

註 通里穴主治溫病面熱無汗懊憹心悸驚恐喉痺苦嘔暴瘖聲痖及婦人經血過多崩漏等證鍼三分灸三壯

神門主治悸怔忡呆癡中惡恍惚驚兼治小兒驚癇證金鍼補瀉疾安寧

註 神門穴主治驚悸怔忡呆癡卒中鬼邪恍惚振驚及小兒驚癇等證鍼三分留七呼灸三壯炷如小麥

少府主治久瘧肘腋拘急痛引胸兼治婦人挺痛癢男子遺尿偏墜疼

註 少府穴主治痎瘧久不愈臂痠肘腋攣急胸中痛及婦人陰挺陰癢陰痛男子遺尿偏墜等證鍼二分灸三壯

曲澤主治心痛驚身熱煩渴肘掣疼兼治傷寒嘔吐逆鍼灸同施立刻寧

註 曲澤穴主治心痛善驚身熱煩渴臂肘搖動掣痛不能伸傷寒嘔吐氣逆等證鍼三分留七呼灸三壯

間使主治脾寒證九種心疼瘧渴生兼治瘰癧生項下左右鍼灸自然平

註 間使穴主治脾寒證九種心痛脾疼瘧疾口渴及瘰癧久不愈患左灸右患右灸左鍼六分留七呼灸五壯

內關主刺氣塊攻兼灸心胸脇痛疼勞熱瘧疾審補瀉金鍼抽動立時寧

註 內關穴主治氣塊上攻心胸脇肋疼痛勞熱

瘧疾等證鍼五分灸五壯

痰火胸疼刺勞宮小兒口瘡鍼自輕兼刺鵝掌風證候先補後瀉效分明

註 勞宮穴主治痰火胸痛小兒口瘡及鵝掌風等證鍼二分禁灸

商陽主刺卒中風暴仆昏沉痰塞壅少商中衝關衝少少澤三稜立回生

註 中衝穴乾坤生意云此爲十井穴凡初中風跌倒卒暴昏沉痰盛不省人事牙關緊閉藥

水不下急以三稜鍼刺中衝 少商 商陽 關衝 少衝 少澤使血氣流通實起死回生急救之妙訣也

三里三間並二間主治牙疼食物難兼治偏風眼目疾鍼灸三穴莫教偏

註 三里三間二間三穴主治牙齒疼痛食物艱難及偏風眼目諸疾三穴併鍼灸之○三里穴鍼二分灸三壯○二間穴鍼三分灸三壯○三間穴鍼三分灸三壯

合谷主治破傷風痺痛筋急鍼止疼兼治頭上諸般痛水腫産難小兒驚

註 合谷穴主治破傷風風痺筋骨疼痛諸般頭痛水腫産難及小兒急驚風等證鍼三分留六呼灸三壯

陽谿主治諸熱證癮疹痂疥亦當鍼頭痛牙痛咽喉痛狂妄驚中見鬼神

註 陽谿穴主治熱病煩心癮疹痂疥厥逆頭痛牙疼咽喉腫痛及狂妄驚恐見鬼等證鍼三

分留七呼灸三壯

曲池主治是中風手攣筋急痛痺風兼治一切瘧疾病先寒後熱自然平

註 曲池穴主治中風手攣筋急痺風瘧疾先寒後熱等證鍼五分灸七壯

肩井一穴治仆傷肘臂不舉淺刺良肩髃主治癱瘓疾手攣肩腫效非常

註 肩井穴主治仆傷肘臂疼痛不舉鍼五分灸五壯孕婦禁鍼○肩髃穴主治癱瘓手攣肩

腫鍼六分灸五壯

少澤主治衄不止兼治婦人乳腫疼大陵一穴何專主嘔血瘧疾有奇功

註 少澤穴主治鼻衄不止婦人乳腫鍼一分灸三壯○大陵穴主治嘔血瘧疾鍼六分灸三壯

前谷主治癲癇疾頸項肩臂痛難堪更能兼治産無乳小海喉齦腫痛痊

註 前谷穴主治癲癇頸項頰腫引耳疼痛及婦

人産後無乳等證鍼一分留三呼灸三壯○小海穴主治咽喉牙齦腫痛等證鍼二分灸五壯

腕骨主治臂腕疼五指諸疾治可平後谿能治諸瘧疾能令癲癇漸漸輕

註 腕骨穴主治臂腕五指疼痛鍼二分灸三壯○後谿穴主治瘧疾癲癇鍼一分灸一壯

陽谷主治頭面病手膊諸疾有多般兼治痔漏陰痿疾先鍼後灸自然痊

註 陽谷穴主治頭面項腫手膊疼痛不舉及痔漏陰痿等證鍼二分灸三壯

支正穴治七情鬱肘臂十指盡皆攣兼治消渴飲不止補瀉分明自可安

註 支正穴主治七情鬱結不舒肘臂十指筋攣疼痛及消渴飲水不止等證鍼三分灸三壯

液門主治喉齦腫手臂紅腫出血靈又治耳聾難得睡刺入三分補自寧

註 液門穴主治咽喉外腫牙齦痛手臂紅腫耳

暴聾不得眠等證鍼三分留二呼灸三壯

中渚主治肢木麻戰振蹺攣力不加肘臂連肩紅腫痛手背癰毒治不發

註 中渚穴主治四肢麻木戰振蹺攣無力肘臂連肩紅腫疼痛手背癰毒等證鍼二分灸三壯

陽池主治消渴病口乾煩悶瘧熱寒兼治折傷手腕痛持物不得舉臂難

註 陽池穴主治消渴口乾煩悶寒熱瘧或因折

傷手腕持物不得臂不能舉等證鍼二分禁
灸

外關主治藏府熱肘臂脇肋五指疼瘰癧結核連
胸頸吐衂不止血妄行

註　外關穴主治五藏六府結熱鼻衂吐血不止
及肘臂脇肋手指節痛瘰癧結核遶頸連胸
腫痛不消等證鍼三分留七呼灸三壯

支溝中惡卒心痛大便不通脇肋疼能寫三焦相
火盛兼治血脫暈迷生

註　支溝穴主治鬼擊卒心痛凡三焦相火熾盛
及大便不通脇肋疼痛婦人產後血暈不省
人事等證鍼二分留七呼灸七壯

天井主寫瘰癧疹角孫惟主目翳生耳門耳聾聤
耳病絲竹空穴治頭風

註　天井穴主治瘰癧癮疹鍼三分灸五壯○角
孫穴主治目中生翳鍼三分灸三壯○耳門
穴主治耳聾聤耳膿汁鍼三分留三呼禁灸
○絲竹空穴主治頭痛目赤目眩視物䀮䀮

鍼三分留三呼禁灸

陰足要穴圖

陽足要穴圖



足部主病鍼灸要穴歌

隱白主治心脾痛築賓能醫氣疝疼照海穴治夜發痓兼療消渴便不通

註 隱白穴主治心脾疼痛鍼一分灸三壯○築賓穴主治氣疝鍼三分灸五壯○照海穴主治夜發痓證及消渴大便閉鍼三分灸三壯

大都主治溫熱病傷寒厥逆嘔悶煩胎產百日內禁灸千金主灸大便難

註 大都穴主治溫熱病汗不出傷寒手足逆冷腹滿嘔吐悶亂及大便難等證鍼三分留七呼灸三壯凡婦人懷孕及生產後未滿百日俱不宜灸

太白主治痔漏疾一切腹痛大便難痞疸寒瘧商邱主兼治嘔吐瀉痢痊

註 太白穴主治痔漏腹中疼痛大便不通等證鍼三分留七呼灸三壯○商邱穴主治痞氣黃疸寒瘧及嘔吐瀉痢等證鍼三分留七呼灸三壯

公孫主治痰壅膈腸風下血積塊痾兼治婦人氣蠱病先補後瀉自然痊

註 公孫穴主治痰壅胸膈腸風下血積塊及婦人氣蠱等證鍼四分灸三壯

三陰交治痞滿堅痼冷疝氣腳氣纏兼治不孕及難產遺精帶下淋瀝痊

註 三陰交穴主治痞滿痼冷疝氣遺精及婦人腳氣月信不調久不成孕難產赤白帶下淋瀝等證鍼三分灸三壯

血海主治諸血疾兼治諸瘡病自輕陰陵泉治脇腹滿刺中下部盡皆鬆

註 血海穴主治女子崩中漏下月信不調帶下及男子腎藏風兩腿瘡癢濕痛等證鍼五分灸五壯○陰陵泉穴主治脇腹脹滿陰痛足膝紅腫小便不通小便失禁不覺下部等證鍼五分留七呼灸三壯

湧泉主刺足心熱兼刺奔豚疝氣疼血淋氣痛疼難忍金鍼瀉動自安寧

註 湧泉穴主治足發熱奔豚疝氣疼痛血淋氣痛等證鍼三分留三呼灸三壯

然谷主治喉痺風欬血足心熱遺精疝氣溫瘧多渴熱兼治初生兒臍風

註 然谷穴主治喉痺唾血遺精溫瘧疝氣足心熱及小兒撮口臍風鍼三分留三呼灸三壯凡鍼不宜見血

太谿主治消渴病兼治房勞不稱情婦人水蠱胸脇滿金鍼刺後自安寧

註 太谿穴主治消渴房勞不稱心意及婦人水蠱胸脇脹滿等證鍼三分留七呼灸三壯

陰谷舌縱口流涎腹脹煩滿小便難疝痛陰痿及痺病婦人漏下亦能痊

註 陰谷穴主治舌縱涎下腹脹煩滿溺難小腹疝急引陰陰股內廉痛為痿痺及女人漏下不止鍼四分留七呼灸三壯

復溜血淋宜乎灸氣滯腰疼貴在鍼傷寒無汗急瀉此六脈沉伏即可伸

註 復溜穴主治血淋氣滯腰痛傷寒無汗六脈沉匿者鍼三分留三呼灸五壯

大敦治疝陰囊腫兼治腦衄破傷風小兒急慢驚風病灶如小麥灸之靈

註 大敦穴主治諸疝陰囊腫腦衄破傷風及小兒急慢驚風等證鍼三分留十呼灸三壯

行間穴治兒驚風更刺婦人血蠱癥渾身腫脹單腹脹先補後瀉自然平

註 行間穴主治小兒急慢驚風及婦人血蠱癥

瘕渾身腫單腹脹等證鍼三分留十呼灸三
壯
太衝主治腫脹滿行動艱辛步履難兼治霍亂吐
瀉證手足轉筋灸可痊
註 太衝穴主治腫滿行步艱難及霍亂吐瀉手
足轉筋等證鍼三分留十呼灸三壯
中封主治遺精病陰縮五淋溲便難鼓脹瘿氣隨
年灸三里合灸步履艱
註 中封穴主治夢泄遺精陰縮五淋不得尿鼓

脹瘿氣此穴合足三里併灸治行步艱辛○
中封穴鍼四分留七呼灸三壯○足三里穴
鍼五分留七呼灸三壯
曲泉癀疝陰股痛足膝脛冷久失精兼治女子陰
挺癢少腹冷痛血瘕癥
註 曲泉穴主治癀疝陰股痛男子失精膝脛冷
痛及女子陰挺出少腹疼痛陰癢血瘕等證
鍼六分留七呼灸三壯
伏兎主刺腿膝冷兼刺脚氣痛痺風若逢穴處生
瘡癤說與醫人莫用功
註 伏兎穴主治腿膝寒冷脚氣痛痺鍼五分禁
灸凡此穴處生瘡癤者危
陰市主刺痿不仁腰膝寒如注水侵兼刺兩足拘
攣痺寒疝少腹痛難禁
註 陰市穴主治痿痺不仁不得屈伸腰膝寒如
注水兩足拘攣痺痛寒疝少腹疼痛等證鍼
三分留七呼禁灸
足三里治風濕中諸虛耳聾上牙疼噎膈鼓脹水

腫喘寒濕脚氣及痺風
註 足三里穴治中風中濕諸虛耳聾上牙疼水
腫心腹鼓脹噎膈哮喘寒濕脚氣上中下三
部痺痛等證鍼五分留七呼灸三壯此穴三
十外方可灸不爾反生疾
解谿主治風水氣面腹足腫喘嗽頻氣逆發噎頭
風眩悲泣癲狂悸與驚
註 解谿穴主治風氣面浮腹脹足腫喘滿欬嗽
氣逆發噎頭痛目眩悲泣癲狂驚悸怔忡等

證鍼五分留五呼灸三壯

陷谷主治水氣腫善噫痛疝腹腸鳴無汗振寒痎瘧胃脈得弦寫此平

註 陷谷主治面目浮腫及水病善噫疝氣少腹痛腸鳴腹痛痎瘧振寒無汗等證或胃脈得弦皆宜鍼五分留七呼灸三壯

內庭主治痞滿堅左右繆灸腹響寬兼刺婦人食蠱脹行經頭暈腹疼安

註 內庭穴主治痞滿堅鞕鍼三分留十呼灸三壯患右灸左患左灸右但覺腹響是其效驗兼治婦人食蠱行經頭暈少腹痛等證

厲兌主治尸厥證驚狂面腫喉痺風兼治足寒膝臏腫相偕隱白夢魘靈

註 厲兌穴主治尸厥口噤氣絕狀如中惡面腫喉痺驚狂好卧足寒膝臏腫痛等證鍼一分留一呼灸一壯此穴合隱白穴同鍼治夢魘不寧鍼一分灸三壯

飛陽主治步艱難金門能療病癲癇足腿紅腫崑崙主兼治齒痛亦能安

註 飛陽穴主治步履艱難鍼三分灸三壯○金門穴主治癲狂羊癇風鍼一分灸三壯○崑崙穴主治足腿紅腫牙齒疼痛鍼三分灸三壯

暴發痙證治若何金鍼申脈起沉疴上牙疼兮下足腫亦鍼此穴自平和

註 申脈穴主治暴發痙證足腫牙疼鍼三分留七呼灸三壯灸不及鍼

環跳主治中風濕股膝筋攣腰痛疼委中刺血醫前證開通經絡最相應

註 環跳穴主治腰胯股膝中受風寒濕氣筋攣疼痛鍼一寸留十呼灸三壯○委中穴治證同環跳穴但此穴禁灸鍼五分

陽陵泉治痺偏風兼治霍亂轉筋疼承山主鍼諸痔漏亦治寒冷轉筋靈

註 陽陵泉穴主治冷痺偏風霍亂轉筋鍼六分灸三壯○承山穴主治痔漏疼痛寒冷轉筋

鍼七分灸五壯灸不及鍼

陽輔主治膝痠痛腰間溶溶似水浸膚腫筋攣諸痿痺偏風不遂灸功深

註 陽輔穴主治膝胻痠疼腰間寒冷膚腫筋攣百節痠疼痿痺偏風不遂等證鍼三分留七呼灸三壯

風市主治腿中風兩膝無力脚氣衝兼治渾身麻搔癢艾火燒鍼皆就功

註 風市穴主治腿中風濕疼痛無力脚氣渾身

搔癢麻痺等證鍼五分灸五壯

懸鍾主治胃熱病腹脹肋痛脚氣疼兼治脚脛濕痺瘙足指疼痛鍼可停

註 懸鍾穴主治胃熱腹脹脇痛脚氣脚脛濕痺渾身搔癢趾疼等證鍼六分灸五壯

邱墟主治胸脇痛牽引腰腿髀樞中小腹外腎脚腕痛轉筋足脛不能行

註 邱墟穴主治胸脇滿痛不得息牽引腰腿髀樞中疼痛少腹外腎痛脚腕轉筋痛足脛難行等證鍼五分灸三壯

臨泣主治頸漏腋下馬刀瘡連及胸脇乳癰瘍婦人月經不利病下臨泣穴主治真

註 臨泣穴主治頸漏腋下馬刀連及胸脇婦人乳癰月信不調等證鍼二分灸三壯

俠谿主治胸脇滿傷寒熱病汗難出兼治目赤耳聾痛頷腫口噤疾堪除

註 俠谿穴主治胸脇支滿傷寒熱病汗不出目赤耳聾脅痛頷腫口噤等證鍼三分灸三壯

竅陰主治脇間痛欬不得息熱躁煩癰疽頭痛耳聾病喉痺舌強不能言

註 竅陰穴主治脇痛欬逆不得息發熱躁煩癰疽口乾頭痛喉痺舌強耳聾等證鍼一分灸三壯

御纂醫宗金鑑卷八十六

編輯刺灸心法要訣目録

灸難產穴圖
灸難產穴歌
鍼子戸穴圖
鍼子戸穴歌
灸遺精穴圖
灸遺精穴歌
灸癆蟲穴圖
灸癆蟲穴歌
灸痞根穴圖
灸痞根穴歌
灸肘尖穴圖
灸肘尖穴歌
灸鬼哭穴圖
灸鬼哭穴歌
灸中惡穴圖
灸中惡穴歌

灸疝氣穴圖
灸疝氣穴歌
灸翻胃穴圖
灸翻胃穴歌
灸腸風穴圖
灸腸風穴歌
灸暴絶穴圖
灸暴絶穴歌
灸鬼眼穴圖
灸鬼眼穴歌
灸贅疣穴圖
灸贅疣穴歌
灸瘰癧穴圖
灸瘰癧穴歌
灸腋氣圖
灸腋氣歌
灸瘋犬咬傷歌 無圖
灸蛇蠍蜈蚣蜘蛛咬傷歌 無圖

足三里穴圖
足三里穴歌
內庭穴圖
內庭穴歌
曲池穴圖
曲池穴歌
合谷穴圖
合谷穴歌
委中穴圖

委中穴歌
承山穴圖
承山穴歌
太衝穴圖
太衝穴歌
崑崙穴圖
崑崙穴歌
環跳穴圖
環跳穴歌
陽陵泉穴圖
陽陵泉穴歌
通里穴圖
通里穴歌
列缺穴圖
列缺穴歌
四季鍼灸坐向歌
灸法點穴用火歌
灸法蚤晚次序歌

灸法大小多少歌
灸法調養歌
灸瘡調治歌
灸瘡膏藥歌
行鍼避忌歌
四季人神所在禁忌鍼灸歌
逐日人神所在禁忌鍼灸歌
十二時人神所在禁忌鍼灸歌
禁鍼穴歌

禁灸穴歌
製鍼法歌
煮鍼藥方

御纂醫宗金鑑卷八十六

編輯刺灸心法要訣

灸難產穴圖

灸難產穴歌

橫逆難產灸奇穴婦人右腳小指尖炷如小麥灸
三壯下火立產效通仙

註婦人橫產子手先出諸符藥不效者灸此其穴在右腳小指爪甲外側尖上即至陰穴也灸三壯艾炷如小麥下火立產

鍼子戶穴圖

鍼子戶穴歌

子戶能刺衣不下更治子死在腹中穴在關元右二寸下鍼一寸立時生

註　胞衣不出子死腹中宜刺子戶穴鍼入一寸其穴在任脈經之關元穴傍右二寸

灸遺精穴圖



灸遺精穴歌

精宮十四椎之下各開三寸是其鄉左右二穴灸七壯夜夢遺精效非常

註　遺精灸精宮穴其穴在脊之十四椎下左右傍開各三寸灸七壯

灸癆蟲穴圖



灸癆蟲穴歌

鬼眼一穴灸癆蟲　墨點病人腰眼中　擇用癸亥亥時灸　勿令人知法最靈

註　勞瘵日久不愈，互相傳染，因內有勞蟲，宜灸鬼眼穴。穴在腰間兩旁，正身直立，有微陷處，用墨點記，合面而臥，以小艾炷灸七壯，或九壯、十一壯，多寡量人。蟲即吐瀉而出，急取燒燬遠棄，可免復傳。擇癸亥日夜半六神皆聚亥時灸之，勿使病人預知，恐尸神有覺也。

灸痞根穴圖

灸痞根穴歌

十二椎下痞根穴　各開三寸零五分　二穴左右灸七壯　難消痞塊可除根

註　痞塊灸痞根穴，其穴在十二椎下旁開三寸半。痞塊多在左，則灸左；在右，則灸右；如左右俱有，左右俱灸之。

灸肘尖穴圖



灸肘尖穴歌

肘尖端處是奇穴男女瘰癧堪灸也左患灸右右灸左並灸風池效更捷

註　肘尖奇穴灸瘰癧左患灸右右患灸左如初起時男先灸左女先灸右再灸風池穴尤效風池穴在耳後顳顬穴後髮際陷中

灸鬼哭穴圖

灸鬼哭穴歌

中惡振噤鬼魅病急灸鬼哭神可定兩手大指相並縛穴在四處之騎縫

註　鬼哭穴灸鬼魅狐惑恍惚振噤等證取穴將兩手大指相並縛定用艾炷於兩甲角反甲後肉四處騎縫著火灸之則患者哀告我自去爲效

灸中惡穴圖

灸中惡穴歌

尸疰客忤中惡病乳後三寸量準行男左女右艾
火灸邪祟驅除神自寧

註 灸尸疰客忤中惡等證其穴在乳後三寸男
左女右灸之

灸疝氣穴圖



灸疝氣穴歌

疝氣偏墜灸為先量口兩角折三尖一尖向上對
臍中兩尖下垂是穴邊

註 灸疝氣偏墜奇穴法用稈心一條量患人口
兩角為則折為三段如△字樣以一角安臍
中心兩角安臍下兩旁尖盡處是穴左患灸
右右患灸左左右俱患左右俱灸艾炷如粟
米大灸四壯

灸翻胃穴圖

灸翻胃穴歌

翻胃上下灸奇穴　上在乳下一寸也　下在內踝之下取　三指稍斜向前者

註　灸翻胃奇穴上穴在兩乳下一寸下穴在內踝下用手三指稍斜向前排之即是穴也

灸腸風穴圖

灸腸風穴歌

腸風諸痔灸最良　十四椎下奇穴鄉　各開一寸宜多灸　年深久痔效非常

註　灸腸風諸痔奇穴其穴在脊之十四椎下傍各開一寸年深者灸之最效

灸暴絕穴圖

灸暴絕穴歌

鬼魘暴絕最傷人急灸鬼眼可回春穴在兩足大指內去甲韭葉鬼難存

註凡一切鬼魘暴絕當灸奇穴在足兩大指內去爪甲如韭葉許名鬼眼穴灸之則鬼邪自去而病可愈也

灸鬼眼穴圖

灸鬼眼穴歌

腫滿上下灸奇穴上即鬼哭不用縛下取兩足第二指指尖向後寸半符

註灸腫滿奇穴上穴即兩手大指縫鬼哭穴也下穴在兩足第二指指尖向後一寸五分即是也

灸贅疣穴圖

灸贅疣穴歌

贅疣諸痣灸奇穴更灸紫白二癜風手之左右中指節屈節尖上宛宛中

註 灸癜風及贅疣諸痣奇穴其穴在左右手中指節宛宛中俗名拳尖是也

灸瘰癧穴圖

灸瘰癧穴歌

瘰癧隔蒜灸法宜先從後發核灸起灸至初發母核止多着艾火效無匹

註 瘰癧隔蒜灸法用獨蒜片先從後發核上灸起至初發母核而止多灸自效

灸腋氣圖

灸腋氣歌

腋氣除根剃腋毛再將定粉水調搽患處七日後現有黑孔用艾燒

註　凡腋氣先用快刀剃去腋毛淨乃用好定粉水調搽患處六七日後看腋下有一點黑者必有孔如鍼大或如簪尖即氣竅也用艾炷如米大者灸之三四壯愈永不再發

灸瘋犬咬傷歌

瘋犬咬傷先須吮吮盡惡血不生風次於咬處灸百壯常食炙韭不須驚

註　瘋犬咬傷之處急急用大嘴砂酒壺一個內盛乾燒酒燙極熱去酒以酒壺嘴向咬處如拔火罐樣吸盡惡血爲度擊破內落上用艾炷灸之永不再發炙韭炒韭菜也

灸蛇蠍蜈蚣蜘蛛咬傷歌

蛇蠍蜈蚣蜘蛛傷即時疼痛最難當急以傷處隔蒜灸五六十壯效非常

註　凡蛇蠍蜈蚣蜘蛛咬傷痛急勢危者急用艾火於傷處灸之拔散毒氣即安或用獨蒜片隔蒜灸之二三壯換一片毒甚者灸五六十壯

足三里穴圖

足三里穴歌

三里膝眼下三寸兩筋間能除胸脇痛腹脹胃中寒腸鳴并泄瀉眼腫膝脛痠傷寒羸瘦損氣蠱證諸般年過三旬後鍼灸眼光全

註　三里足三里穴也其穴在膝眼下三寸䯒骨外廉大筋內宛宛中鍼五分留七呼灸三壯主治胸脇疼痛腹脹胃寒腸中雷鳴脾寒泄瀉眼目紅腫膝脛痠痛傷寒熱不已瘦弱虛損小腸氣痛與水氣蠱毒鬼擊諸證悉宜鍼灸但小兒忌灸恐眼目不明惟三十以外方可灸之令眼目光明也

內庭穴圖

內庭穴歌

內庭次指外本屬足陽明能治四肢厥喜靜惡聞聲癮疹咽喉痛數欠及牙疼瘧疾不思食耳鳴鍼便清

註內庭穴在足之大指次指外間陷中屬足陽明胃經穴也主治四肢厥逆喜靜惡聞人聲癮疹不快咽喉煩痛數欠牙齦疼瘧疾不思飲食耳內蟬鳴等證鍼三分留十呼灸三壯

曲池穴圖



曲池穴歌

曲池拱手取屈肘骨邊求善治肘中痛偏風手不收挽弓開不得臂痪怯梳頭喉痺促欲死發熱更無休遍身風癬癩鍼著即時瘳

註曲池穴其穴在肘輔骨屈肘屈骨之中以手拱胸取之主治肘中疼痛偏風半身不遂臂痛拉弓不開兩臂痠痛不能舉手向髮喉痺喘促欲死傷寒振寒餘熱不盡皮膚乾燥痂疥等證刺七分留七呼灸三壯

合谷穴圖

合谷穴歌

合谷在虎口兩指歧骨間頭疼并面腫瘧病熱還寒體熱身汗出目暗視茫然齒齲鼻衄血口噤不能言鍼入深三分能令人有孕

注合谷穴其穴在手大指次指歧骨間陷中主治偏正頭疼面目浮腫瘧疾寒熱身體發熱汗不收目翳視物不明齒齲衍痛鼻中流血不止口噤不開等證鍼三分留六呼灸三壯

委中穴圖

委中穴歌

委中曲脷裏橫紋脈中央腰痛不能舉沉沉引脊梁風痛及轉筋疼痛難移傍風痺痛無比熱病久在床足膝難伸屈鍼入即安康

注委中穴其穴在膕中央約紋動脈陷中主治腰俠脊沉沉痛瘈瘲癲疾及兩腿肚轉筋疼痛難動風痺疼痛流注不定熱病難愈兩足膝難伸屈等證鍼五分留七呼禁灸

承山穴圖

承山穴歌

承山名魚腹腨腸分肉間善治腰疼痛痔疾大便難腳氣并膝腫兩足盡寒痠展轉成時疫戰慄瘧熱寒霍亂及轉筋刺之立便安

註 承山穴其穴在腿肚下尖分肉間主治腰背疼痛痔腫大便難腳氣膝腫脛痠跟痛傷寒時疫寒熱瘧疾戰慄不能行立霍亂轉筋等證鍼五分灸五壯

太衝穴圖

太衝穴歌

太衝足大指節後二寸中動脈知生死能醫驚癇風咽喉并心脹兩足不能動七疝偏墜腫眼目似雲朦亦能療腰痛鍼下有神功

註 太衝穴其穴在足大指本節後二寸陷中動脈應手病者有此脈生無此脈者死主治急慢驚風羊癇風證及咽喉疼痛心脹腹滿寒濕腳氣痛行步難小腹疝氣偏墜疼痛兩目昏暗腰背疼痛等證鍼三分留十呼灸三壯

崑崙穴圖

崑崙穴歌

崑崙足外踝跟骨上邊尋轉筋腰尻痛膊重更連陰頭疼脊背急暴喘滿衝心舉步行不得動足即呻吟若欲求安樂須將此穴鍼

註崑崙穴在足外踝後五分跟骨上陷中主治腰尻疼痛膊重不能舉及前陰腫痛偏正頭痛脊背拘急暴咳喘促足腨腫不得履地等證鍼三分留七呼灸三壯

環跳穴圖



環跳穴歌

環跳在髀樞側臥屈足取能鍼偏廢軀折腰返顧難冷風并濕痺身體似繩牽腿胯連腨痛屈轉重呼歎若人能鍼灸頃刻病消除

註環跳穴其穴在髀樞中側臥伸下足屈上足取之主治半身不遂閃挫腰痛不能回顧冷風濕痺周身拘急腿胯腿肚疼痛不能動轉等證鍼一寸留十呼灸三壯

陽陵泉穴圖

陽陵泉穴歌

陽陵居膝下外廉一寸中膝腫并麻木冷痺及偏風起坐腰背重面腫滿胸中脹是不能起坐臥似衰翁鍼入六分止神功妙不同

註陽陵泉穴其穴在膝下一寸外廉陷中尖骨前筋骨間主治兩膝腫痛及冷痺不仁半身不遂腰背重痛起坐艱難面目浮腫胸中脹滿兩足疼痛艱於起坐不能支持等證鍼六分留十呼灸七壯

通里穴圖

通里穴歌

通里腕側後去腕一寸中欲言聲不出懊憹及怔忡實則四肢重頭腮面頰紅聲平仍數欠喉痺氣難通虛則不能食暴瘖面無容毫鍼微微刺方信有神功

註通里穴其穴在腕側後一寸陷中主治懊憹怔忡心煩極甚怔忡不寧四肢重痛頭腮面頰紅腫低言數欠喉中疼痛氣息不通虛則不思食暴瘖面無潤澤鍼三分灸三壯

列缺穴圖

列缺穴歌

列缺腕側上次指手交叉善療偏頭患遍身風痺麻痰涎頻上壅口噤不開牙若能明補瀉應手即能療

註 列缺穴其穴在腕後側上一寸五分兩手交叉當食指末筋骨罅中主治偏風頭痛遍身風痺麻木痰壅氣堵口噤不開等證鍼二分留三呼灸三壯

四季鍼灸坐向歌

四季鍼灸坐向理宜從四季順自然東南西北四維向以迎生氣本乎天

註 鍼灸坐向避忌之理醫學入門春坐東向西夏坐南向北秋坐西向東冬坐北向南皆背四季生氣之向不可犯然宜從春向東夏向南秋向西冬向北四土旺月向四維以迎生氣本乎天理順其自然為是也

灸法點穴用火歌

點穴坐臥立直正炷用蘄艾火珠良灸病古忌八木火今時通行一炷香

註 凡灸法坐點穴則坐灸臥點穴則臥灸立點穴則立灸須四體平直毋令傾側若傾側穴即不正其炷所用之艾必用蘄艾艾令乾燥入臼搗去淨塵屑作炷宜實置穴上用葱涎粘固上古用火珠映日取火無之忌松柏枳橘榆棗桑竹八木之火今時惟用香火灼艾亦通行簡便之法也

灸法蚤晚次序歌

灸法溫煖宜於午上下陽陰先後分脈數新愈不宜灸欲灸三里過三旬

註 凡灸自病原為溫煖經絡宜在午時陽盛之時火氣易行必分上下先後上下經皆灸者先灸上後灸下陰陽經皆灸者先灸陽後灸陰若脈數有熱新愈氣虛俱不宜灸恐傷氣血但人有病欲灸足三里者須年三十以上方許灸之恐年少火盛傷目故凡灸頭必灸足三里者以足三里能下火氣也

灸法大小多少歌

頭骨手足皮薄瘦巨闕鳩尾小少宜背腹臍下皮肉厚大多方能起痾疾

註 凡灸諸病必火足氣到始能求愈然頭與四肢皮肉淺薄若併灸之恐肌骨氣血難堪必分日灸之或隔日灸之其炷宜小壯數宜少有病必當灸巨闕鳩尾二穴者必不可過三壯艾炷如小麥恐火氣傷心也背腹下皮肉深厚艾炷宜大壯數宜多使火氣到始能去痼冷之疾也

灸法調養歌

灸後風寒須謹避七情過極慎起居生冷醇酒諸厚味惟茹蔬淡適其宜

註 凡灸後須謹避風寒慎其起居養其氣血其喜怒憂思悲恐驚不可過極和其情志及禁食一切生冷醇酒厚味等物即食蔬淡亦當適宜不可過度以調養脾胃也

灸瘡調治歌

灸瘡不發氣血竭七日發膿病必除發後膏貼防外襲薄連葱荽淨瘡污

註 凡灸諸病灸瘡不發者是其氣血大虧不必復灸即灸亦多不能愈過七天之後艾疤發時膿水稠多其病易愈以其氣血充暢經絡流通也發後貼膏藥者防其六淫外襲也如灸瘡黑痛膿汁污穢乃艾火毒盛必用薄荷黃連葱皮芫荽煎湯洗之自愈也

灸瘡膏藥歌

芩連白芷金星草乳香淡竹當歸好薄荷川芎與葱白香油煎藥粉成膏

以上藥味各等分用香油煎藥去楂再下鉛粉熬成膏專貼灸瘡

行鍼避忌歌

行鍼避忌雨大風饑飽醉怒渴勞驚男內女外猶堅守更看人神不可逢行鍼避忌雖如此還推病之緩急行緩病欲鍼擇吉日急病行鍼莫稍停

註 按行鍼避忌於未刺之先如風雨晦冥人之

氣血即凝滯而不調大饑者氣虛新飽者氣
盛大醉者氣亂大怒者氣逆大渴者液少大
勞者氣乏大驚者氣散凡此者鍼亂氣散行
鍼須當避忌俟其必清必靜聚精會神方保
無誤也既刺之後尤當戒慎男子忌內女子
忌外忌外者堅拒勿出忌內者謹守勿內則
邪氣必去正氣必復是謂得氣理固然矣猶
有逆變之法存焉緩病須擇神吉急病豈可
待時哉

四季人神所在禁忌鍼灸歌

四季人神所在處禁忌鍼灸莫妄施春在左脇秋
在右冬在於腰夏在臍

註 四季人神所在之處謂人之神氣初動之處
同乎天之流行也禁鍼灸者恐傷生氣也人
神常在心春在左脇者肝主升也秋在右脇
者肺主降也冬在腰者神主藏也夏在臍者
脾主化也

逐日人神所在禁忌鍼灸歌

一日足大二外踝三日股內四在腰五口六手七
內踝八腕九尻十背腰十一鼻柱二髮際三牙四
胃五徧身六胸七氣八股內九足二十內踝尋廿
一手小二外踝三日肝足四手明五足六胸七在
膝八陰九脛晦趺停

註 足大足之大指也氣氣衝也手小手之小指
也手明手陽明也足足陽明也陰男女前陰
中也晦月盡也趺足十指岐骨也

十二時人神所在禁忌鍼灸歌

子踝丑頭寅耳邊卯面辰項巳乳肩午脇未腹申
心主酉膝戌腰亥股端

註 子踝左右內踝外踝也寅耳邊左右兩耳也
辰項頸項也巳乳肩兩乳兩肩也午脇左右
脇也未腹大腹少腹也申心主胸膈也酉膝
左右兩膝也戌腰腰背也亥股兩股內外也

禁鍼穴歌

禁鍼穴道要先明腦戶顖會及神庭絡郄玉枕角
孫穴顱息承泣隨承靈神道靈臺膻中忌水分神

關并會陰橫骨氣衝手五里箕門承筋及青靈乳中上臂三陽絡二十三穴不可鍼孕婦不宜鍼合谷三陰交內亦通論石門鍼灸應須忌女子終身無妊娠外有雲門并鳩尾缺盆客主人莫深肩井深時人悶倒三里急補人還平刺中五藏膽皆死衝陽血出投幽冥海泉顴髎乳頭上脊間中髓傴僂形手魚腹陷陰股內膝臏筋會及腎經腋股之下各三寸目眶關節皆通評

禁灸穴歌

禁灸之穴四十七承光瘂門風府逆睛明攢竹下迎香天柱素髎上臨泣腦戶耳門瘈脈通禾髎顴髎絲竹空頭維下關人迎等肩貞天牖心俞同乳中脊中白環俞鳩尾淵液如周榮腹哀少商并魚際經渠天府及中衝陽池陽關地五會漏谷陰陵條口逢殷門申脈承扶忌伏兔髀關連委中陰市下行尋犢鼻諸穴休將艾火攻

製鍼法歌

製鍼須用馬嚼鐵惟有金鍼更可嘉煆煉塗酥插臘肉煮鍼之藥有多法

註製鍼用馬嚼環鐵者以馬屬午午爲火火尅金取尅制之義也若以真金製鍼用之更佳其煆煉之法將鐵絲於火中煆紅截爲二寸或三寸或五寸長短不拘次以蟾酥塗鍼上入火中微煆取起復照前塗酥煆三次乘熱插入臘肉皮之裏肉之外將後藥用水三碗煎沸次入鍼肉在內煮至水乾傾於水中待冷將鍼取出於黃土中插百餘下以去火毒

其鍼要光圓不可用尖鋒次以銅絲纏其柄

煮鍼藥方

麝香五分　膽礬一錢
石斛一錢　穿山甲三錢
朱砂一錢　沒藥三錢
鬱金三錢　川芎一錢
細辛三錢　甘草節五錢
沉香五錢　磁石一兩

已上諸藥氣味能引入鍼內

御纂醫宗金鑑卷八十七

編輯正骨心法要旨目錄

外治法

手法總論

手法釋義

器具總論

裹簾無圖

振梃無圖

用法釋義

披肩無圖

用法釋義

攀索疊甎用法圖

用法釋義

通木圖

通木用法圖一

通木用法圖二

用法釋義

腰柱圖

腰柱用法圖

用法釋義

竹簾杉籬圖

竹簾杉籬用法圖

用法釋義

抱膝圖

抱膝用法圖

用法釋義

撲損傷應刺諸穴經義

應刺諸穴圖

惡血已留復因怒傷肝經義

擊撲傷後入房傷脾經義

擊撲損傷脈色經義

人身正面全圖

人身背面全圖

骨度正面全圖

骨度背面全圖

骨度側面全圖

骨度正面尺寸圖
骨度背面尺寸圖
骨度尺寸經義
補遺
十不治證

御纂醫宗金鑑卷八十七

編輯正骨心法要旨

外治法

手法總論

夫手法者謂以兩手安置所傷之筋骨使仍復於舊也但傷有重輕而手法各有所宜其痊可之遲速及遺留殘疾與否皆關乎手法之所施得宜或失其宜或未盡其法也蓋一身之骨體既非一致而十二經筋之羅列序屬又各不同故必素知其體相識其部位一旦臨證機觸於外巧生於內手隨心轉法從手出或拽之離而復合或推之就而復位或正其斜或完其闕則骨之截斷碎斷斜斷筋之弛縱卷攣翻轉離合雖在肉裏以手捫之自悉其情法之所施使患者不知其苦方稱爲手法也况所傷之處多有關於性命者如七竅上通腦髓鬲近心君四末受傷痛苦入心者即或其人元氣素壯敗血易於流散可以剋期而愈手法亦不可亂施若元

氣素弱一旦被傷勢已難支設手法再誤則萬難挽回已此所以尤當審慎者也蓋正骨者須心明手巧既知其病情復善用夫手法然後治自多效誠以手本血肉之體其宛轉運用之妙可以一已之卷舒高下疾徐輕重開合能達病者之血氣凝滯皮肉腫痛筋骨攣折與情志之苦欲也較之以器具從事於拘制者相去甚遠矣是則手法者誠正骨之首務哉

手法釋義

摸法

摸者用手細細摸其所傷之處或骨斷骨碎骨歪骨整骨軟骨硬筋強筋柔筋歪筋正筋斷筋走筋粗筋翻筋寒筋熱以及表裏虛實並所患之新舊也先摸其或為跌撲或為錯閃或為打撞然後依法治之

接法

接者謂使已斷之骨合攏一處復歸於舊也凡骨

之跌傷錯落或斷而兩分或折而陷下或碎而散亂或岐而傍突相其形勢徐徐接之使斷者復續陷者復起碎者復完突者復平或用手法或用器具或手法器具分先後而兼用之是在醫者之通達也

端法

端者或兩手一手擒定應端之處酌其重輕或從下往上端或從外向內托或直端斜端也蓋骨離其位必以手法端之則不待曠日遲久而骨縫即

合仍須不偏不倚庶愈後無長短不齊之患

提法

提者謂陷下之骨提出如舊也其法非一有用兩手提者有用繩帛繫高處提者有提後用器具輔之不致仍陷者必量所傷之輕重淺深然後施治倘重者輕提則病莫能愈輕者重提則舊患雖去而又增新患矣

按摩法

按者謂以手往下抑之也摩者謂徐徐揉摩之也

此法蓋為皮膚筋肉受傷但腫硬麻木而骨未斷折者設也或因跌撲閃失以致骨縫開錯氣血鬱滯為腫為痛宜用按摩法按其經絡以通鬱閉之氣摩其壅聚以散瘀結之腫其患可愈

推拿法

推者謂以手推之使還舊處也拿者或兩手一手捏定患處酌其宜輕宜重緩緩焉以復其位也若腫痛已除傷痕已愈其中或有筋急而轉摇不甚便利或有筋縱而運動不甚自如又或有骨節間微有錯落不合縫者是傷雖平而氣血之流行未暢不宜接整端提等法惟宜推拿以通經絡氣血也蓋人身之經穴有大經細絡之分一推一拿視其虛實酌而用之則有宜通補瀉之法所以患者無不愈也

已上諸條乃八法之大略如此至於臨證之權衡一時之巧妙神而明之存乎其人矣

器具總論

跌撲損傷雖用手法調治恐未盡得其宜以致有治如未治之苦則未可云醫理之周詳也爰因身體上下正側之象製器以正之用輔手法之所不逮以冀分者復合欹者復正高者就其平陷者升其位則危證可轉於安重傷可就於輕再施以藥餌之功更示以調養之善則正骨之道全矣

裹簾 器一 無圖

裹簾以白布為之因患處不宜他器只宜布纏始為得法故名裹簾其長短闊狹量病勢用之

振梃 器二 無圖

振梃卽木棒也長尺半圓如錢大或麪杖亦可蓋受傷之處氣血凝結疼痛腫硬用此梃微微振擊其上下四旁使氣血流通得以四散則疼痛漸減腫硬漸消也

用法釋義

凡頭被傷而骨未碎筋未斷雖瘀聚腫痛者皆為可治先以手法端提頸項筋骨再用布纏頭二三層令緊再以振梃輕輕拍擊足心令五臟之氣上下宣通瘀血開散則不奔心亦不嘔吮而心神安矣若已纏頭拍擊足心竟不覺疼昏不知人痰响如拽鋸身體僵硬口溢涎沫乃氣血垂絕也不治

披肩 器三 無圖

披肩者用熟牛皮一塊長五寸寬三寸兩頭各開二孔夾於傷處以棉繩穿之緊緊縛定較之木板

稍覺柔活

用法釋義

凡兩肩撲墜閃傷其骨或斷碎或旁突或斜努或骨縫開錯筋翻法當令病人仰臥凳上安合骨縫揉按筋結先以棉花貼身墊好復以披肩夾住肩之前後縛緊再用白布在外纏裹畢更用扶手板長二尺餘寬三四寸兩頭穿繩懸空掛起令病人俯伏於上不使其肩骨下垂過七日後開視之如俱痊可撤板不用如尚未愈則仍用之若不依此治法後必遺殘患蘆節

攀索疊甎用法圖



攀索　器四

攀索者以繩掛於高處用兩手攀之也

疊甎　器五

疊甎者以甎六塊分左右各疊置三塊兩足踏於其上也

用法釋義

凡胸腹腋脇跌打磞撞墊努以致胸陷而不直者先令病人以兩手攀繩足踏甎上將後腰拿住各抽去甎一箇令病人直身挺胸少頃又各去甎一

箇仍令直身挺胸如此者三其足著地使氣舒瘀散則陷者能起曲者可直也再將其胸以竹簾圍褁用寬帶八條緊緊縛之勿令窒碍但宜仰睡不可俯臥側眠腰下以枕墊之勿令左右移動

通木圖



通木背面用法圖



通木正面用法圖

通木　器六

用杉木寬三寸厚二寸其長自腰起上過肩一寸許外面平整向脊背之內面刻凹形務與脊骨膂肉吻合約以五分分去聲度之第一分自左側面斜鑽二孔右側面斜鑽二孔越第二分至第三分四分五分俱自左右側面各斜鑽一孔用寬帶一條自第一分上左孔穿入上越右肩下胸前斜向左腋下繞背後穿於第一分右次孔內再用一帶自第一分上右孔穿入上越左肩下胸前斜向右腋下繞背後穿入第一分左次孔內兩帶頭俱折轉緊紮木上第三分四分亦以帶穿之自軟肋橫繞腹前復向後穿入原孔內緊紮木上第五分以帶穿入孔內平繞前腹復向後緊紮木上切勿游移活動始於患處有益凡用此木先以綿絮軟帛貼身墊之免致疼痛

用法釋義

凡脊背跌打損傷膂骨開裂高起者其人必傴僂難仰法當令病者俯臥再著一人以兩足踏其兩肩醫者相彼開裂高起之處宜輕宜重或端或拿或按或揉令其縫合然後用木依前法逼之

腰柱圖



腰柱用法圖

腰柱　器七

腰柱者以杉木四根製如扁擔形寬一寸厚五分長短以患處為度俱自側面鑽孔以繩聯貫之

用法釋義

凡腰間閃挫岔氣者以常法治之若腰節骨被傷錯筍脊肉破裂筋斜傴僂者用醋調定痛散敷於腰柱上視患處將柱排列於脊骨兩旁務令端正再用蘄艾做薄褥覆於柱上以禦風寒用寬長布帶繞向腹前緊緊紮裹內服藥餌調治自愈

竹簾圖



杉籬圖



竹簾杉籬用法圖

竹簾 器八

竹簾者即夏月凉簾也量患處之大小長短裁取之

用法釋義

凡肢體有斷處先用手法安置訖然後用布纏之復以竹簾圍於布外緊紮之使骨縫無參差走作之患乃通用之物也

杉籬 器九

杉籬者複逼之器也量患處之長短濶狹曲直凸

凹之形以杉木為之酌其根數記清次序不得紊亂然後於每根兩頭各鑽一孔以繩聯貫之有似於籬故名焉但排列稀疎不似竹簾之密耳

用法釋義

凡用以圍裹於竹簾之外將所穿之繩結住再於籬上加繩以纏之取其堅勁挺直使骨縫無離綻脫走之患也蓋骨節轉動之處與骨節甚長之所易於搖動若僅用竹簾恐挺勁之力不足故必加此以環抱之則骨縫吻合堅牢矣

抱膝圖



抱膝用法圖



抱膝 器十

抱膝者有四足之竹圈也以竹片作圈較膝蓋稍大些須再用竹片四根以蘇線緊縛圈上作四足之形將白布條通纏於竹圈及四足之上用於膝蓋雖拘制而不致痛苦矣

用法釋義

膝蓋骨覆於楗骺二骨之端本活動物也若有所傷非骨體破碎即離位而突出於左右雖用手法推入原位但步履行止必牽動於彼故用抱膝之器以固之庶免復離原位而遺跛足之患也其法將抱膝四足插於膝蓋兩旁以竹圈箍住膝蓋令其穩妥不得移動再用白布寬帶緊緊縛之

經義

擊仆損傷應刺諸穴

素問繆刺論曰人有所墮墜惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脈下傷少陰之絡刺足內踝之下然谷之前血脈出血刺足跗上動脈不已刺三毛各一痏見血立已左刺右右刺左

註 此言惡血爲病有繆刺之法也人因墮墜致惡血留內腹中滿脹前後不通當先用利藥

如上傷厥陰肝經之脈下傷少陰腎經之絡當刺內踝之下然谷之前有血脈令出血者蓋以此屬少陰之別絡而交通乎厥陰也兼刺足跗上動脈即衝陽穴乃胃經之原也如病不已更刺三毛上大敦穴左右各一痏見血立已繆刺者左刺右右刺左大敦也但足跗動脈上關衝脈少陰陽明三經只宜淺刺不可出血不已也

靈樞經寒熱病篇曰身有所傷血出多及中風寒若有所墮墜四支懈惰不收名曰體惰取其小腹臍下三結交三結交者陽明太陰也臍下三寸關元也

註 此言身有所傷血出多者及中風寒者破傷風之屬也或因墮墜不必血出而四支懈惰不收者皆名體惰也關元任脈穴名又足陽明太陰之脈皆結於此故爲三結交也

靈樞經厥病論曰頭痛不可取於腧者有所擊墮惡血在內傷痛未已可側刺不可遠取之也

註 經言惡血在內頭痛不可取其腧者蓋頭痛取腧以泄其氣則頭痛可愈也若有所擊墮惡血在內而取腧以泄其氣則是血病治氣矣故勿取其腧焉若所擊仆之胭肉傷痛不已縱用刺法亦只於所傷附近之側刺之以出在內之惡血而已若仍按經遠取諸腧以療頭痛則不可也

應刺穴圖



應刺穴圖

惡血已留復因怒傷肝

靈樞經邪氣藏府病形篇曰有所墮墜惡血在內有所大怒氣上而不下積於脇下則傷肝

註人因墮墜血已留內若復因大怒傷肝其氣上而不下則留內之血兩相凝滯積於脇下而肝傷矣法當先導怒氣勿積於肝則肝可以無傷然後飲以利藥以破惡血則脇下無留血矣

擊扑傷後入房傷脾

靈樞經邪氣藏府病形篇曰有所擊扑若醉入房汗出當風則傷脾

註 有所擊扑乃傷其外體也如醉後入房或汗出不知避忌當風則邪客於肌膚傷其內體矣是皆傷脾之因也

擊仆損傷脈色

素問脈要精微論曰肝脈搏堅而長色不青當病墜若因血在脇下令人喘逆

註 此言肝脈有剛柔而病亦以異也肝脈搏擊於手而且堅且長其色又不青當病或墜或搏因血積於脇下令人喘逆不止也正以厥陰之脈布脇肋循喉嚨之後其支別者復從肝貫膈上注肺今血在脇下則血之積氣上薰於肺故令人喘逆也

金匱要略曰寸口脈浮微而濇然當亡血若汗出設不汗出者其身有瘡被刀斧所傷亡血故也

註 經言奪血者無汗奪汗者無血蓋二者皆當脈浮微而濇今診之如此是有枯竭之象而無汗出之證非亡血而何故知有金傷或擊扑而亡血之證也

又論曰肝脈搏堅而色不變必有擊墮之事因胭肉無破則惡血必留脇下兼致嘔逆依經鍼刺然谷足跗或三毛等穴出血或飲利

藥使惡血開行當自愈也若脉浮微而濇當
知亡血過多依經於三結交關元穴灸之或
飲大補氣血之劑而調之則病已矣

人身正面全圖



人身背面全圖



骨度正面全圖



骨度背面全圖



骨度側面全圖

骨度正面尺寸圖



骨度背面尺寸圖



靈樞經骨度尺寸

頭部

項髮以下至背骨長二寸半自後髮際以至大椎項骨三節處也

按頭部折法以前髮際至後髮際折爲一尺二寸如髮際不明則取眉心直上後至大杼骨折作一尺八寸此爲直寸橫寸法以眼內角至外角此爲一寸頭部橫直寸法並依此

胸腹部

結喉以下至缺盆中長四寸此以巨骨上陷中而言即天突穴處

缺盆以下𩩲骭之中長九寸

胸圍四尺五寸

兩乳之間廣九寸半當折八寸爲當

𩩲骭中下至天樞長八寸天樞足陽明穴名在臍旁此指平臍而言

天樞以下至橫骨長六寸半橫骨橫長六寸半毛際下骨曰橫骨

按此古數以今用上下穴法參較多有未合宜從後胸腹折法爲當

兩髀之間廣六寸半此當兩股之中橫骨兩頭之處俗名髀縫

按胸腹折法直寸以中行爲之自缺盆中天突穴起至岐骨際上中庭穴止折作八寸四分自𩩲骭上岐骨際下至臍心折作八寸臍心下至毛際曲骨穴折作五寸橫寸以兩乳相去折作八寸胸腹橫直寸法并依此

背部

膂骨以下至尾骶二十一節長三尺膂骨脊骨也脊骨內巨人之所以能負任者以是骨之巨也脊骨二十四節今云二十一節者除項骨三節不在內

腰圍四尺二寸

按背部折法自大椎至尾骶通折三尺上七節各長一寸四分一釐共九寸八分七釐中七節各一寸六分一釐共一尺一寸二分七釐第十四節與臍平下七節各一寸二分六釐共八寸八分二釐共二尺九寸九分六釐不足四釐者有零未盡也直寸依此橫寸用中指同身寸法○脊骨內潤一寸凡云第二行俠脊一寸半三行俠脊三寸者皆除脊一寸

外淨以寸半三寸論故在二行當爲二寸在三行當爲三寸半也

側部

自拄骨下行腋中不見者長四寸 拄骨頸項根骨也

腋以下至季脇長一尺二寸 季脇小肋也

季脇以下至髀樞長六寸 大腿曰股股上曰髀楗骨之下大腿之上兩骨合縫之所曰髀樞當足少陽環跳穴處也

髀樞下至膝中長一尺九寸

橫骨上廉下至內輔之上廉長一尺八寸 骨際曰廉膝旁之骨突出者曰輔骨內曰內輔外曰外輔

內輔之上廉以下至下廉長三寸半 上廉下廉可摸而得

內輔下廉下至內踝長一尺二寸

內踝以下至地長三寸

四肢部

肩至肘長一尺七寸

肘至腕長一尺二寸半 臂之中節曰肘

腕至中指本節長四寸 臂掌之交曰腕

本節至末長四寸半 指之後節曰本節

膝以下至外踝長一尺六寸

膝膕以下至跗屬長一尺二寸 膕腿彎也跗足面也膝在前膕在後

跗屬以下至地長三寸 跗屬者凡兩踝前後脛掌所交之處皆爲跗之屬也

外踝以下至地長一寸

足長一尺二寸廣四寸半

按骨度乃靈樞經骨度篇之文論骨之長短皆古數也然骨之大者則太過小者則不及此亦言其則耳其周身手足折量之法用前中指同身寸法爲是同身寸量法詳刺灸書中

補遺

十不治證

顛撲損傷入於肺者縱未即死二七難過

左脇下傷透至內者

腸傷斷者

小腹下傷內者

證候繁多者

傷破陰子者

老人左股壓碎者

血出盡者

肩內耳後傷透於內者

脈不實重者

已上皆不必用藥

御纂醫宗金鑑卷八十八

編輯正骨心法要旨目錄

頭面部

顛頂圖

顛頂骨

囟骨

山角骨

正面圖

凌雲骨

睛明骨

兩顴骨

鼻樑骨

中血堂

唇口

玉堂

地閣骨

齒

側面圖

扶桑骨
耳
玉梁骨
兩釣骨
頰車骨
背面圖
後山骨
壽台骨
旋台骨

編輯正骨心法要旨

顛頂圖

頭面部

顛頂骨

顛者頭頂也其骨男子三叉縫女子十字縫一名天靈蓋位居至高內函腦髓如蓋以統全體者也或碰撞損傷如卒然而死身體强硬鼻口有出入聲氣目閉面如土色心口溫熱跳動者此證可治切不可撅拿並扶起盤坐蓋恐驚亂之氣上冲或從傷處或從七竅走洩必傷性命也惟宜屈膝側臥先將高醋調混元膏熬於項上以定痛消腫活

血拔毒再將草紙捲點着令烟氣薰其口鼻再燃煤淬入醋內使熱氣熏蒸口鼻如無煤之處燒鐵淬之亦可以引五臟血脈使之通和待其口中呻吟有聲即以童便調八釐散溫服可以氣轉陽回外用手法推按心胸兩脇腋下腹上並輕托內腕攢筋頻頻揉摩即掌後高骨寸關尺診脈處也夫衝撞損傷則筋脈强硬頻頻揉摩則心血來復命脈流通即可回生常服正骨紫金丹復外用散瘀和傷湯洗去前敷之混元膏再換敷混元膏服先

藥後或大便色黑乾燥此乃腸胃存有瘀血或有耳聾者俱服加減蘇子桃仁湯以逐瘀血健脾胃養精神兼用導氣通瘀錠塞於耳中飲食宜素粥湯飲忌氣怒油膩麪食卧處宜淨室勿令人喧亂若傷重已死者用白布纏頭以木棍輕輕拍擊足心再提髮令其頭正安定頸骨舒其筋絡外敷混元膏內服紫金丹若墜車馬損傷頭縫者其邪墜兩下多在左而少在右因右手得便而然也其治法同礮捶諸傷如項骨塌陷傷動腦髓七竅出血身挺僵厥昏悶全無知覺者不治

混元膏

治打撲損傷骨碎筋翻瘀血凝聚消青紫腫痛等證

羚羊血 五錢　沒藥 五錢
漏蘆 三錢　紅花 三錢
大黃 二錢　麝香 三錢
升麻 三錢　白及 五錢
生梔子 二錢　甘草 二錢

明雄黃 五錢　白歛 三錢

共為細末用高醋熬成膏敷於項上

八釐散

治跌打損傷接骨散瘀

蘇木麪 一錢　半兩錢 一錢
自然銅 三錢 醋淬七次　乳香 三錢
沒藥 三錢　血竭 三錢
麝香 一分　紅花 一錢
丁香 五分　番木鱉 一錢 油炸去毛

共爲細末黄酒温服童便調亦可

正骨紫金丹

治跌打撲墜閃錯損傷並一切疼痛瘀血凝聚

丁香　木香

瓜兒血竭　兒茶

熟大黄　紅花各一兩

當歸頭　蓮肉

白茯苓　白芍各二兩

丹皮五錢　甘草三錢

共爲細末煉蜜爲丸每服三錢童便調下黄酒亦可

散瘀和傷湯

治一切碰撞損傷瘀血積聚

番木鱉油煠去毛　紅花

生半夏各五錢　骨碎補

甘草各三錢　葱鬚一兩

水五碗煎滾入醋二兩再煎十數滾薰洗患處一日十數次

加減蘇子桃仁湯

治瘀血內聚心經瘀熱大腸不燥者

蘇子二錢　蘇木末一錢

紅花一錢　桃仁炒

麥冬　橘紅各三錢

赤芍　竹茹

當歸酒洗各二錢

水三鍾煎一鍾渣二鍾煎八分温服

導氣通瘀錠

耑治耳聾奇方

用不去油巴豆一箇斑蝥三箇麝香少許以葱涎蜂蜜和捻如麥粒形絲綿裹置耳中響聲如雷勿得驚懼待二十一日耳中有膿水流出方可去錠奇妙無比

囟骨

囟骨者嬰兒頂骨未合軟而跳動之處名曰囟門或跌打損傷骨縫雖綻尚未振傷腦髓筋未振轉其形頭項浮光面虛眼腫鼻大脣翻舌硬睡困昏沉肉雖腫而未皮破出血者宜扶起正坐即以葱汁合定痛散敷於傷處再以毛頭紙蘸醋貼藥上燒鐵熨斗烙紙上以傷處覺熱疼口中有聲為度去藥貼萬靈膏三日一換待疼止思食始揭去膏以和傷湯洗之則風除腫散血活氣理矣肉破出

血者即用馬屁勃灰先止其血次用榆樹皮灸熨法內服人參紫金丹以健脾胃提元氣止渴生津增長精神強壯身體令筋血和通為要忌發物火酒戴抽口穿帶布帽以避風寒不可出房若肉破血流不止骨陷筋翻必損腦髓身軟屈手筋強氣息無聲則危篤難醫若破痕觸冒寒風者不治馬屁勃俗名狗頭灰塵口外者佳

定痛散

治一切打撲損傷定痛消腫舒筋和絡

當歸　川芎

白芍　官桂各一錢

三柰三錢　麝香三分

紅花五錢　紫丁香根五錢

升麻一錢　防風一錢

共為細末老葱擣汁合敷患處再用熨法

灸熨法

此法治以灸熨肉破血出諸傷蓋因血液津漬潮潤以樹皮隔之方灸熨也先以榆樹皮安患

處再以老葱擣爛並蘄艾止痛散和勻置樹皮上連灸五次畢以軟絹包裹戴抽口布帽繫緊帶子謹避風冷

萬靈膏

治跌打損傷消瘀散毒舒筋活血止痛接骨如神兼去麻木風痰寒濕疼痛等證

鸛筋草　透骨草

紫丁香根　當歸酒洗

自然銅醋淬七次　瓜兒血竭

没藥各一兩　川芎八錢
赤芍二兩　半兩錢醋淬一枚
紅花一兩　川牛膝
五加皮　石菖蒲
茅山蒼朮各五錢　木香
秦艽　蛇床子
肉桂　川附子製
半夏製　石斛
萆薢　鹿茸各三錢

虎脛骨一對　麝香二錢
右除血竭没藥麝香三味各研細末另包外共二十三味先將香油十觔微火煨浸三日然後將群藥入油內熬黑爲度去滓加黃丹五觔再熬將至滴水成珠離火俟少時藥溫將血竭没藥麝香下入攪勻取起出火氣

人參紫金丹

此丹提補元氣健壯脾胃止渴生津增長精神和通筋血被跌仆悶撞而氣虛者最宜服之

人參三錢　丁香一兩
五加皮二兩　甘草八錢
茯苓二錢　當歸酒洗一兩
血竭一兩　骨碎補一兩
五味子一兩　没藥去油二兩
共爲細末煉蜜爲丸每服三錢早晚淡黃酒化服童便化服亦可

山角骨

山角骨即頭頂兩旁棱骨也凡有跌打損傷未破者不拘左右宜紫腫硬瘀血凝聚疼痛或昏迷目閉身軟而不能起聲氣短少語言不出心中忙亂睡臥喘促飲食少進者宜內服正骨紫金丹外用灸熨如囟骨傷法如肉破流血不止者先用馬屁勃灰止血後以榆樹皮蓋傷處以艾合定痛散灸之如傷重者先服人參紫金丹後如前法如損傷太重成破傷風不治

正骨紫金丹 見前巔頂傷

人參紫金丹 見前囟骨傷

正面圖

凌雲骨

凌雲骨在前髮際下即正中額骨其兩眉上之骨即俗名左天賢骨右天貴骨兩額角也跌打損傷皮破二目及面浮虛腫若內損瘀血上嘔吐衄氣虛昏沉不省人事身軟面色乾黃徧身虛浮躁煩焦渴胸膈疼痛脾胃不開飲食少進先服𨁍血丸再以五加皮湯薰洗患處敷烏龍膏定痛消腫

𨁍血丸

此藥止血開胃

百草霜 三錢　好阿膠 蛤粉炒成珠
藕節　側栢葉
茅根　當歸 酒洗各一兩
共爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五錢
早晚老酒送下
五加皮湯
此湯舒筋和血定痛消瘀
當歸 酒洗　沒藥
五加皮　皮消

青皮　川椒
香附子 各三錢　丁香 一錢
麝香 一分　老葱 三根
地骨皮 一錢　丹皮 二錢
水煎滾薰洗患處
烏龍膏
此膏治跌打損傷筋斷骨折腫硬青紫
百草霜 三錢　白及 五錢
白歛 三錢　百合 五錢

百部 三錢　乳香 五錢
沒藥 五錢　麝香 一分
糯米 炒一兩　陳粉子 四兩隔年者佳炒
共爲細末醋熬爲膏

睛明骨

睛明骨即目窠四圍目眶骨也其上曰眉棱骨其下曰䪼骨䪼骨下接上牙床打仆損傷血流滿面者敷刀瘡藥撳痛瘀血者敷混元膏如骨損者內服八釐散忌生冷發物偶食猪頭肉者必發至一月後始愈凡眼胞傷損而瞳神不碎者可治

刀瘡藥

治一切金刃所傷敷之止血收口定痛護風

上白石膏一觔煅　淨板松香一觔水提過

珍珠五錢豆腐煮過

右三味共研細末和為一處磁罐收貯備用

混元膏

八釐散俱見頭傷

兩顴骨

兩顴骨者面上兩旁之高起大骨也打仆損傷青腫堅硬疼痛牙車緊急嚼物艱難鼻孔出血兩唇掀翻內服正骨紫金丹外以海桐皮湯薰洗口漱蓽茇散坐卧避冷處

海桐皮湯

治一切跌打損傷筋翻骨錯疼痛不止

海桐皮　鐵線透骨草

明淨乳香　沒藥各二錢

當歸一錢五分酒洗　川椒三錢

川芎一錢　紅花一錢

威靈仙　白芷

甘草　防風各八分

共為粗末裝白布袋內紮口煎湯薰洗患處

蓽茇散

蓽茇　良薑

細辛各一錢

水三鍾煎一鍾漱口

正骨紫金丹見兩山角傷

鼻樑骨

鼻孔之界骨名曰鼻樑骨下至鼻之盡處名曰準頭凡鼻兩孔傷凹者可治血出無妨若鼻樑骨凹陷者用當歸膏敷貼若兩孔跌磕傷開孔竅或金刃傷開孔竅用封口藥敷傷處外以消毒定痛散貼之退腫若鼻破傷落者用綴法

封口藥

治跌打損傷皮開肉破及金刃傷割喉斷耳缺唇傷破肚皮跌破陰囊皮等證大效

明淨乳香　沒藥

兒茶　當歸

杉皮炭各一錢　麝香五釐

片腦一分

豬鬃䕲藥一錢如無此藥用葛葉毛藤子葉亦可

右各另碾細末稱合和勻入麝碾細次入片腦研勻磁礶收貯聽用

消毒定痛散

治跌撲損傷腫硬疼痛

無名異炒　木耳炒
川大黃各五錢
共為末蜜水調塗如內有瘀血砭去敷之若
腐處更用當歸膏敷之尤好

神效當歸膏
此膏斂口生肌拔毒止痛並諸瘡毒氣壅盛腐
化成膿
當歸　黃蠟各一兩
麻油四兩

右將當歸入油煎令焦黑去滓次入黃蠟急攪
化放冷以磁器收貯用時以舊絹布攤貼一方
用白蠟

綴法 耳傷落者用此
用人髮入陽城罐以鹽泥固濟煅過為末乘急
以所傷耳尋蘸藥安綴故處以軟絹縛定效昔
江懷禪師被驢咬落其鼻一僧用此綴之如舊

中血堂
中血堂即鼻內頞下脆骨空虛處也若被打仆損
傷血流不止神氣昏迷者宜塞鼻丹塞於鼻中外
復以新汲冷水淋激頭項視其人如氣虛內服人
參紫金丹如血瘀服蘇子桃仁湯服後如血仍不
止飲食不進氣喘目閉面黃者八日死凡跌打損
傷鼻梁骨者無妨

塞鼻丹
此丹治跌打損傷鼻中流血不止神氣昏迷牙

齒損傷虛浮腫痛者及一切衄血之證皆可用
之
朱砂　麝香
丁香　烏梅肉
川烏　草烏
當歸　三柰各一錢
乳香三錢　皂角一分
共為細末用獨頭蒜搗爛為丸以絲棉包裹塞
於鼻中

人參紫金丹 見囟骨傷

蘇子桃仁湯 見顛頂傷

脣口

脣口者司言食之竅也如跌破擊打上脣而拔缺者用絹片一小條從腦後裹向前來縛合先用桑白皮撚線縫定次以封口藥塗傅次敷截血膏蓋住封口藥不令開落仍忌言語如整下脣傷而拔缺者以絹片從下頦兜縛治同前法

截血膏

治跌打砍磕諸證能化血破瘀退腫止痛

天花粉三兩　片子薑黃

赤芍藥　白芷各一兩

右共為細末茶調勻敷瘡口四圍○若頭面傷其血不止者急用此藥調塗頸上週圍○若手傷則塗臂周圍○若傷足則塗腿上○若傷各處則塗瘡口周圍使截住其血不來潮作○若瘡口肉硬不消者此被風襲也可加獨活用熱酒調敷○如又不消則風毒已深肌肉結實加紫荊皮末和敷有必消之理

封口藥 見鼻柱骨傷

玉堂

玉堂在口內上腭一名上含其竅即頏顙也若被觸刺傷於左右者惟腫痛而已若觸傷正中之孔則上通於頞必傷鼻孔之卷肉(俗名鼻氣)或再犯空竅(俗名玉堂)則血流不止以致鼻目皆腫滿面青紫神倦頭暈四肢無力痛連腦髓若傷及會厭與上橫骨輕者易愈重者即不能言若痛連心膈則昏迷沉重急用膩粉冰片敷於紙上貼內破處以止其血內服正骨紫金丹以散瘀定痛理氣健脾寧神定

志復用蟠黃血竭煎湯日漱口二三十次如氣不舒和飲食少進日以柿霜玉露霜牛奶皮奶餅奶酥油并炒糜子麵諸物以涼潤將息之則愈

地閣骨

地閣骨即兩牙車相交之骨又名頦俗名下巴骨上載齒牙打扑損傷者頤脣腫痛牙車振動虛浮飲食不進目閉神昏心熱神亂氣弱體軟用布兜裹繫縛頂上內服大神效活絡丹消瘀散止痛和血理氣健脾再噙化人參紫金丹搽固齒散口漱萆菝散以去牙根腫痛外貼萬靈膏忌風寒冷物戒氣惱

大神效活絡丹

此丹宣暢氣血通利經絡並風濕諸痺口眼喎

斜半身不遂行步艱難筋骨拘攣手足疼痛等證

白花蛇(酒浸焙)　烏梢蛇(酒浸焙)
麻黃(去節)　防風
炙草　官桂
草荳蔻　羌活
元參　天麻
藿香　何首烏

白芷　川連黃
黃耆　熟地黃
川大黃各二兩　遼細辛
赤芍藥　朱砂水飛
沒藥去油　乳香去油
白殭蠶去黑嘴炒　天竺黃
敗龜板酥炙　丁香
虎脛骨酥炙　烏藥
青皮　黑附子

白蔻仁炒　骨碎補
白茯苓　於白朮土炒
當歸酒洗　沉香各一兩
全蠍去毒　葛根
威靈仙各一兩五錢酒浸　瓜兒血竭
犀角各七錢五分　麝香五錢
地龍八錢去土　淨松香五錢
兩頭尖　川芎各一兩
京牛黃一錢五分　片腦一錢五分

共為細末煉蜜為丸金箔為衣每丸重一錢
以蠟皮封裹溫酒送下隨病上下食前後服

人參紫金丹見川角骨傷
固齒散見齒傷
韮茇散見附部傷
萬靈膏見頭部傷

齒

齒者口齦所生之骨也俗名曰牙有門牙虎牙槽牙上下盡根牙之別凡被跌打砍磕落去牙齒者只用補肌散敷之並封口藥內服破血藥以止其痛其藥只用水煎不宜酒煎此法頗收功效如牙斷跌磕砍傷牙齒未動者用芙蓉膏塗之如齒動者用蒺藜根燒存性為末常揩擦之即牢用固齒散時時揩之亦佳

補肌散

止血除痛辟風續筋骨生肌肉

地黃苗　地菘

青蒿　蒼耳苗

赤芍藥各五兩水煎取汁　生艾汁三合

右五月五日七月七日午時修合以前藥汁拌石灰陰乾入黃丹三兩更杵為細末凡有傷折出血用藥包封不可動約十日可瘥不腫不膿

芙蓉膏

治打撲傷損腫痛紫黑色久不退者

紫荊皮　南星各一兩

芙蓉二兩　獨活

白芷　赤芍藥各五錢

右共為末用生薑汁茶清調溫貼敷傷損紫黑色久不退者加肉桂五錢

固齒散

骨碎補　牡鼠骨煅灰

共研細末磁罐收貯聽用

封口藥見鼻柱骨傷

側面圖

扶桑骨

扶桑骨即兩額骨旁近太陽肉內凹處也若跌仆損傷或掀腫或血出或青紫堅硬頭疼耳鳴青痕滿面憎寒惡冷心中發熱大便乾燥宜內服正骨紫金丹如破損者外以灸熨法定痛外破者烏龍膏敷之

正骨紫金丹

灸熨法（俱見顛頂骨傷）

烏龍膏（方見凌雲骨傷）

耳

耳者司聽之竅也耳門之名曰蔽耳輪之名曰郭凡耳被砍跌打落或上脫下粘或下脫上粘內用封口藥外用消毒定痛散敷貼及耳後看脫落所向用鵝翎橫夾定却用竹夾子直上橫縛定縛時要兩耳相對輕輕縛住或用綴法

封口藥

消毒定痛散（俱見鼻柱骨傷）

綴法（見鼻柱骨傷）

玉梁骨

玉梁骨即耳門骨其處上即曲頰下即頰車兩骨之合鉗也耳門內上通腦髓亦關靈明若墊傷擊傷而有礙於骨肉者腫痛流血服正骨紫金丹八仙逍遙湯洗之洗畢貼混元膏坐臥避冷處若傷重內連腦髓及傷靈明必昏沉不省人事不進飲食若再平素氣血皆虛必爲不治之證

八仙逍遙湯

掛洗跌仆損傷腫硬疼痛及一切冷振風濕筋骨血肉肢體痠痛諸證

防風　荊芥

川芎　甘草各一錢

當歸酒洗　黃蘗各二錢

茅山蒼术　牡丹皮

川椒各三錢　苦參五錢

共合一處裝白布袋內紮口水熬滾薰洗患處

兩釣骨

兩釣骨名曲頰即上頰之合鉗曲如環形以納下牙車骨尾之鉤者也打仆損傷耳腫腮硬牙關緊急嚼物不合宜內服正骨紫金丹外貼萬靈膏坐臥避冷處

正骨紫金丹

萬靈膏俱見顛頂傷

頰車骨

頰車骨即下牙床骨也俗名牙鉤承載諸齒能咀食物有運動之象故名頰車其骨尾形如鉤上控於曲頰之環或打仆脫臼或因風濕襲入鉤環脫臼單脫者爲錯雙脫者爲落凡治單脫者用手法摘下不脫者以兩手捧下頦稍外拽復向內托之則雙鉤皆入上環矣再以布自地閣纏繞頭頂以固之宜內服正骨紫金丹外貼萬靈膏待能飲食後去布只用布兜其下頦繫於頂上二三日可愈

若雙脫者治法同前若欠而致脫臼者乃突滑也無妨脫臼者俗名吊下巴欠者俗名打哈氣

正骨紫金丹

萬靈膏方俱見顚頂傷

背面圖

後山骨

後山即頭後枕骨也其骨形狀不同或如品字或如山字或如川字或圓尖或月芽形或偃月形或雞子形皆屬枕骨凡有傷損其人頭昏目眩耳鳴有聲項強咽直飲食難進坐臥不安四肢無力內服正骨紫金丹外敷烏龍膏洗以蔥槐皮湯以散瘀去麻木止痛如僕從高處墜下後山骨傷太重筋翻氣促痰響如拽鋸之聲垂頭目閉有喘聲者此風熱所乘至危之證不能治也遺尿者必亡惟

月芽形者更易受傷如被墜墮打傷震動蓋頂骨縫以致腦筋轉擰疼痛昏迷不省人事少時或明者其人可治急以涼水蘸髮啓開牙關以酒調八釐散灌之服後目開痛苦有聲二目流淚愈見可治之兆服正骨紫金丹炒米粥調養可愈

正骨紫金丹 見顛頂傷

烏龍膏 見凌雲骨傷

海桐皮湯 見兩顴骨傷

八釐散 見顛頂傷

壽台骨

壽台骨即完骨在耳後接於耳之玉樓骨者也若跌打損傷其耳上下俱腫起耳內之禁骨有傷則見血膿水耳外瘀聚凝結疼痛筋結不能舒通以致頭暈眼迷兩太陽扶桑骨脹痛頸項筋强虛浮紅紫精神短少四肢無力坐臥不安飲食少進以烏龍膏敷耳傷處用絲棉裹導氣通瘀錠塞耳內內服人參紫金丹通瘀散腫外再以八仙逍遙湯薰洗消散虛浮腫痛忌食熱物發物如血流不止三日不飲食必動腦髓不宜治之

烏龍膏 見凌雲骨傷

導氣通瘀錠 見顛項骨傷

人參紫金丹 見山角骨傷

八仙逍遙湯 見玉梁骨傷

旋台骨

旋台骨又名玉柱骨即頭後頸骨三節也一名天柱骨此骨被傷共分四證一曰從高墜下致頸骨插入腔内而左右尚活動者用提項法治之一曰打傷頭低不起用端法治之一曰墜傷左右歪邪用整法治之一曰仆傷面仰頭不能垂或筋長骨錯或筋聚或筋强骨隨頭低用推端續整四法治之凡治者臨證時問其或墜車馬跌傷或高處墜下折傷或打重跌倒再問其或思飲食或不思飲食或四肢無傷而精神不減或精神短少或能坐起行走或昏睡不語或疼痛不止瘀聚凝結腫硬筋脹皆宜内服正骨紫金丹外敷萬靈膏並洗海桐皮湯灸熨定痛散外按手法治之手法詳首卷

正骨紫金丹

萬靈膏俱見顛頂傷

海桐皮湯見兩顴骨傷

定痛散見兩山角骨傷

編輯正骨心法要旨目錄

胸背部

胸骨圖

䯏子骨

胸骨脇肋附

歧骨

蔽心骨

鳬骨

陰囊

背骨圖

背骨

腰骨

尾骶骨

四肢部

四肢圖

髃骨

臑骨

肘骨
臂骨
腕骨
五指骨
竹節骨
四肢圖
髀骨
環跳
大楗骨
膝蓋骨
胻骨
踝骨
跗骨
足五趾骨
跟骨

御纂醫宗金鑑卷八十九

編輯正骨心法要旨

胸骨圖

胸背部

髃子骨

髃子骨經名拄骨橫臥於兩肩前缺盆之外其兩端外接肩解擊打損傷或騎馬乘車因取物偏墜於地斷傷此骨用手法先按胸骨再將肩端向內合之揉摩斷骨令其復位然後用帶掛臂於項勿令搖動內服人參紫金丹外敷定痛散再敷萬靈膏其證可愈

人參紫金丹

定痛散俱見山角骨傷

萬靈膏見顱頂傷

胸骨

胸骨即𩩲骬骨乃胸脇衆骨之統名也一名膺骨一名臆骨俗名胸膛其兩側自腋而下至肋骨之盡處統名曰脇脇下小肋骨名曰季脇俗名軟肋肋者單條骨之謂也統脇肋之總又名曰胠凡胸骨被物從前面撞打跌仆者重從後面撞仆者輕輕者先按證用手法治之再內服正骨紫金丹外用麪麩和定痛散炙熨之或以海桐皮湯洗之貼萬靈膏即能獲效若內血瘀聚腫痛傴僂難仰者

早辰以清上瘀血湯消下破血湯分上膈下膈以治之晚服疎血丸有受傷日久胸骨高起肌肉削瘦內有邪熱瘀血否氣膨悶睛藍體倦痰喘咳嗽者宜加減紫金丹以消熱化痰理氣健脾潤肌定喘若傷重者內干胸中必通心肺兩藏其人氣亂昏迷閉目嘔吐血水呃逆戰慄者則危在旦夕不可醫治矣若兩側擬肋諸骨被傷者則相其輕重以分別治之凡胸脇諸傷輕者如黎洞丸三黃寶蠟丸等藥皆所必需宜酌用之

清上瘀血湯

治上膈被傷者

羌活　獨活

連翹　桔梗

枳殼　赤芍

當歸酒洗　山梔子

黄芩　甘草

川芎　桃仁

紅花　蘇木

川大黄　生地黄

水煎加老酒童便和服

消下破血湯

治下膈被傷者

柴胡　川芎

川大黄　赤芍藥

當歸　梔子

五靈脂　木通

枳實炒　紅花

赤牛膝　澤蘭葉

蘇木　生地黄

黄芩　桃仁

水煎加老酒童便和服

加減紫金丹

白茯苓　蒼朮各二兩米泔浸炒

當歸　熟地黄

白芍藥炒　陳皮各四兩

肉蓯蓉去鱗甲一兩酒洗　丁香一錢

紅花五錢　瓜兒血竭一錢

乳香去油三錢　沒藥去油三錢

共爲細末煉蜜爲丸彈子大用黄酒送下

黎洞丸

治跌打損傷瘀血奔心昏暈不省及一切無名

腫毒昏困欲死等證

京牛黄　冰片

麝香各二錢五分　阿魏

雄黄各一兩　川大黄

兒茶　天竺黃

三七　瓜兒血竭

乳香去油　沒藥去油各二兩

籐黃二兩隔湯煮十數次去浮沫用山羊血五錢拌晒如無山羊血以子羊血代之

已上十三味共爲細末將籐黃化開爲丸如芡實大若乾稍加白蜜外用蠟皮封固內服用無灰酒送下外敷用茶滷磨塗忌一切生冷發物

三黃寶蠟丸

治一切跌打損傷及破傷風並傷力成癆女人產後惡露不盡致生怪證瘀血奔心痰迷心竅危在旦夕重者一錢輕者三分用無灰酒送下立刻全生如被鳥鎗打傷鉛子在內危在傾刻服一錢吃酒數杯睡一時汗出即愈如外敷將香油熱化少許雞翎掃患處服藥後忌涼水生冷燒酒三日如不忌此酒則藥無功

天竺黃三兩　雄黃二兩

劉寄奴　紅芽大戟去骨

騏驎竭各三兩　歸尾一兩五錢

硃砂　兒茶各一兩

淨乳香去油三錢　琥珀

輕粉　水銀同輕粉研不見星

麝香各二錢

已上各稱足分兩各研爲細末如無眞天竺黃以眞膽星三兩代之再用好黃蠟二十四兩煉淨滾湯坐定將藥投入不住手攪勻取

出裝磁罐內備用

正骨紫金丹

萬靈膏俱見顛頂骨傷

定痛散見山角骨傷

疎血丸見凌雲骨傷

岐骨

岐骨者即兩凫骨端相接之處其下即鳩尾骨也內近心君最忌觸犯或打撲或馬撞則血必壅瘀而多疼痛輕者只在於膈上重者必入心臟致神昏目閉不省人事牙關緊閉痰喘鼻搧久而不醒醒而神亂此血瘀而堅凝不行者也難以回生如神不昏亂惟瘀痛不止胸滿氣促默默不語醒時猶能稍進飲食者宜早晨服加減蘇子桃仁湯加枳殼晩服疎血丸外貼萬靈膏再以炒熱定痛散熨之庶可愈也又凡周身骨之兩叉者皆名岐骨學者宜知之

加減蘇子桃仁湯（見顚頂骨傷）

疎血丸（見麦雲骨傷）

萬靈膏（見顚頂骨傷）

定痛散（見山角骨傷）

蔽心骨

蔽心骨即鳩尾骨也其質係脆骨在胸下岐骨之間跌打撞振傷損疼痛不止兩脇氣串滿腹疼痛腰佝不起兩手按胸者宜內服八釐散外用艾醋湯洗之敷萬靈膏渴飲淡黃酒忌茶水生冷粇米粥

八釐散

萬靈膏（俱見顚頂骨傷）

凫骨

凫骨者卽胸下之邊肋也上下二條易被損傷左右皆然自此以上有肘臂護之難以著傷在下近腹者用手提之易治蓋其肋近邊可以著手則斷肋能復其位也其人必低頭傴腰痛苦呻吟惟側臥不能仰臥若立起五內皆痛或頭迷神昏飲食少進宜內服正骨紫金丹洗以八仙逍遙湯貼萬靈膏及散瘀等藥可愈若在上之第二肋或有斷裂墊傷塌陷不起因位居隔上難以入手雖強爲

之亦難完好其所傷之血留於膈上若不隨藥性開行必結成包囊其包輕者係黃水硬者係血塊則成痼疾矣

正骨紫金丹 見顛頂

八仙逍遙湯 見玉梁骨傷

萬靈膏 見顛頂骨傷

陰囊

凡陰囊被人扯破者用雞子黃油拌金毛狗脊毛薄攤塗油於上次傅封口藥又用截血膏敷貼或烏龍膏敷貼亦可內服加減紫金丹洗用紫蘇葉煎水洗之

凡陰囊有青黑紫色腫者用定痛膏加赤芍草烏良薑肉桂各少許打和用韭葉搗爛同貼如無韭葉用葱葉亦可仍服利小水之藥

定痛膏

治打撲傷損動筋折骨跌磕木石壓傷腫痛

芙蓉葉二兩　紫荊皮

獨活　南星生

白芷各五錢

右共爲末加馬齒莧一兩搗極爛和末一處用生葱汁老酒和炒煖敷

封口藥 見鼻柱

截血膏 見唇口

烏龍膏 見凌雲骨傷

加減紫金丹見胸骨傷

背骨圖



背骨

背者自後身大椎骨以下腰以上之通稱也其骨一名脊骨一名膂骨俗呼脊樑骨其形一條居中共二十一節下盡尻骨之端上載兩肩內繫藏府其兩旁諸骨附接橫叠而彎合於前則爲胸脇也先受風寒後被跌打損傷者瘀聚凝結若脊筋隴起骨縫必錯則成傴僂之形當先揉筋令其和軟再按其骨徐徐合縫背膂始直內服正骨紫金丹再敷定痛散以燒紅鐵器烙之覺熱去敷藥再貼

混元膏

正骨紫金丹

混元膏（俱見頭頂傷）

定痛散（見山角骨傷）

腰骨

腰骨即脊骨十四椎十五椎十六椎間骨也若跌打損傷瘀聚凝結身必俯臥若欲仰臥側臥皆不能也疼痛難忍腰筋僵硬宜手法將兩旁脊筋向內歸附脊骨治者立於高處將病人兩手高舉則脊筋全舒再令病人仰面昂胸則脊骨正而患除矣內服補筋丸外貼萬靈膏灸熨止痛散

止痛散

止痛消腫活血通經辟風驅寒

防風　荊芥

當歸　蘄艾

牡丹皮　鶴虱

升麻（各一錢）　苦參

鐵線透骨草　赤芍藥（各二錢）

川椒（三錢）　甘草（八分）

共用末裝白布袋內紮口煎滾熏洗

補筋丸（見髃骨傷）

萬靈膏（見頭頂傷）

尾骶骨

尾骶骨即尻骨也其形上寬下窄上承腰脊諸骨兩旁各有四孔名曰八髎其末節名曰尾閭一名骶端一名橛骨一名窮骨俗名尾椿若蹲垫壅腫必連腰胯内服正骨紫金丹洗以海桐皮湯貼萬靈膏

正骨紫金丹 見顛頂傷

海桐皮湯 見兩顴骨傷

萬靈膏 見顛頂骨傷

四肢圖

四肢部

髃骨

髃骨者肩端之骨即肩胛骨臼端之上棱骨也其臼含納臑骨上端其處名肩解即肩髆與臑骨合縫處也俗名吞口一名肩頭其下附於脊背成片如翅者名肩胛亦名肩髆俗名鍁板子骨已上若被跌傷手必屈轉向後骨縫裂開不能抬舉亦不能向前惟扭於肋後而已其氣血皆壅聚於肘肘腫如椎其腫不能過腕兩手筋反脹瘀血凝滯如

腫處痛如鍼刺不移者其血必化而爲膿則腕掌皆涼或麻木若臑骨突出宜將突出之骨向後推入合縫再將臑筋向內撥轉則臑肘臂腕皆得復其位矣內服補筋丸外貼萬靈膏燙洗用海桐皮湯或敷白膠香散或金沸草汁塗之亦佳

補筋丸

此藥專治跌仆踒閃筋翻筋攣筋脹筋粗筋聚骨錯血瘀壅滯宣腫青紫疼痛等證

五加皮　蛇床子
好沉香　丁香
川牛膝　白雲苓
白蓮蕊　肉蓯蓉
菟絲子　當歸酒洗
熟地黃　牡丹皮
宣木瓜各一兩　懷山藥八錢
人參　廣木香各三錢

共爲細末煉蜜爲丸彈子大每丸重三錢用好無灰酒送下

又加減補筋丸

當歸一兩　熟地黃
白芍藥各二兩　紅花
乳香　白雲苓
骨碎補各一兩　廣陳皮二兩
沒藥三錢　丁香五錢

共爲細末煉蜜爲丸彈子大每丸重三錢用好無灰酒送下

白膠香散

治皮破筋斷

白膠香一味爲細末敷之

又方

金沸草根搗汁塗筋封口二七日便可相續止痛一貼即愈不用再塗

萬靈膏見顚頂骨傷
海桐皮湯見兩顴骨傷

臑骨

臑骨卽肩下肘上之骨也自肩下至手腕一名肱俗名肐膊乃上身兩大支之通稱也或墜車馬跌碎或打斷或斜裂或截斷或碎斷打斷者有碎骨跌斷者則無碎骨壅腫疼痛心神忙亂徧體麻冷皆用手法循其上下前後之筋令得調順摩按其受傷骨縫令得平正再將小杉板周圍逼定外用白布纏之內服正骨紫金丹外貼萬靈膏如壅腫不消外以散瘀和傷湯洗之

正骨紫金丹

萬靈膏

散瘀和傷湯 俱見顛頂骨傷

肘骨

肘骨者肐膊中節上下支骨交接處也俗名鵝鼻骨若跌傷其肘尖向上突出疼痛不止汗出戰慄用手法翻其臂骨拖肘骨令其合縫其斜彎之筋以手推摩令其平復雖卽時能垂能舉仍當以養息爲妙若壅腫疼痛宜內服正骨紫金丹外貼萬靈膏

正骨紫金丹

萬靈膏 俱見顛頂骨傷

臂骨

臂骨者自肘至腕有正輔二根其在下而形體長大連肘尖者爲臂骨其在上而形體短細者爲輔骨俗名纏骨疊並相倚俱下接於腕骨焉凡臂骨受傷者多因迎擊而斷也或斷臂輔二骨或惟斷一骨瘀血凝結疼痛以手法接對端正貼萬靈膏竹簾裹之加以布條紮緊俟三日後開簾視之以手指按其患處或仍有未平再揉摩其瘀結之筋令復其舊換貼膏藥仍以竹簾裹之每日清晨服

正骨紫金丹

萬靈膏

正骨紫金丹 俱見顛頂骨傷

腕骨

腕骨即掌骨乃五指之本節也一名壅骨俗名虎骨其骨大小六枚湊以成掌非塊然一骨也其上並接臂輔兩骨之端其外側之骨名高骨一名銳骨亦名踝骨俗名龍骨以其能宛屈上下故名曰腕若墜車馬手掌著地只能傷腕若手指著地其指翻貼於臂上者則腕縫必分開傷腕者壅腫疼痛法以兩手揉摩其腕內服正骨紫金丹外貼萬靈膏若手背向後翻貼於臂者以兩手捉其手背輕輕回翻之令其復位仍按摩其筋必令調順內服人參紫金丹外敷混元膏

正骨紫金丹

萬靈膏

混元膏 俱見顛頂骨傷

人參紫金丹 見山角骨傷

五指骨

五指之骨名錘骨即各指本節之名也若被打傷折五指皆同株連腫痛因其筋皆相連也手掌與背其外體雖混一不分而其骨在內乃各指之本節相連而成者也若手背與手心皆堅硬癰腫熱痛必正其骨節則無後患若不即時調治其所癰之血後必化而爲膿氣盛者服疮毒之劑調治可愈氣虛者將來成漏矣洗以散瘀和傷湯貼萬靈膏

散瘀和血湯 俱見顛

萬靈膏 頂骨傷

竹節骨

竹節骨即各指次節之名也跌打損傷骨碎筋彎指不能伸以手捻其屈節則指必舒直洗以散瘀和傷湯貼以萬靈膏如指甲縫蓄積毒血其甲必脫落若再生指甲其形多不如舊若第三節有傷治同次節其指甲名爪甲

散瘀和傷湯

萬靈膏 俱見顛頂骨傷

四肢圖

膀骨

膀骨即髖骨也又名髁骨若素受風寒濕氣再遇跌打損傷瘀血凝結腫硬筋翻足不能直行筋短者脚尖著地骨錯者臀努斜行宜手法推按膀骨復位將所翻之筋向前歸之其患乃除宜服加味健步虎潛丸薰洗海桐皮湯灸熨定痛散

加味健步虎潛丸

耑治跌打損傷氣血虛衰下部腰膀膝腿疼痛痠軟無力步履艱難服此藥至一百日舒筋止痛活血補氣健旺精神

龜膠 蛤粉炒成珠　鹿角膠 蛤粉炒成珠

虎脛骨 酥油炙　何首烏 黑豆拌蒸晒各九

川牛膝 酒洗晒乾　杜仲 薑汁炒斷絲

鎖陽　當歸 各二兩 酒洗炒乾

威靈仙 酒洗　黃蘗 酒洗晒乾小鹽少許酒炒

人參 去蘆　羌活

乾薑　白芍藥 微炒

雲白术 土炒 各一兩　熟地黃 三兩

大川附子 一兩五錢 童便浸水各一碗生薑二兩切片同煮整日令極熟水乾再添鹽水煮畢取出剝皮切薄片又換淨水入川黃連五錢甘草五錢同煮長香三炷取出晒乾如琥珀明亮色方用

共爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三錢空心淡鹽湯送下　冬日淡黃酒送下

海桐皮湯 見兩顴

定痛散 見山角骨傷

環跳

環跳者髖骨外向之凹其形似臼以納髀骨之上端如杵者也名曰機又名髀樞即環跳穴處也或因跌打損傷或踒墊掛鐙以致樞機錯努青紫腫痛不能步履或行止欹側艱難宜先服正骨紫金丹洗以海桐皮湯貼萬靈膏常服健步虎潛丸

正骨紫金丹見顛頂骨傷

萬靈膏見顛頂骨傷

海桐皮湯見兩顴骨傷

虎潛丸見髖骨傷

大楗骨

一名髀骨上端如杵入於髀樞之臼下端如錘接於䯒骨統名曰股乃下身兩大支之通稱也俗名大腿骨墜馬拧傷骨碎筋腫黑紫清涼外起白泡乃因骨碎氣泄此證治之鮮效如人年少氣血充足者雖形證腫痛而不昏沉無白泡者可治法以兩手按摩碎骨推拿復位再以指頂按其傷處無錯落之骨用竹簾裹之每日早服正骨紫金丹俟三日後開簾視之若有不平處再捻筋結令其舒平貼萬靈膏仍以竹簾裹之

正骨紫金丹見顛頂骨傷

萬靈膏見顛頂骨傷

膝蓋骨

膝蓋骨即連骸亦名髕骨形圓而扁覆於楗䯒上下兩骨之端內面有筋聯屬其筋上過大腿至於兩脇下過䯒骨至於足背如有跌打損傷膝蓋上移者其筋即腫大株連於腘內之筋腘內之筋上連腰胯故每有腰屈疼痛之證或下移䯒骨則焮腫或足腹冷硬步履後拽斜行也若膝蓋離位向外側者則內筋腫大向內側者則筋直腘腫宜詳視其骨如何斜錯按法推拿以復其位內服補筋丸以定痛散灸熨之熏八仙逍遙湯則愈

補筋丸 見髃骨傷

定痛散 見山角骨傷

八仙逍遙湯 見玉梁骨傷

䯒骨

䯒骨即膝下踝上之小腿骨俗名臁脛骨者也其骨二根在前者名成骨又名骭骨其形粗在後者名輔骨其形細又俗名勞堂骨若被跌打損傷其骨尖斜突外出肉破血流不止疼痛呻吟聲細飲食少進若其人更氣血素弱必致危亡宜用手法按筋正骨令復其位貼萬靈膏以竹簾裹住再以白布纏之先服正骨紫金丹繼服健步虎潛丸

萬靈膏

正骨紫金丹 俱見顛頂骨傷

健步虎潛丸 見髃骨傷

踝骨

踝骨者胻骨之下足跗之上兩旁突出之高骨也在內者名內踝俗名合骨在外者爲外踝俗名核骨或馳馬墜傷或行走錯誤則後跟骨向前脚尖向後筋翻肉腫疼痛不止先用手法撥筋正骨令其復位再用竹板夾定跟骨縛於胻骨之上三日後解縛視之以枕支於足後用手扶筋再以手指點按其筋結之處必令端平內服正骨紫金丹灸熨以定痛散洗以海桐皮湯常服健步虎潛丸若稍愈後遽行勞動致胻骨之端向裏歪者則內踝突出腫大向外歪者則外踝突出腫大血脈瘀聚凝結步履無力足底欹斜頗費調治故必待氣血通暢全復始可行動

正骨紫金丹 見顛頂骨傷

定痛散 見山角骨傷

海桐皮湯 見兩顴骨傷

健步虎潛丸 見顴骨傷

跗骨

跗者足背也一名足趺俗稱脚面其骨乃足趾本節之骨也其受傷之因不一或從隕墜或被重物擊壓或被車馬踹砑若僅傷筋肉尚屬易治若骨體受傷每多難治先以手法輕輕搓摩令其骨合筋舒洗以海桐皮八仙逍遙等湯貼以萬靈膏內服舒筋定痛之劑及健步虎潛丸補筋丸

海桐皮湯 見山角骨傷

八仙逍遙湯 見玉梁骨傷

健步虎潛丸 見顴骨傷

補筋丸 見顛骨傷

足五趾骨

趾者足之指也名以趾者所以別於手也俗名足節其節數與手之骨節同大指本節後內側圓骨努突者一名核骨又名覈骨俗呼為孤拐也趾骨受傷多與跗骨相同惟奔走急迫因而受傷者多治法與跗骨同

跟骨

跟骨者足後跟骨也上承䯒輔二骨之末有大筋附之俗名脚挛筋其筋從跟骨過踝骨至腿肚裏上至膕中過臀抵腰脊至頂自腦後向前至目眥皆此筋之所達也若落馬墜蹬等傷以致跟骨擰轉向前足趾向後仰或骨未碎破而縫隙分離自足至腰脊諸筋皆失其常度拳攣疼痛宜撥轉如舊藥餌調治皆同前法

按正骨紫金丹混元膏散瘀和傷湯海桐皮湯萬靈膏諸藥皆

內庭常用經驗之方故已上諸證多引用之其或跌打損傷證中而又兼他病者則不止此數藥也故採前人舊載諸方集於末卷以示證治之法有不可狹隘者焉

御纂醫宗金鑑卷九十

編輯正骨心法要旨目錄

內治雜證法
方法總論
傷損內證
傷損出血
瘀血泛注
瘀血作痛
血虛作痛
嘔吐黑血
發熱
肌肉作痛
骨傷作痛
胸腹痛悶
脇肋脹痛
腹痛
少腹引陰莖作痛
腰痛

眩暈
煩躁
喘咳
昏憒
作嘔
作渴
秘結
挾表
補遺方

編輯正骨心法要旨

內治雜證法

方法總論

今之正骨科即古跌打損傷之證也專從血論須先辨或有瘀血停積或爲亡血過多然後施以內治之法庶不有誤也夫皮不破而內損者多有瘀血破肉傷䐃每致亡血過多二者治法不同有瘀血者宜攻利之亡血者宜補而行之

但出血不多亦無瘀血者以外治之法治之更察其所傷上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊必先逐去瘀血和榮止痛然後調養氣血自無不效若夫損傷雜證論中不及備載者俱分門晰類詳列於後學者宜盡心焉

傷損內證

凡跌打損傷墜墮之證惡血留內則不分何經皆以肝爲主蓋肝主血也故敗血凝滯從其所屬必歸於肝其痛多在脇肋小腹者皆肝經之道路也若壅腫痛甚或發熱自汗皆宜斟酌虛實然後用調血行經之藥王好古云登高墜下撞打等傷心腹胸中停積瘀血不散者則以上中下三焦分別部位以施藥餌瘀在上部者宜犀角地黃湯瘀在中部者宜桃仁承氣湯瘀在下部者宜抵當湯之

類須於所用湯中加童便好酒同煎服之虛人不可下者宜四物湯加穿山甲若瘀血已去則以復元通氣散加當歸調之內經云形傷作痛氣傷作腫又云先腫而後痛者形傷氣也先痛而後腫者氣傷形也凡打撲閃錯或惱怒氣滯血凝作痛及元氣素弱或因叫號血氣損傷或過服尅伐之劑或外敷寒凉之藥致氣血凝結者俱宜用活血順氣之劑後列諸方以備選用

犀角地黃湯

犀角　生地黄酒浸另搗
丹皮　白芍各等分
水煎服

桃仁承氣湯
大黃　芒消
桃仁　桂枝
甘草
水煎服以利爲度

抵當湯

水蛭　䖟蟲各三十枚去翅足
大黃酒浸三兩　桃仁三十枚去皮尖
水煎去渣取三升溫服一升不下再服

復元活血湯
柴胡五錢　當歸
穿山甲炮　栝蔞根各二錢
甘草　紅花各二錢
桃仁五十箇去皮尖　大黃一兩酒浸
右將桃仁研爛餘藥剉如麻豆大每服一兩

水二鍾酒半盞煎至七分去滓大溫食前服
以利爲度

巴戟湯
巴戟去心　大黃各半兩
當歸　地黃
芍藥　川芎各一兩
右爲末水煎服以利爲度

破血消痛湯
羌活　防風

官桂各一錢　蘇木一錢半
柴胡　連翹
當歸梢各二錢　麝香少許另研
水蛭二錢炒去煙盡另研
右爲粗末共一服酒二大盞水一盞水蛭麝香另研如泥餘藥煎至一大盞去火稍熱調二味服之兩服立愈

清心藥
牡丹皮　當歸

川芎　赤芍藥
生地黄　黄芩
黄連　連翹
梔子　桃仁
甘草各等分
右引用燈心草薄荷煎入童便和服

止痛藥

當歸　牛膝
川芎　懷慶生地

赤芍藥　白芷
羌活　獨活
杜仲　續斷各一兩
肉桂　八角茴香
乳香　沒藥各五錢
南木香　丁皮
沉香　血竭各二錢半
右爲末老酒調用

活血順氣何首烏散

何首烏三錢　當歸
赤芍藥　白芷
烏藥　枳殼
防風　甘草
川芎　陳皮
香附　紫蘇
羌活　獨活
肉桂各一錢
右薄荷生地黄煎入酒和服

疼痛甚者加乳香沒藥

調經散

川芎　當歸
芍藥　黄耆各一錢半
青皮　烏藥
陳皮　熟地黄
乳香另研　茴香各一錢
右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

牡丹皮散

牡丹皮　當歸
骨碎補　紅花酒洗
續斷　乳香
没藥　桃仁
川芎　赤芍藥
生地黃各等分
右水酒煎服却用秫米飯熱罨縛於又蒸熱
換縛
橘朮四物湯

當歸　川芎
白芍藥　懷慶生地各二錢
陳皮　白朮
紅花各一錢　桃仁十枚
右生地黃煎服
骨節疼加羌活獨活
痛不止加乳香没藥
當歸補血湯
當歸　川芎

白芍藥　熟地黃
防風　連翹
羌活　獨活
乳香　没藥
白芷　續斷
杜仲各等分
右生地黃煎入童便和服不可用酒
氣虛加人參白朮黃耆
復元通氣散

木香　茴香炒
青皮去皮　穿山甲酥炙
陳皮　白芷
甘草　漏蘆
貝母各等分
右爲末每服一二錢温酒調下
傷損出血
傷損之證或患處或諸竅出血者此肝火熾盛血熱錯經而妄行也用加味逍遙散清熱養血若中

氣虛弱血無所附而妄行用加味四君子湯補中益氣湯或元氣內脫不能攝血用獨參湯加炮薑以回陽如不應急加附子如血蘊於內而嘔血者用四物湯加柴胡黃芩凡傷損而犯勞碌或怒氣肚腹脹悶或過服寒毒等藥致傷陽絡者則為吐血衄血便血尿血傷於陰絡者則為血積血塊肌肉青黑此皆臟腑虧損經隧失職急補脾肺二臟自愈矣

加味逍遙散

白朮 茯苓

當歸 白芍各二錢

柴胡一錢 薄荷五分

黑梔 丹皮各一錢五分

水煎服

補中益氣湯

人參二錢 黃耆炙二錢

白朮炒一錢五分 當歸一錢五分

升麻五分 柴胡五分

陳皮八分 甘草炙三分

引用薑棗水煎服

四君子湯

人參 白朮

茯苓各二錢 甘草炙一錢

引用薑棗水煎服

四物湯

當歸三錢 川芎

白芍藥二錢 熟地黃三錢

水煎服

獨參湯

人參一兩

水煎服

瘀血泛注

傷損瘀血泛注之證乃跌仆血滯所致蓋氣流而注血注而凝或注於四肢關節或留於胸腹腰臀或漫腫或結塊初起皆屬肝脾鬱火急用葱熨法內服小柴胡湯以清肝火次用八珍湯以壯脾胃

或益氣養榮湯久服自然收功若日久潰破而
血虛者宜十全大補湯若潰而寒邪凝滯不斂者
宜豆豉餅祛散之此證若不補氣血不慎起居不
戒七情或用寒凉剋伐俱爲不治

小柴胡湯

柴胡一錢　黄芩一錢五分

半夏製　人參各一錢

甘草炙五分

引用薑二片水煎服

八珍湯

即四君子湯四物湯相和爲劑也

益氣養榮湯

人參　黄耆炒

當歸　川芎

熟地黄　白芍炒

香附　貝母

茯苓　陳皮各一錢

白朮二錢　柴胡六分

甘草　桔梗各五分

引用薑水煎服

口乾加五味子麥冬

往來寒熱加青皮

十全大補湯

即八珍湯加黄耆肉桂各一錢

豆豉餅

江西豆豉

右一味爲末唾津和作餅子如錢大厚二分
置患處以艾壯於餅上灸之乾則再易

葱熨法方見囟骨傷

瘀血作痛

傷損之證腫痛者乃瘀血凝結作痛也若脹而重
墜色或青黑甚則發熱作渴汗出者乃經絡壅滯
陰血受傷也宜先刺去惡血以通壅塞後用四物
湯以調之

四物湯方見傷損出血

血虛作痛

傷損之證血虛作痛者其證則發熱作渴煩悶頭暈日晡益甚此陰虛內熱之證宜八珍湯加丹皮麥冬五味子肉桂骨碎補治之

八珍湯 方見瘀血泛注

嘔吐黑血

傷損嘔吐黑血者始因打撲傷損敗血流入胃脘色黑如豆汁從嘔吐而出也形氣實者用百合散形氣虛者加味芎藭湯

百合散

川芎 赤芍藥
當歸 百合
生地黃 側柏葉
荊芥 犀角
丹皮 黃芩
黃連 梔子
鬱金 大黃各一錢

水煎加童便和服

加味芎藭湯

芎藭 當歸
白朮 百合水浸一日
荊芥各一錢

水一鍾半酒半鍾煎八分不拘時服

發熱

傷損之證發熱者若因出血過多脈洪大而虛重按之全無者此血虛發熱也用當歸補血湯脈若沉微按之軟弱者此陰盛發熱也宜用四君子湯加炮薑附子若發熱煩躁肉瞤筋惕者此亡血也宜用聖愈湯如發熱汗出不止者此血脫也宜用獨參湯血脫之證其脈實者難治細小者易治

當歸補血湯

黃耆炙一兩 當歸三錢

水煎服

聖愈湯

人參 川芎
當歸 熟地黃
生地 黃耆炙各等分

水煎服

四君子湯 俱見傷

獨參湯 損出血

肌肉作痛

傷損之證肌肉作痛者乃榮衛氣滯所致宜用復元通氣散筋骨間作痛者肝腎之氣傷也用六味地黃丸

六味地黃丸

熟地黃八兩　山萸肉四兩去核

懷山藥四兩　牡丹皮三兩

澤瀉三兩　茯苓三兩

共爲末煉蜜丸桐子大空心白湯服三錢

復元通氣散 方見傷損內證

骨傷作痛

傷損之證骨傷作痛者乃傷之輕者也若傷重則或折或碎須用手法調治之其法已詳列前篇此乃磕硼微傷骨間作痛肉色不變宜外用葱熨法內服沒藥丸日間服地黃丸自愈矣

沒藥丸

沒藥去油　乳香去油

川芎　川椒去閉口及目

芍藥　當歸各半兩

自然銅二錢半火煆淬七次

右爲細末用黃蠟二兩溶化入藥末攪勻丸彈子大每服一丸酒一鍾化開煎五分熱服

葱熨法 方見白骨傷

地黃丸 方見肌肉作痛

胸腹痛悶

傷損之證胸腹痛悶者多因跳躍捶胸閃挫舉重勞役恚怒所致其胸腹喜手摸者肝火傷脾也用四君子湯加柴胡山梔如畏手摸者肝經血滯也用四物湯加柴胡山梔桃仁紅花若胸脇悶痛發熱晡熱肝經血傷也用加味逍遙散若胸脇悶痛飲食少思肝脾氣傷也用四君子湯加芎歸柴梔丹皮若胸腹脹滿飲食少思肝脾氣滯也用六君子湯加柴胡芎歸若胸腹不利食少無寐脾氣鬱

結也用加味歸脾湯若痰氣不利脾肺氣滯也用二陳湯加白朮芎歸山梔天麻鈎籐鈎如因過服風熱之藥致肝血受傷肝火益甚或飲糖酒則腎水益虛脾火益熾若用大黃芍藥內傷陰絡反致下血少壯者必成痼疾老弱者多致不起

加味歸脾湯

黑梔一錢　牡丹皮一錢

人參一錢　黃耆炙一錢五分

白朮炒一錢五分　茯神二錢

棗仁炒一錢五分　當歸一錢

木香五分　遠志去心八分

圓肉一錢　甘草炙五分

引用薑棗水煎服

二陳湯

陳皮一錢五分　半夏製一錢

茯苓二錢　甘草五分

引用薑水煎服

六君子湯

即四君子湯加陳皮半夏各一錢五分

引用薑棗水煎服

四君子湯

四物湯

加味逍遙湯　俱見傷損出血

脇肋脹痛

傷損脇肋脹痛之證如大便通和喘咳吐痰者肝火侮肺也用小柴胡湯加青皮山梔清之若胸腹脹痛大便不通喘咳吐血者乃瘀血停滯也用當

歸導滯散通之內經云肝藏血脾統血蓋肝屬木木勝侮土其脾氣必虛宜先清肝養血則瘀血不致凝滯次壯脾胃則氣血充盛若行剋伐則虛者益虛滯者益滯禍不旋踵矣

當歸導滯散

川大黃一兩　當歸二錢五分

麝香少許

右三味除麝香另研外爲極細末後入麝香令勻每服三錢熱酒一杯調下

又方

川大黃　當歸各二兩

右共爲細末每服三錢不拘時溫酒調服

小柴胡湯方見瘀血泛注

腹痛

傷損腹痛之證如大便不通按之痛甚者瘀血在內也用加味承氣湯下之既下而痛不止按之仍痛瘀血未盡也用加味四物湯補而行之若腹痛按之反不痛者血氣傷也用四物湯加參者白朮

補而和之若下而胸脇反痛肝血傷也用四君子湯加芎歸補之既下而發熱陰血傷也用四物湯加參朮補之既下而惡寒陽氣傷也用十全大補湯補之既下而惡寒發熱者氣血傷也用八珍湯補之下而欲嘔者胃氣傷也用六君子湯加當歸補之下而泄瀉者脾腎傷也用六君子湯加肉果補骨脂補之若下後手足俱冷昏憒出汗陽氣虛寒也急用參附湯若吐瀉而手足俱冷指甲青者脾腎虛寒之甚也急用大劑參附湯口噤手撒遺尿痰盛唇青體冷者虛極之壞證也急用大劑參附湯多有得生者

加味承氣湯

大黃　朴消各二錢

枳實　厚朴

當歸　紅花各一錢

甘草五分

水酒各半煎服

參附湯

人參或五錢或一兩　製附子或三錢或五錢

引用薑水煎服

四君子湯

四物湯俱見傷損出血

六君子湯方見脇肋

八珍湯

十全大補湯俱見瘀血泛注

少腹引陰莖作痛

傷損而少腹引陰莖作痛者乃瘀血不行兼肝經

鬱火所致宜用小柴胡湯加大黃黃連山梔服之待痛勢已定再用養血之劑自無不愈矣此病若誤認爲寒證而投以熱藥重則必危輕則損目治者宜慎之

小柴胡湯 方見瘀血泛注

腰痛

傷損腰痛脊痛之證或因墜墮或因打撲瘀血留於太陽經中所致宜地龍散治之

地龍散

地龍 官桂

蘇木各九分 麻黃七分

黃蘗 當歸尾各二錢五分

桃仁九箇 甘草三錢五分

右水煎食前服

眩暈

傷損之證頭目眩暈有因服剋伐之劑太過中氣受傷以致眩暈者有因亡血過多以致眩暈者如兼腹脹嘔吐宜用六君子湯兼發熱作渴不思飲食者宜十全大補湯

六君子湯 方見胸腹痛悶

十全大補湯 方見瘀血泛注

煩躁

傷損之證煩躁而面赤口乾作渴脈洪大按之如無者宜用當歸補血湯如煩躁自汗頭暈宜用獨參湯如煩躁不寐宜用加味歸脾湯如煩躁脇痛宜用柴胡四物湯如亡血過多煩躁者宜用聖愈湯

加味歸脾湯 方見胸腹痛悶

當歸補血湯

聖愈湯 俱見發熱

柴胡四物湯 即四物湯加柴胡黃芩

獨參湯 方見傷損出血

喘咳

傷損之證而喘咳者若因出血過多面黑胸脹胸膈痛而發喘者乃氣虛血乘於肺也急用二味參蘇飲緩則難救若咳血衄血而喘者乃氣逆血蘊

於肺也只宜活血行氣不可用下法宜十味參蘇
飲治之

二味參蘇飲

人參 一兩　蘇木 二兩

水煎服

十味參蘇飲

人參　紫蘇

半夏　茯苓

陳皮　桔梗

前胡　葛根

枳殼 各一錢　甘草 五分

引用薑二片水煎服

昏憒

傷損昏憒乃傷之至重以致昏憒不知人事宜急
灌以獨參湯雖內有瘀血斷不可下急用花蕊石
散內化之蓋恐下之因瀉而亡陰也若元氣虛甚
者尤不可下亦用前散以化之凡瘀血在內大便
不通用大黃朴消血凝而不下者須用木香肉桂
二三錢以熱酒調灌服之血下乃生怯弱之人用
消黃而必加木香肉桂同煎者乃假其熱以行其
寒也

花蕊石散

石硫黃 四兩　花蕊石 一兩

右二味合勻用瓦礶一箇入藥在內封口外
用紙筋鹽泥周圍固濟俟泥乾安四方磚上
書八卦五行字用炭十觔籠疊周匝自午時
從下著火漸漸上徹直至經宿炭盡火冷又

放經宿礶冷取出研細用絹羅羅過磁盒收
貯每服二錢以童便調服

作嘔

傷損作嘔若因痛甚或因剋伐而傷胃者宜四君
子湯加當歸半夏生薑因忿怒而肝傷者用小柴
胡湯加山梔茯苓因痰火盛者用二陳湯加薑炒
黃連山梔因胃氣虛者用補中益氣湯加生薑半
夏因出血過多者用六君子湯加當歸

四君子湯

補中益氣湯 俱見傷損出血

小柴胡湯 方見瘀血泛注

二陳湯

六君子湯 俱見胸腹痛悶

作渴

傷損作渴若因亡血過多者用四物湯加人參白朮如不應用人參黃耆以補氣當歸熟地以補血或用八珍湯若因胃熱傷津液者用竹葉黃耆湯如胃虛津液不足用補中益氣湯如胃火熾盛用

竹葉石膏湯若煩熱作渴小便淋濇乃腎經虛熱非地黃丸不能救

竹葉黃耆湯

淡竹葉一錢　人參

黃耆　生地黃

當歸　川芎

麥冬　芍藥

甘草　石膏煅

黃芩炒　半夏各一錢

水煎服

竹葉石膏湯

竹葉三把　石膏一觔

人參三兩　甘草二兩炙

麥冬一升　半夏半升

粳米半升

引用生薑水煎服

四物湯

補中益氣湯 俱見傷損出血

八珍湯 方見瘀血泛注

六味地黃丸 方見實內作痛

秘結

傷損之證大便秘結若因大腸血虛火熾者用四物湯送潤腸丸或以猪膽汁導之若腎虛火燥者用六味地黃丸若腸胃氣虛用補中益氣湯若大便秘結裏實氣壯腹痛堅硬者用玉燭散

潤腸丸

大黃　當歸尾

羌活各五錢　桃仁

麻仁各一兩

右爲末煉蜜丸彈子大空心白湯送下

豬膽汁導法

大豬膽一枚瀉汁和法醋少許以灌穀道內如

一時頃當大便出宿食惡物甚效

玉燭散

生地黃　當歸

川芎　赤芍藥

大黃酒浸　芒消

引用生薑水煎服

四物湯

補中益氣湯俱見傷損出血

六味地黃丸方見肌肉作痛

挾表

傷損之證外挾表邪者其脈必浮緊證則發熱體

痛形氣實者宜疏風敗毒散形氣虛者宜加味交

加散或羌活乳香湯以散之

疏風敗毒散

當歸　川芎

白芍藥　熟地黃

羌活　獨活

桔梗　枳殼

柴胡　白茯苓

白芷　甘草

紫蘇　陳皮

香附

右生薑生地黃煎入酒和服

加味交加散

當歸　川芎

白芍藥　生地黃

蒼朮　厚朴

陳皮　白茯苓
半夏　羌活
獨活　桔梗
枳殼　前胡
柴胡　乾薑
肉桂　甘草
右生薑煎服
有熱者去乾薑肉桂

羌活乳香湯

羌活　獨活
川芎　當歸
赤芍藥　防風
荊芥　丹皮
續斷　紅花
桃仁　乳香
右生地黃煎服
有熱者加柴胡黃芩

補遺方

補損續筋丸

治跌打撲墜骨碎筋斷肉破疼痛不息

當歸五錢酒洗　川芎
白芍炒　熟地各三錢
廣木香　丹皮
乳香去油淨　没藥各五錢去油淨
骨碎補　自然銅
紅花　瓜兒血竭各三錢

朱砂五錢　丁香一錢
人參一兩　虎骨二兩酥油炙
古銅錢三文
共為細末煉蜜為丸每服三錢淡黃酒童便
化服

補損接骨仙丹

治證同前
當歸酒洗　川芎
白芍炒　熟地

補骨脂　五靈脂
廣木香　地骨皮
防風各五錢　乳香去油淨
没藥去油淨　瓜兒血竭各一錢

右剉一處用夜合花樹根皮五錢同入大酒壺內加燒酒同煮一炷香取出溫服

止血定痛生肌散

治傷損等證失血過多或因尅伐致血氣耗損惡寒發熱煩躁

乳香去油淨　没藥去油淨
龍骨各三錢　血竭二錢
黃丹五錢飛過　香白芷二錢五分
軟石膏一兩煅去火毒　潮腦少許

共爲細末磁器盛之每以糝患處止痛生肌

敷跌打青腫方

生梔子同飛羅麵搗塗之以布纏裹拔出青毒即消

回陽玉龍膏

耑敷跌打損傷氣虛寒冷

草烏二錢炒　南星一兩煨
軍薑一兩煨　白芷一兩
赤芍一兩炒　肉桂五錢

共爲末葱湯調搽熱酒亦可

太乙膏

治傷口不收貼之生肌長肉

香蔴油　當歸
生地　生甘草

三味入油內煠枯去渣再以絲棉濾淨再入淨鍋熬至滴水不散入炒飛黃丹八兩又用慢火熬至滴水成珠取起少傾入白蠟黃蠟各一兩微火再熬取起少定入去油淨乳香没藥各五錢攪勻收磁器內過三宿可貼